

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

深在性真菌症治療剤

# 日本薬局方 フルコナゾール注射液

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

## フルコナゾール静注 50mg [NP] フルコナゾール静注 100mg [NP] フルコナゾール静注 200mg [NP]

Fluconazole Intravenous

	50mg	100mg	200mg
承認番号	22500AMX00819	22500AMX00820	22500AMX00837
販売開始	2003年7月	2003年7月	2003年7月

注) 注意一医師等の処方箋により使用すること

### 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 次の薬剤を投与中の患者：トリアゾラム、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミン、キニジン、ピモジド、アスナプレビル、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル、アゼルニジピン、オルメサルタン・メドキシミル・アゼルニジピン、ロミタピド、プロナンセリン、ルラシドン[10.1 参照]
- 2.2 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	有効成分	添加剤
フルコナゾール静注 50mg「NP」	1袋(50mL)中 日本薬局方 フルコナゾール 50mg	1袋(50mL)中 塩化ナトリウム 450mg
フルコナゾール静注 100mg「NP」	1袋(50mL)中 日本薬局方 フルコナゾール 100mg	塩酸 適量 水酸化ナトリウム 適量
フルコナゾール静注 200mg「NP」	1袋(100mL)中 日本薬局方 フルコナゾール 200mg	1袋(100mL)中 塩化ナトリウム 900mg 塩酸 適量 水酸化ナトリウム 適量

#### 3.2 製剤の性状

販売名	pH	浸透圧比	性状
フルコナゾール静注 50mg「NP」	5.0~7.0	約1 (生理食塩液 に対する比)	無色澄明の液
フルコナゾール静注 100mg「NP」			
フルコナゾール静注 200mg「NP」			

### 4. 効能・効果

- カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症  
真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎
- 造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防

### 6. 用法・用量

成人	小児	新生児
<p>〈カンジダ症〉 通常、成人にはフルコナゾールとして50~100mgを1日1回静脈内に投与する。</p> <p>〈クリプトコッカス症〉 通常、成人にはフルコナゾールとして50~200mgを1日1回静脈内に投与する。 なお、重症又は難治性真菌感染症の場合には、1日量として400mgまで増量できる。</p> <p>〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉 成人には、フルコナゾールとして400mgを1日1回静脈内に投与する。</p>	<p>〈カンジダ症〉 通常、小児にはフルコナゾールとして3mg/kgを1日1回静脈内に投与する。</p> <p>〈クリプトコッカス症〉 通常、小児にはフルコナゾールとして3~6mg/kgを1日1回静脈内に投与する。 なお、重症又は難治性真菌感染症の場合には、1日量として12mg/kgまで増量できる。</p> <p>〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉 小児には、フルコナゾールとして12mg/kgを1日1回静脈内に投与する。 なお、患者の状態に応じて適宜減量する。 ただし、1日量として400mgを超えないこと。</p>	<p>生後14日までの新生児には、フルコナゾールとして小児と同じ用量を72時間毎に投与する。 生後15日以降の新生児には、フルコナゾールとして小児と同じ用量を48時間毎に投与する。</p>

### 7. 用法・用量に関連する注意

#### 〈効能共通〉

#### 7.1 腎機能障害患者に対する用量調節の目安

腎機能障害患者に投与する場合は、下表に示すクレアチニン・クリアランス値を参考に用量を調節する<sup>1)</sup>。  
[9.2、9.8 参照]

クレアチニン・クリアランス (mL/min)	用量の目安
>50	通常用量
≤50(透析患者を除く)	半量
透析患者	透析終了後に通常用量

#### 〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉

7.2 好中球減少症が予想される数日前から投与を開始することが望ましい。

7.3 好中球数が $1000/\text{mm}^3$ を超えてから7日間投与することが望ましい。

## 8. 重要な基本的注意

8.1 本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認し、ワルファリンと併用する場合は、プロトロンビン時間測定及びトロンボテストの回数を増やすなど慎重に投与すること。[10.2 参照]

8.2 血液障害、急性腎障害、肝障害、高カリウム血症、心室頻拍、QT 延長、不整脈があらわれるおそれがあるので、本剤の投与に際しては、定期的に血液検査、腎機能・肝機能検査、血中電解質検査、心電図検査等を行うこと。[9.1.2、9.3、11.1.4-11.1.6、11.1.9、11.1.10 参照]

8.3 本剤の投与に際しては、アレルギー既往歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。[9.1.1、11.1.1 参照]

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 薬物過敏症の既往歴のある患者(本剤に対して過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと)

[8.3、11.1.1 参照]

### 9.1.2 心疾患又は電解質異常のある患者

心室頻拍(torsade de pointes を含む)、QT 延長、心室細動、房室ブロック、徐脈等があらわれることがある。

[8.2、11.1.10 参照]

### 9.2 腎機能障害患者

投与前にクレアチニン・クリアランス試験を行い、投与量を減ずるか、投与間隔をあけて使用すること。血中フルコナゾール濃度が持続する。[7.1 参照]

### 9.3 肝機能障害患者

肝機能障害を悪化させることがある。[8.2、11.1.6 参照]

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。催奇形性を疑う症例報告がある<sup>2)-4)</sup>。[2.3 参照]

### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。母乳中への移行が認められている<sup>5)</sup>。

### 9.7 小児等

新生児においては、投与間隔に留意すること。腎機能が未熟なため血中濃度半減期が延長する。[16.1.2 参照]

### 9.8 高齢者

用量ならびに投与間隔に留意するなど慎重に投与すること。本剤は主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機能が低下していることが多いため高い血中フルコナゾール濃度が持続するおそれがある。[7.1、16.4、16.5 参照]

## 10. 相互作用

本剤は、CYP2C9、2C19 及び 3A4 を阻害する。

### 10.1 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トリアゾラム(ハルシオン等) [2.1 参照]	トリアゾラムの代謝遅滞による血中濃度の上昇、作用の増強及び作用時間延長の報告がある <sup>6)</sup> 。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素である CYP3A4 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン(クリアミン配合錠) ジヒドロエルゴタミン [2.1 参照]	アゾール系抗真菌剤等の CYP3A4 を阻害する薬剤とエルゴタミンとの併用により、エルゴタミンの血中濃度が上昇し、血管攣縮等の副作用を起こすおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素である CYP3A4 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
キニジン(キニジン硫酸塩) ピモジド [2.1 参照]	これらの薬剤の血中濃度が上昇することにより、QT 延長、torsade de pointes を発現するおそれがある。	
アスナプレビル(スンベブラ) ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル(ジメンスー配合錠) [2.1 参照]	これらの薬剤の血中濃度が上昇することにより、肝胆道系の副作用が発現し、また重症化するおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素である CYP3A4 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
アゼルニジピン(カルブロック) オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン(レザルタス配合錠) [2.1 参照]	イトラコナゾールとの併用によりアゼルニジピンの AUC が上昇することが報告されている。	本剤はこれらの薬剤の主たる代謝酵素である CYP3A4 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
ロミタピド(ジャクスタピッド) [2.1 参照]	ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。	
プロナンセリン(ロナセン) ルラシドン(ラツータ) [2.1 参照]	これらの薬剤の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	

### 10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ワルファリン [8.1 参照]	プロトロンビン時間の延長 <sup>7)</sup> 、著しい INR 上昇及び出血傾向(挫傷、鼻出血、消化管出血、血尿、下血等)の報告がある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素である CYP2C9 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
フェニトイン イブプロフェン フルピロフェン	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある <sup>8)-11)</sup> 。	
セレコキシブ	セレコキシブの血中濃度が上昇することがある。本剤を使用中の患者にはセレコキシブの投与を低用量から開始すること。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ロサルタン	ロサルタンの血中濃度上昇、及び活性代謝物であるカルボン酸体の血中濃度減少の報告がある <sup>12)</sup> 。	本剤はロサルタンの肝臓における主たる代謝酵素である CYP2C9 を阻害するので、併用により活性代謝物であるカルボン酸体の血中濃度が減少することがある。
HMG-CoA 還元酵素阻害薬 フルバスタチン	これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある <sup>13)-15)</sup> 。	本剤はフルバスタチンの肝臓における主たる代謝酵素である CYP2C9 を阻害するので、併用によりフルバスタチンの血中濃度が上昇することがある。
アトルバスタチン シンバスタチン等		本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素である CYP3A4 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
カルバマゼピン	カルバマゼピンの血中濃度が上昇し、悪心・嘔吐、めまい、複視等が発現したとの報告がある <sup>16)、17)</sup> 。	
ミダゾラム エプレレノン メサドン	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある <sup>18)、19)</sup> 。	
カルシウム拮抗薬 ニフェジピン等 ビンカルカロイド系抗悪性腫瘍薬 ビンクリスチン ビンブラスチン エリスロマイシン	これらの薬剤の血中濃度上昇のおそれがある <sup>20)</sup> 。	
タクロリムス <sup>21)</sup> 、 シクロスポリン <sup>22)</sup>	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある。 また、併用により腎障害の報告がある。	
リファブチン	リファブチンの AUC 上昇の報告があり、リファブチンの作用が増強するおそれがある <sup>23)</sup> 。	
リトナビル ニルマトレルビル・リトナビル	リトナビルの AUC 上昇の報告がある。 ニルマトレルビル・リトナビルの血中濃度上昇のおそれがある。	
オキシコドン	オキシコドンの AUC 上昇の報告がある。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トルバブタン	トルバブタンの血中濃度上昇の報告があり、トルバブタンの作用が増強するおそれがある。やむを得ず併用する際は、トルバブタンを減量あるいは低用量から開始すること。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素である CYP3A4 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
* リメゲパント	リメゲパントの AUC 上昇の報告があり、リメゲパントの副作用が増強されるおそれがある。	
イブルチニブ	これらの薬剤の副作用が増強されるおそれがある。やむを得ず併用する際は、これらの薬剤の減量を考慮するとともに、患者の状態を慎重に観察すること。	本剤はこれらの薬剤の主たる代謝酵素である CYP3A を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
ラロトレクチニブ		
レンボレキサント	レンボレキサントの血中濃度上昇の報告があり、傾眠等の副作用が増強されるおそれがある。本剤とレンボレキサントの併用にあたっては、患者の状態を慎重に観察した上で、レンボレキサント投与の可否を判断すること。なお、併用する際はレンボレキサントを 1 日 1 回 2.5 mg とすること。	
バレメトスタット	バレメトスタットの副作用が増強されるおそれがある。患者の状態を慎重に観察すること。	
フェンタニル	フェンタニルの血中濃度上昇のおそれがある <sup>24)</sup> 。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素である CYP3A4 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の代謝が遅れることがある。
リバーロキサバン	リバーロキサバンの血中濃度が上昇したとの報告がある。	
テオフィリン	テオフィリンの血中濃度上昇の報告がある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるチトクローム P450 を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
経口避妊薬 エチニルエストラジオール <sup>25)</sup> 、 レボノルゲストレル等	エチニルエストラジオール <sup>25)</sup> 、レボノルゲストレルの血中濃度上昇の報告がある。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
スルホニル尿素系 血糖降下薬 クロルプロパ ミド グリベンクラミ ド等	スルホニル尿素系 血糖降下薬の血中 濃度上昇の報告が ある <sup>26)</sup> 。 また、併用により 低血糖の報告があ る。	本剤はこれらの薬 剤の肝臓における 主たる代謝酵素で あるチトクローム P450 を阻害する ので、併用により これらの薬剤の血 中濃度が上昇する ことがある。
ナテグリニド	ナテグリニドの AUC 上昇及び血中 濃度半減期の延長 の報告がある <sup>27)</sup> 。	
トレチノイン	中枢神経系の副作 用が発現するおそ れがある <sup>28)</sup> 。	
ジアゼパム	ジアゼパムの AUC 上昇及び血中濃度 半減期の延長の報 告がある <sup>29)</sup> 。	本剤はこれらの薬 剤の肝臓における 主たる代謝酵素で ある CYP3A4 及 び 2C19 を阻害す るので、併用によ りこれらの薬剤の 血中濃度が上昇す ることがある。
トファシチニブ	トファシチニブの AUC が 79%、C <sub>max</sub> が 27%増加したと の報告がある。	
シクロホスファミ ド	ピリルピンの上 昇、クレアチニン の上昇の報告があ る <sup>30)</sup> 。	本剤はシクロホス ファミドの肝臓に おける主たる代謝 酵素である CYP3A4 及び 2C9 を阻害 するので、併用に よりシクロホス ファミドの血中濃 度が上昇すること がある。
* エトラシモド	エトラシモドの AUC が 84% 増加 したとの報告があ る。	本剤はエトラシモ ドの主たる代謝酵 素である CYP3A4 及び 2C9 を阻害 するので、併用に よりエトラシモド の血中濃度が上昇 することがある。
アプロシチニブ	アプロシチニブの 作用が増強するお それがある。可能 な限り本剤を他の 類薬に変更する、 又は本剤を休薬す る等を考慮するこ と。	本剤はアプロシチ ニブの代謝酵素で ある CYP2C19 を 阻害するので、併 用によりアプロシ チニブの血中濃度 が上昇することが ある。
アミトリプチリン ノルトリプチリン	これらの薬剤の作 用が増強するおそ れがある <sup>31)-34)</sup> 。	本剤はこれらの薬 剤の代謝を阻害す るので、これらの 薬剤の血中濃度が 上昇することがあ る。
ジドブジン	ジドブジンの血中 濃度上昇の報告が ある <sup>35)</sup> 。	
リファンピシン	本剤の血中濃度の 低下及び血中濃度 半減期の減少の報 告がある <sup>36)</sup> 。	リファンピシンは 代謝酵素であるチ トクローム P450 を誘導する。その 結果、本剤の肝代 謝が増加すると考 えられる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
三酸化二ヒ素	QT 延長、心室頻拍 (torsade de pointes を含む)を起こす おそれがある。	本剤及び三酸化二 ヒ素は、いずれも QT 延長、心室頻拍 (torsade de pointes を含む)を起こす ことがある。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 ショック(頻度不明)、アナフィラキシー(頻度不明)

ショック、アナフィラキシー(血管性浮腫、顔面浮腫、そう痒等)を起こすことがある。[8.3、9.1.1 参照]

#### 11.1.2 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)(頻度不明)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)(0.04%)

#### 11.1.3 薬剤性過敏症候群(頻度不明)

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、ヒトヘルペスウイルス 6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること<sup>38)</sup>。

#### 11.1.4 血液障害(頻度不明)

無顆粒球症、汎血球減少症、血小板減少、白血球減少、貧血等の重篤な血液障害があらわれることがある。[8.2 参照]

#### 11.1.5 急性腎障害(頻度不明)

急性腎障害等の重篤な腎障害が報告されている。[8.2 参照]

#### 11.1.6 肝障害(頻度不明)

黄疸、肝炎、胆汁うっ滞性肝炎、肝壊死、肝不全等の肝障害が報告されており、これらの症例のうち死亡に至った例も報告されている。これらの発症と 1 日投与量、治療期間、患者の性別・年齢との関連性は明らかではない。本剤による肝障害は通常、投与中止により回復している。[8.2、9.3 参照]

#### 11.1.7 意識障害(頻度不明)

錯乱、見当識障害等の意識障害があらわれることがある。

#### 11.1.8 痙攣(頻度不明)

痙攣等の神経障害があらわれることがある。

#### 11.1.9 高カリウム血症(頻度不明)

異常が認められた場合には投与を中止し、電解質補正等の適切な処置を行うこと。[8.2 参照]

#### 11.1.10 心室頻拍(頻度不明)、QT 延長(頻度不明)、不整脈(頻度不明)

心室頻拍(torsade de pointes を含む)、QT 延長、心室細動、房室ブロック、徐脈等があらわれることがある。[8.2、9.1.2 参照]

#### 11.1.11 間質性肺炎(頻度不明)

発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等が認められた場合には、速やかに胸部 X 線等の検査を実施し、本剤の投与を中止するとともに、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### 11.1.12 偽膜性大腸炎(頻度不明)

偽膜性大腸炎等の重篤な大腸炎(初期症状：発熱、腹痛、頻回の下痢)があらわれることがある。

## 11.2 その他の副作用

	1%以上	0.1~1%未満	0.1%未満	頻度不明
肝臓	AST、ALT、Al-P、LDH、ビリルビンの上昇		黄疸	
皮膚		発疹		剥脱性皮膚炎
消化器		嘔気、食欲不振	下痢、腹痛、嘔吐	口渇、しゃっくり、腹部不快感、消化不良、鼓腸放屁
精神・神経系				頭痛、手指のこわばり、めまい、傾眠、振戦
腎臓	BUNの上昇	クレアチニンの上昇	乏尿	
代謝異常		低カリウム血症		高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、高血糖
血液		好酸球増多	好中球減少	
その他		発熱	浮腫、脱毛、倦怠感	熱感、血管痛、味覚倒錯、副腎機能不全

注)使用成績調査を含む<sup>38)</sup>

## 13. 過量投与

### 13.1 症状

13.1.1 外国の癌患者での過量投与(フルコナゾール 1200~2000mg/日、経口投与)の症例報告では、フルコナゾール 1600mg/日投与例において、肝機能検査値上昇がみられた。また、2000mg/日投与例において、中枢神経系障害(錯乱、嗜眠、見当識障害、不眠、悪夢、幻覚)、多形性紅斑、悪心・嘔吐、肝機能検査値上昇等がみられたとの報告がある<sup>39)</sup>。

13.1.2 フルコナゾール 8200mg 経口摂取後、幻覚、妄想行動の症状があらわれ、48時間の経過観察が行われた結果、症状は回復したとの報告がある。(自殺企図例)

### 13.2 処置

3時間の血液透析により、約50%が血清より除去される。フルコナゾールは、大部分が腎から排泄される。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

本剤は生理食塩液に溶解してあるため、注射用アムホテリシンBと併用すると白濁を生ずるので混注を避けること。

### 14.2 薬剤投与時の注意

14.2.1 静注する場合は、1分間に10mLを超えない速度で投与することが望ましい。

14.2.2 輸液セットの針はゴム栓の穿刺位置に、まっすぐに刺すこと。斜めに刺すと針がプラスチックバッグの首部を貫通し、液漏れを起こすことがある。

14.2.3 容器の液目盛りは、およその目安として使用すること。


## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 健常成人

健常成人にフルコナゾール注射剤 25mg 又は 50mg を単回静脈内投与した場合、血漿中濃度は用量に比例し、それぞれ 0.76 µg/mL、1.33 µg/mL であり(投与後6分の値)、血漿中

濃度半減期はいずれの用量でも約30時間であった。また、健常成人にフルコナゾール注射剤 25mg 又は 50mg を1日1回7日間静脈内投与したときの血漿中濃度は、初回投与時の約2倍であったと報告している<sup>40)、41)</sup>。



### 16.1.2 小児患者

小児患者にフルコナゾールを2~8mg/kgを経口(ドライシロップ)又は静脈内(静注液)投与したところ、小児におけるクリアランスは、成人のクリアランスの約2倍高い値であった<sup>42)</sup>(外国人データ)。(9.7 参照)

年齢(症例数)	用量 <sup>a)</sup>	半減期(時間)	AUC <sub>0-∞</sub> (µg·h/mL)
早産児 生後24時間以内 (n=4~11) <sup>b)</sup>	反復静注 6mg/kg (3日間隔)	73.6(1日目)	271(1日目)
		53.2(7日目)	490(7日目)
		46.6(13日目)	360(13日目)
11日~11ヵ月 (n=9)	単回静注 3mg/kg	23	110
9ヵ月~13歳 (n=14)	単回経口 2mg/kg	25.0	94.7
9ヵ月~13歳 (n=14)	単回経口 8mg/kg	19.5	363
5~15歳 (n=4)	反復静注 2mg/kg	17.4	67.4
5~15歳 (n=5)	反復静注 4mg/kg	15.2	139
5~15歳 (n=7)	反復静注 8mg/kg	17.6	197
1~12歳 (n=11)	反復静注 3mg/kg	15.5	41.6

a) 剤型：静注は静注液、経口はドライシロップ

b) 半減期(1日目：n=7、7日目：n=9、13日目：n=4)  
AUC<sub>0-72</sub>(1日目：n=11、7日目：n=10、13日目：n=4)

### 16.3 分布

#### 16.3.1 組織内移行

フルコナゾール注射剤の静脈内投与により患者の髄液中への良好な移行が認められた。また、髄液中のフルコナゾール濃度は血清中濃度の52~62%であったと報告されている<sup>43)、44)</sup>。

#### 16.3.2 蛋白結合率

フルコナゾールのヒト血漿蛋白に対する結合率は、類似化合物に比較して低く、約10%であった<sup>41)</sup>。

### 16.4 代謝

フルコナゾール 100mg をヒトに経口投与した場合、尿中代謝物として1、2、4-トリアゾールがわずかに認められた。投与量の約77%がフルコナゾール未変化体として尿中に排泄された<sup>41)</sup>。(9.8 参照)

### 16.5 排泄

フルコナゾール注射剤 25mg 又は 50mg を健常成人に単回静脈内投与したとき、尿中フルコナゾール濃度は用量に対応し

て増加し、いずれの用量においても投与5日目までの未変化体の尿中排泄率は投与量のほぼ70%であった<sup>40)</sup>。[9.8 参照]

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈カンジダ属及びクリプトコッカス属による感染症(真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎)〉

#### 17.1.1 国内臨床試験

開発時の臨床試験ではフルコナゾールを各種深在性真菌症に静脈内投与し、優れた臨床効果が得られた。

表 疾患別臨床効果

菌種	疾患名	有効例/症例
カンジダ属	カンジダ血症	10/14
	カンジダ肺・気管支炎	11/13
	カンジダ尿症	5/6
	カンジダ食道・消化管炎	1/2
	その他	3/3
	合計	30/38(78.9%)
クリプトコッカス属	クリプトコッカス髄膜炎	2/3
	肺クリプトコッカス症	1/1
	合計	3/4

(有効例=著効+有効)

真菌学的効果については、*Candida* 属の消失率は、*C.albicans* 83.3%(10/12)、*C.parapsilosis* 100%(5/5)、*C.tropicalis* 75.0%(3/4)、その他 78.6%(11/14)で、*Candida* 属全体の消失率は 82.9%(29/35)であった。

*Cryptococcus neoformans* 3 株では、減少 2 株、不変 1 株であった<sup>43)、45)-48)</sup>。

### 〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉

#### 17.1.2 外国臨床試験

骨髄移植患者 357 例を対象にフルコナゾール(カプセル又は静注液)として 400mg/日を経口又は静脈内投与した群では予防不成功<sup>注)</sup>は 58.7%(105/179 例)、プラセボ投与群では予防不成功は 69.5%(123/177 例)であった<sup>42)</sup>。

注) 予防不成功：全身性感染確定(proven)及び全身性感染疑い(suspected)を予防投与の不成功とした。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

フルコナゾールは真菌細胞の 14- $\alpha$ -ラノステロールの脱メチル化に関与するチトクローム P450 を阻害し、膜成分のエルゴステロール生合成を抑制することにより抗真菌作用を示す。また、真菌の酵母型発育相及び菌糸型発育相のいずれに対しても発育抑制を示す。フルコナゾールのエルゴステロール生合成阻害作用は真菌に選択的で、ラット肝細胞でのステロール生合成に対する影響は少ない<sup>41)、49)</sup>。

### 18.2 抗真菌作用

18.2.1 フルコナゾールは、カンジダ属の *Candida albicans*、*C.parapsilosis*、*C.tropicalis* 等、及びクリプトコッカス属の *Cryptococcus neoformans* と *Cr.gattii* に対し *in vitro* 抗真菌活性を示す。なお、*C.glabrata* と *C.guilliermondii* はフルコナゾールに対する感受性が低い傾向にあり、また *C.krusei* はフルコナゾールに対して耐性を示す。*C.auris* はフルコナゾールに対して耐性を示すとの報告がある<sup>50)-53)</sup>。カンジダ属及びクリプトコッカス属に対する最小発育阻止濃度(MIC)は下表のとおりであった<sup>53)、54)</sup>。

表 臨床分離株に対する抗真菌活性

菌種(株数)	MIC( $\mu$ g/mL)		
	範囲	50%	90%
<i>Candida albicans</i> (333)	$\leq 0.031 \sim 16$	0.25	1
<i>Candida glabrata</i> (107)	0.25 $\sim >64$	16	32
<i>Candida tropicalis</i> (46)	0.5 $\sim >64$	4	8
<i>Candida parapsilosis</i> (27)	0.25 $\sim 4$	1	2
<i>Candida krusei</i> (14)	32 $\sim >64$	64	$>64$
<i>Cryptococcus neoformans</i> (3)	4	-	-

MIC 測定は、0.165M MOPS 及び 10N NaOH にて pH7.0 に調整した RPIMI1640 培地を用いた微量液体希釈法による。

18.2.2 カンジダ属及びクリプトコッカス属の病原真菌を用いたマウス感染防御実験において、フルコナゾールは従来のイミダゾール系抗真菌剤よりも強い効果を示した<sup>55)、56)</sup>。

### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：フルコナゾール(Fluconazole)


略号：FLCZ

化学名：2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

分子式： $C_{13}H_{12}F_2N_6O$

分子量：306.27

構造式：



融点：137 $\sim$ 141 $^{\circ}$ C

性状：  
 ・白色 $\sim$ 微黄白色の結晶性の粉末である。  
 ・エタノール(99.5)にやや溶けやすく、水に溶けにくい。  
 ・希塩酸に溶ける。

### 20. 取扱い上の注意

以下の場合には使用しないこと。

- ・プラスチックバッグの外袋の内側に液滴が認められる場合
- ・内容液に着色又は混濁等の異常が認められる場合
- ・ゴム栓部のシールフィルムが万一はがれている場合

### 22. 包装

〈フルコナゾール静注 50mg[NP]〉

50mL $\times$ 5 袋[プラスチックバッグ]

〈フルコナゾール静注 100mg[NP]〉

50mL $\times$ 5 袋[プラスチックバッグ]

〈フルコナゾール静注 200mg[NP]〉

100mL $\times$ 5 袋[プラスチックバッグ]

### 23. 主要文献

- 1) Berl, T. et al. : J Am Soc Nephrol. 1995 ; 6(2) : 242-247 (L20210393)
- 2) Pursley, T. J. et al. : Clin Infect Dis. 1996 ; 22(2) : 336-340 (L20210394)
- 3) Aleck, K. A. et al. : Am J Med Genet. 1997 ; 72(3) : 253-256 (L20210395)
- 4) Molgaard-Nielsen, D. et al. : N Engl J Med. 2013 ; 369(9) : 830-839 (L20210396)
- 5) Force, R. W. : Pediatr Infect Dis J. 1995 ; 14(3) : 235-236 (L20210397)

- 6) 林 昌洋ほか. : 皮膚科の臨床. 1996 ; 38(8 Suppl. 36) : 1171-1183(L20210398)
- 7) Crussell-Porter, L. L. et al. : Arch Intern Med. 1993 ; 153(1) : 102-104(L20210399)
- 8) Howitt, K. M. et al. : Med J Aust. 1989 ; 151(10) : 603-604(L20210400)
- 9) Hynninen, V. V. et al. : Antimicrob Agents Chemother. 2006 ; 50(6) : 1967-1972(L20210401)
- 10) Greenblatt, D. J. et al. : Clin Pharmacol Ther. 2006 ; 79(1) : 125-133(L20210402)
- 11) Zgheib, N. K. et al. : Br J Clin Pharmacol. 2007 ; 63(4) : 477-487(L20210403)
- 12) Kaukonen, K. M. et al. : Eur J Clin Pharmacol. 1998 ; 53(6) : 445-449(L20210404)
- 13) Kantola, T. et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2000 ; 56(3) : 225-229(L20210405)
- 14) Kahri, J. et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2005 ; 60(12) : 905-907(L20210406)
- 15) Shaukat, A. et al. : Ann Pharmacother. 2003 ; 37(7-8) : 1032-1035(L20210407)
- 16) Finch, C. K. et al. : South Med J. 2002 ; 95(9) : 1099-1100(L20210408)
- 17) Olivelli, M. et al. : J Neurol. 2004 ; 251(5) : 622-623(L20210409)
- 18) Ahonen, J. et al. : Acta Anaesthesiol Scand. 1999 ; 43(5) : 509-514(L20210410)
- 19) Cook, C. S. et al. : Xenobiotica. 2004 ; 34(3) : 215-228(L20210411)
- 20) Kremens, B. et al. : Br J Clin Pharmacol. 1999 ; 47(6) : 707-708(L20210412)
- 21) Manez, R. et al. : Transplantation. 1994 ; 57(10) : 1521-1523(L20210413)
- 22) Lopez-Gil, J. A. : Ann Pharmacother. 1993 ; 27(4) : 427-430(L20210414)
- 23) Trapnell, C. B. et al. : Ann Intern Med. 1996 ; 124(6) : 573-576(L20210415)
- 24) Saari, T. I. et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2008 ; 64(1) : 25-30(L20210417)
- 25) Sinofsky, F. E. et al. : Am J Obstet Gynecol. 1998 ; 178(2) : 300-304(L20210418)
- 26) Fournier, J. P. et al. : Therapie. 1992 ; 47(5) : 446-447(L20210419)
- 27) Niemi, M. et al. : Clin Pharmacol Ther. 2003 ; 74(1) : 25-31(L20210420)
- 28) Vanier, K. L. et al. : J Pediatr Hematol Oncol. 2003 ; 25(5) : 403-404(L20210421)
- 29) Saari, T. I. et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2007 ; 63(10) : 941-949(L20210422)
- 30) Marr, K. A. et al. : Blood. 2004 ; 103(4) : 1557-1559(L20210423)
- 31) Duggal, H. S. : Gen Hosp Psychiatry. 2003 ; 25(4) : 297-298(L20210424)
- 32) Robinson, R. F. et al. : Ann Pharmacother. 2000 ; 34(12) : 1406-1409(L20210425)
- 33) Newberry, D. L. et al. : Clin Infect Dis. 1997 ; 24(2) : 270-271(L20210426)
- 34) Gannon, R. H. et al. : Ann Pharmacother. 1992 ; 26(11) : 1456-1457(L20210427)
- 35) Sahai, J. et al. : J Infect Dis. 1994 ; 169(5) : 1103-1107(L20210428)
- 36) Coker, R. J. et al. : BMJ. 1990 ; 301(6755) : 818(L20210429)
- 37) 厚生労働省. : 重篤副作用疾患別対応マニュアル. 薬剤性過敏症症候群(L20200433)
- 38) 厚生省医薬安全局. : 医薬品研究. 1998 ; 29(12) : 924, 931-933(L20210430)
- 39) Anaissie, E. J. et al. : J Infect Dis. 1995 ; 172(2) : 599-602(L20210431)
- 40) 柴 孝也ほか. : Jpn J Antibiot. 1989 ; 42(1) : 17-30(L20210432)
- 41) 第十八改正日本薬局方解説書. 2021:C-4852-C-4856(L20230901)
- 42) 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 : 公知申請への該当性に係る報告書 : フルコナゾール(小児用法用量の設定)(L20230902)
- 43) 池本 秀雄ほか. : Jpn J Antibiot. 1989 ; 42(1) : 63-116(L20210433)
- 44) Foulds, G. et al. : J Clin Pharmacol. 1988 ; 28(4) : 363-366(L20210434)
- 45) 丸田 孝郎ほか. : Jpn J Antibiot. 1989 ; 42(1) : 117-126(L20210435)
- 46) 外山 圭助ほか. : Jpn J Antibiot. 1989 ; 42(1) : 47-54(L20210436)
- 47) 李 永浩ほか. : Jpn J Antibiot. 1989 ; 42(1) : 138-143(L20210437)
- 48) 仁藤 博. : Jpn J Antibiot. 1989 ; 42(1) : 171-178(L20210438)
- 49) 森田 達也ほか. : 真菌と真菌症. 1986 ; 27(3) : 190-197(L20210439)
- 50) Espinel-ingroff, A. et al. : Antimicrob Agents Chemother. 2012 ; 56(11) : 5898-5906(L20220320)
- 51) Berkow, E. L. et al. : Infect Drug Resist. 2017 ; 10 : 237-245(L20220321)
- 52) Calvo, B. et al. : J Infect. 2016 ; 73(4) : 369-374(L20220322)
- 53) 山口 英世ほか. : 日本臨床微生物学雑誌. 2009 ; 19(3) : 128-141(L20210441)
- 54) 山口 英世ほか. : Jpn J Antibiot. 1989 ; 42(1) : 1-16(L20210440)
- 55) 川崎 賢二ほか. : Jpn J Antibiot. 1991 ; 44(5) : 552-561(L20210442)
- 56) Troke, P. F. et al. : J Antimicrob Chemother. 1987 ; 19(5) : 663-670(L20210443)

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

ニプロ株式会社 医薬品情報室  
 〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3番26号  
 TEL 0120-226-898  
 FAX 050-3535-8939

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元



**NIPRO**

ニプロ株式会社  
 大阪府摂津市千里丘新町3番26号