## 代謝性強心剤 ユビデカレノン錠

日本標準商品分類番号 872119

法:室温保存 有効期間:3年

# ユビデカレノン錠10mg「日新」

Ubidecarenone Tablets 10mg "NISSIN"

承認番号	22500AMX01168000
販売開始	1981年9月

#### 3. 組成・性状

#### 3 1 組成

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
販売名	ユビデカレノン錠10mg「日新」	
有効成分	1錠中 日本薬局方ユビデカレノン10mg	
添加剤	結晶セルロース、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、 ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム	

#### 3.2 製剤の性状

販売名	ユビデカレノン錠10mg「日新」	
性 状	淡黄色で片面中央に割線のある裸錠	
外形	NS 278	
大きさ	錠径:6.0mm、錠厚:3.2mm、重量:100mg	
識 別 コード	NS 278	

#### 4. 効能又は効果

基礎治療施行中の軽度及び中等度のうっ血性心不全症状

#### 6. 用法及び用量

ユビデカレノンとして通常成人は1回10mgを1日3回食後に経口投 与する。

#### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危 険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は 中止を検討すること。

### 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異 常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこ

### 11.2 その他の副作用

	0.1~5%未満		
消化器	胃部不快感、食欲減退、吐気、下痢		
過敏症	発疹		

発現頻度は副作用発生頻度調査結果に基づく。

#### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導する こと。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、 更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発すること がある。

#### 16. 薬物動態

#### 16.8 その他

ユビデカレノン錠10mg「日新」の生物学的同等性に関しては、カ ルビキノン錠(昭和53年承認、販売名変更前製剤)の承認申請時 添付資料により評価された。

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

ユビデカレノンはミトコンドリアの電子伝達系におけるコハク酸 脱水素酵素の補酵素(補酵素Q10)である。心疾患時の低下を補う ことにより、虚血下の酸素利用効率の改善や低下したATP合成能の 改善が示唆されている1)。

#### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称:ユビデカレノン(Ubidecarenone) 化学名:(2*E*, 6*E*, 10*E*, 14*E*, 18*E*, 22*E*, 26*E*, 30*E*, 34*E*, 38*E*)-2-(3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39-Decamethyltetraconta-2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38-decaen-1-y1)-5, 6-dimethoxy-3-

methyl-1,4-benzoquinone

分子式: C59H90O4 分子量:863.34 構造式:

性 状:黄色~橙色の結晶性の粉末で、におい及び味はない。ジ エチルエーテルに溶けやすく、エタノール (99.5) に極めて溶けにくく、水にほとんど溶けない。光によって徐々 に分解し、着色が強くなる。

融 点:約48℃

### 20. 取扱い上の注意

20.1 本剤は有効成分であるユビデカレノンの融点(約48℃)以上に なると、まだら変色を起こすことがあるので、保管温度には注意 すること。

20.2 外箱開封後は遮光して保存すること。

#### 22. 包装

100錠 [10錠 (PTP) ×10]

#### 23. 主要文献

1) 第十七改正日本薬局方解説書, C-5621, 廣川書店 (2016)

#### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

日新製薬株式会社 安全管理部 〒994-0069 山形県天童市清池東二丁目3番1号 TEL 023-655-2131 FAX 023-655-3419 E-mail: d-info@yg-nissin.co.jp

#### 26. 製造販売業者等

#### 26.1 製造販売元



-1-

# 白新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号