**2025年10月改訂(第2版) *2023年4月改訂(第1版)

> 規制区分 処方箋医薬品^{注)}

マクロライド系抗生物質製剤

貯法:室温保存 マクロ 有効期間:3年 ロオボロナ ク

日本薬局方 クラリスロマイシン錠

クラリスロマイシン錠200mg [NPI]

Clarithromycin Tablets 200mg "NPI"

注)注意一医師等の処方箋により使用すること

承認番号 21800AMY10077000 販売開始 2006年7月

日本標準商品分類番号

876149

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 ピモジド、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、スボレキサント、ダリドレキサント塩酸塩、ボルノレキサント水和物、ロミタピドメシル酸塩、タダラフィル [アドシルカ]、チカグレロル、イブルチニブ、イバブラジン塩酸塩、ベネトクラクス (再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 (小リンパ球性リンパ腫を含む)、再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫の用量漸増期)、ルラシドン塩酸塩、アナモレリン塩酸塩、フィネレノン、イサブコナゾニウム硫酸塩、ボクロスポリン、マバカムテンを投与中の患者 [10.1 参照]
- **2.3** 肝臓又は腎臓に障害のある患者でコルヒチンを投与中の患者 [9.2.1、9.3.1、10.2 参照]

3. 組成·性状

3.1 組成

販売名	クラリスロマイシン錠200mg「NPI」
有効成分 (1錠中)	(日局)クラリスロマイシン 200mg(力価)
添加剤	カルナウバロウ、クロスポビドン、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ポリソルベート80、マクロゴール6000

3.2 製剤の性状

販売名	クラリスロマイシン錠200mg「NPI」		
性状	白色のフィルムコート錠		
	表	裏	側面
外形	NP1 614		
直径	8.7mm		
厚さ	5.4mm		
重量	250mg		
識別コード	NPI 614		

4. 効能又は効果

○ 一般感染症

〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、 モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフル エンザ菌、レジオネラ属、カンピロバクター属、ペプト ストレプトコッカス属、クラミジア属、マイコプラズマ属 〈適応症〉

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、尿道炎、子宮頸管炎、感染性腸炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎

○ 非結核性抗酸菌症

〈適応菌種〉

本剤に感性のマイコバクテリウム属

〈谪応症〉

マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC) 症を含む非結核性抗酸菌症

○ ヘリコバクター・ピロリ感染症

〈適応菌種〉

本剤に感性のヘリコバクター・ピロリ

**〈適応症〉

胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、免疫性血小板減少症、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎

5. 効能又は効果に関連する注意

〈一般感染症:咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、中耳炎、副鼻腔炎〉

5.1 「抗微生物薬適正使用の手引き」¹⁾ を参照し、抗菌薬投 与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断さ れる場合に投与すること。

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

- **5.2** 進行期胃MALTリンパ腫に対するヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有効性は確立していない。
- **5.3 免疫性血小板減少症に対しては、ガイドライン等を参照し、ヘリコバクター・ピロリ除菌治療が適切と判断される症例にのみ除菌治療を行うこと。
 - 5.4 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃以外には、ヘリコバクター・ピロリ除菌治療による胃癌の発症抑制に対する有効性は確立していない。
 - 5.5 ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いる際には、ヘリコバクター・ピロリが陽性であること及び内視鏡検査によりヘリコバクター・ピロリ感染胃炎であることを確認すること。

6. 用法及び用量

〈一般感染症〉

通常、成人にはクラリスロマイシンとして1日400mg (力価) を2回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈非結核性抗酸菌症〉

通常、成人にはクラリスロマイシンとして1日800mg (力価)を2回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

通常、成人にはクラリスロマイシンとして1回200mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg(力価)及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。

なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回400mg(力価)1日2回を上限とする。

7. 用法及び用量に関連する注意

〈一般感染症〉

7.1 免疫不全など合併症を有さない軽症ないし中等症のレジ オネラ肺炎に対し、1日400mg分2投与することにより、 通常2~5日で症状は改善に向う。症状が軽快しても投与 は2~3週間継続することが望ましい。また、レジオネラ 肺炎は再発の頻度が高い感染症であるため、特に免疫低下の状態にある患者などでは、治療終了後、更に2~3週間投与を継続し症状を観察する必要がある。なお、投与期間中に症状が悪化した場合には、速やかにレジオネラに有効な注射剤(キノロン系薬剤など)への変更が必要である。[8.1 参照]

- 7.2 レジオネラ肺炎の治療において単独で使用することが望ましいが、患者の症状に応じて併用が必要な場合には以下の報告を参考に併用する薬剤の特徴を考慮し選択すること。
- **7.2.1** 中等症以上の患者にリファンピシンと併用し有効との 報告がある。
- 7.2.2 in vitro抗菌力の検討において、本剤とレボフロキサシン又はシプロフロキサシンとの併用効果(相乗ないし相加作用)が認められたとの報告がある。
- 7.3 クラミジア感染症に対する本剤の投与期間は原則として 14日間とし、必要に応じて更に投与期間を延長する。 [8.1 参照]

〈非結核性抗酸菌症〉

- 7.4 肺MAC症及び後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う 播種性MAC症の治療に用いる場合、国内外の最新のガ イドライン²⁾ 等を参考に併用療法を行うこと。
- 7.5 本剤の投与期間は、以下を参照すること。[8.1 参照]

1713 1376 3774 1414 1717 1717 1717 1717 1717 1717			
疾患名	投与期間		
肺MAC症	排菌陰性を確認した後、1年以上の投与継続と定期的な検査を行うことが望ましい。 また、再発する可能性があるので治療終 了後においても定期的な検査が必要であ る。		
	臨床的又は細菌学的な改善が認められた		
 播種性MAC症	後も継続投与すべきである。		

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

7.6 プロトンポンプインヒビターはランソプラゾールとして 1回30mg、オメプラゾールとして1回20mg、ラベプラ ゾールナトリウムとして1回10mg、エソメプラゾールとして1回20mg又はボノプラザンとして1回20mgのいずれか1剤を選択する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、 原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限 の期間の投与にとどめること。[7.1、7.3、7.5 参照]
- 8.2 血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無 顆粒球症があらわれることがあるので、定期的に検査を 行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.4 参照]
- 9. 特定の背景を有する患者に関する注意
- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 他のマクロライド系薬剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- 9.1.2 心疾患のある患者、低カリウム血症のある患者

QT延長、心室頻拍 (Torsade de pointesを含む)、 心室細動をおこすことがある。[11.1.2 参照]

9.2 腎機能障害患者

本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。[16.6.1 参照]

9.2.1 腎機能障害患者でコルヒチンを投与中の患者

投与しないこと。コルヒチンの血中濃度上昇に伴う中毒症状が報告されている。[2.3、10.2 参照]

9.3 肝機能障害患者

肝機能障害を悪化させることがある。[11.1.3 参照]

9.3.1 肝機能障害患者でコルヒチンを投与中の患者

投与しないこと。コルヒチンの血中濃度上昇に伴う中毒症状が報告されている。[2.3、10.2 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の 有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与す ること。動物実験で、母動物に毒性があらわれる高用量 において、胎児毒性(心血管系の異常、口蓋裂、発育遅 延等)が報告されている。

なお、国外における試験で次のような報告がある。SD系ラット($15\sim150$ mg/kg/日)及びCD-1系マウス

 $(15\sim1,000 \text{mg/kg/H})$ において、それぞれ母動物に毒性があらわれる最高用量でラット胎児に心血管系異常並びにマウス胎児に口蓋裂が認められた。また、サル(35 $\sim70 \text{mg/kg/H}$) において、母動物に毒性があらわれる70 mg/kg/Hで9例中1例に低体重の胎児がみられたが、外表、内臓、骨格には異常は認められなかった。

また、ラットにクラリスロマイシン(160 mg/kg/H)、ランソプラゾール(50 mg/kg/H)及びアモキシシリン水和物(500 mg/kg/H)を併用投与した試験において、母動物での毒性の増強とともに胎児の発育抑制の増強が認められている。

さらに、ラットにクラリスロマイシン(50mg/kg/日以上)、ラベプラゾールナトリウム(25mg/kg/日)及びアモキシシリン水和物(400mg/kg/日以上)を4週間併用投与した試験で、雌で栄養状態の悪化が認められている。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行することが報告されている。

なお、動物実験(ラット)の乳汁中濃度は、血中濃度の約2.5倍で推移した。

9.7 小児等

低出生体重児及び新生児を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

一般に生理機能が低下しており、高い血中濃度が持続するおそれがある。[16.6.2 参照]

10. 相互作用

本剤は主としてCYP3Aにより代謝される。また、本剤は CYP3A、P-糖蛋白質 (P-gp) を阻害する。[16.4、 16.7.1 参照]

10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

		/13 0 10 10 10 10 10 1	
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
**	ピモジド ³⁾	QT延長、心室性不整脈	本剤のCYP3Aに
	[2.2、16.7.1 参照]	(Torsade de pointesを	対する阻害作用に
		含む)等の心血管系副作	より、左記薬剤の
		用が報告されている。	代謝が阻害され、
	エルゴタミン酒石	血管攣縮等の重篤な副作	それらの血中濃度
		用をおこすおそれがあ	
	イン・イソプロピ		がある。
	ルアンチピリン		
	[クリアミン]		
	ジヒドロエルゴタ		
	ミンメシル酸塩		
	[2.2、16.7.1 参照]		
44	スポレキサント	左記薬剤の血漿中濃度が	
44	[ベルソムラ]	顕著に上昇し、その作用	
	ダリドレキサント		
	塩酸塩	がある。	
	塩酸塩 「クービビック)	<i>い</i> める。	
	3.1		
	ボルノレキサント		
	水和物		
	[ボルズィ]		
	[2.2、16.7.1 参照]		
		ロミタピドの血中濃度が	
	酸塩	著しく上昇するおそれが	
	[ジャクスタピッド]	ある。	
	[2.2、16.7.1 参照]		
	タダラフィル	左記薬剤のクリアランス	
	[アドシルカ]	が高度に減少し、その作	
	[2.2、16.7.1 参照]		
		る。	
	チカグレロル	チカグレロルの血漿中濃	
	[ブリリンタ]	度が著しく上昇するおそ	
	[2.2、16.7.1 参照]	れがある。	
	イブルチニブ	イブルチニブの作用が増	
	[イムブルビカ]	強するおそれがある。	
	[2.2、16.7.1 参照]		
	イバブラジン塩酸塩	過度の徐脈があらわれる	
	[コララン]	ことがある。	
	[2.2、16.7.1 参照]		

	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
**	-114	腫瘍崩壊症候群の発現が	本剤のCYP3Aに
		増強するおそれがある。	対する阻害作用に
	慢性リンパ性白血	1,24,7 0 10 0 11 11 11 11	より、左記薬剤の
	病(小リンパ球性		代謝が阻害され、
	リンパ腫を含む)、		それらの血中濃度
	再発又は難治性の		が上昇する可能性
	マントル細胞リン		がある。
	パ腫の用量漸増期)		
	[ベネクレクスタ]		
	[2.2、16.7.1 参照]		
	ルラシドン塩酸塩	ルラシドンの血中濃度が	
	[ラツーダ]	上昇し、作用が増強する	
	[2.2、16.7.1 参照]	おそれがある。	
	アナモレリン塩酸塩	アナモレリンの血中濃度	
	[エドルミズ]	が上昇し、副作用の発現	
	[2.2、16.7.1 参照]		
		る。	
*	フィネレノン	フィネレノンの血中濃度	
	[ケレンディア]	が著しく上昇するおそれ	
	[2.2、16.7.1 参照]		
*		イサブコナゾールの血中	
	ム硫酸塩	濃度が上昇し作用が増強	
	[クレセンバ]	するおそれがある。	
atasta	[2.2、16.7.1 参照] ボクロスポリン	ボクロスポリンの血中濃	
**	ホクロスホリン [ルプキネス]	度が上昇し、その作用が	
		増強するおそれがある。	
<u> </u>	マバカムテン	マバカムテンの血中濃度	
***		が上昇し、副作用が増強	
		され、収縮機能障害によ	
	[2.21 10.1.1]////	る心不全のリスクが高ま	
		るおそれがある。	

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジゴキシン	嘔気、嘔吐、不整脈等が	本剤の腸内細菌叢
[16.7.1 参照]	報告されているので、ジ	に対する影響によ
	ゴキシンの血中濃度の推	り、ジゴキシンの
	移、自覚症状、心電図等	不活化が抑制され
	に注意し、異常が認めら	るか、もしくは
	れた場合には、投与量を	P-gpを介したジゴ
	調節する等の適切な処置	キシンの輸送が阻
	を行うこと。	害されることによ
		り、その血中濃度
		が上昇する。
	低血糖(意識障害に至る	
血糖降下剤	ことがある)が報告され	
[グリベンクラ		1 100000
ミド	られた場合には、投与を	可能性がある。
グリクラジド	中止し、ブドウ糖の投与	
グリメピリド		
等]	と。	
カルバマゼピン	左記薬剤の血中濃度上昇	
テオフィリン4),5)	に伴う作用の増強等の可	
	能性があるので、左記薬	
和物	剤の血中濃度の推移等に	
シクロスポリン	注意し、異常が認められ	る。
タクロリムス水和物	た場合には、投与量の調	
エベロリムス	節や中止等の適切な処置	
[16.7.1、16.7.2 参照]	を行うこと。	
アトルバスタチン	左記薬剤の血中濃度上昇	
カルシウム水和物6)		
シンバスタチン6)	告されているので、異常	
ロバスタチン(国	が認められた場合には、	
内未承認)	投与量の調節や中止等の	
[16.7.1 参照]	適切な処置を行うこと。	
	腎機能障害のある患者に	
	は特に注意すること。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	
コルヒチン	コルヒチンの血中濃度上	
[2.3、9.2.1、9.3.1、	昇に伴う中毒症状(汎血	
16.7.1 参照]	球減少、肝機能障害、筋肉痛、腹痛、嘔吐、下	
	肉佣、腹佣、嘔吐、下痢、発熱等)が報告され	
	ているので、異常が認め	
	られた場合には、投与量	
	の調節や中止等の適切な	
	処置を行うこと。	
ベンゾジアゼピン	左記薬剤の血中濃度上昇	
系薬剤	に伴う作用の増強等の可	
	能性があるので、異常が	
される薬剤) 「トリアゾラム7)	認められた場合には、投与量の調節や中止等の適	
	切な処置を行うこと。	
等]	なお、トルバプタンにお	
非定型抗精神病薬	いては、本剤との併用は	
(CYP3Aで代謝	避けることが望ましいと	
される薬剤)	されており、やむを得ず	
	併用する場合において	
フマル酸塩	は、トルバプタンの用量 調節を特に考慮するこ	
ブロナンセリン		
等]	J o	
ジソピラミド		
トルバプタン		
エプレレノン		
エレトリプタン臭		
化水素酸塩		
カルシウム拮抗剤 (CYP3Aで代謝		
される薬剤)		
〔ニフェジピン		
ベラパミル塩酸塩		
等]		
リオシグアト		
ジエノゲスト		
ホスホジエステラーゼ5阻害剤		
[シルデナフィ		
ルクエン酸塩9)		
タダラフィル		
〔シアリス、		
ザルティア〕		
等] クマリン系抗凝血剤		
ワルファリンカ		
リウム		
ドセタキセル水和物		
アベマシクリブ10)		
オキシコドン塩酸		
塩水和物11)		
フェンタニル/ フェンタニルクエ		
ン酸塩		
[16.7.1 参照]		
ベネトクラクス	ベネトクラクスの副作用	
(再発又は難治性の	が増強するおそれがある	
	ので、ベネトクラクスを	
	減量するとともに、患者の出態を増展する	
リンパ腫を含む の維持投与期、再	の状態を慎重に観察する	
の維持技与期、再 発又は難治性のマ	<u> </u>	
エスは無信任のマントル細胞リンパ		
腫の維持投与期、		
急性骨髄性白血病)		
[16.7.1 参照]		

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗凝固剤	左記薬剤の血中濃度上昇	本剤のCYP3A及
(CYP3Aで代謝	に伴う作用の増強等の可	びP-gpに対する阻
され、P-gpで排	能性があるので、異常が	害作用により、左
出される薬剤)	認められた場合には、投	記薬剤の代謝及び
[アピキサバン	与量の調節や中止等の適	排出が阻害され
リバーロキサバン]	切な処置を行うこと。	る。
(P-gpで排出さ		本剤のP-gpに対す
れる薬剤)		る阻害作用によ
[ダビガトラン		り、左記薬剤の排
エテキシラート		出が阻害される。
エドキサバント		
シル酸塩水和物]		
[16.7.1 参照]		
イトラコナゾール ¹²⁾	本剤の未変化体の血中濃	
HIVプロテアーゼ	度上昇による作用の増強	
阻害剤	等の可能性がある。	阻害作用により、
[リトナビル13)	また、イトラコナゾール	
ロピナビル・リ	の併用においては、イト	される。
トナビル	ラコナゾールの血中濃度	
ダルナビル エタ	上昇に伴う作用の増強等	
ノール付加物	の可能性がある。 異常が認められた場合に	
等] [16.4、16.7.1 参照]	は、投与量の調節や中止	
[10.4、10.7.1 参照]	等の適切な処置を行うこ	
	と。	
リファブチン ¹⁴⁾	左記薬剤の血中濃度上昇	本剤のCYP3Aに
エトラビリン15)	に伴う作用の増強等の可	対する阻害作用に
[16.4、16.7.1 参照]	能性がある。	より、左記薬剤の
[1011, 1011,12 \$ ////]	また、本剤の未変化体の	代謝が阻害され
	血中濃度が低下し、活性	る。
	代謝物の血中濃度が上昇	また、左記薬剤の
	し、本剤の作用が減弱す	CYP3A4に対する
	る可能性がある。	誘導作用により、
	異常が認められた場合に	本剤の代謝が促進
	は、投与量の調節や中止	される。
	等の適切な処置を行うこ	
	と。	
リファンピシン ¹⁶⁾	本剤の未変化体の血中濃	
エファビレンツ	度が低下し、活性代謝物	3A4に対する誘導
ネビラピン	の血中濃度が上昇する可	作用により、本剤
[16.4、16.7.1 参照]	能性がある。本剤の作用	の代謝が促進され
	が減弱する可能性がある	る。
	ので、投与量の調節や中	
	止等の適切な処置を行う	
天然ケイ酸アルミ	こと。 本剤の吸収が低下すると	ナ扫帯刻の皿羊ル
大然ケイ酸アルミ ニウム ¹⁷⁾	本剤の吸収が低下すると の報告がある。	左記薬剤の吸着作 用によるものと考
	ツ形ログのる。	えられる。
		んりれる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な 処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

- **11.1.1 ショック、アナフィラキシー** (いずれも頻度不明) 呼吸困難、痙攣、発赤等があらわれることがある。
- 11.1.2 QT延長、心室頻拍 (Torsade de pointesを含む)、 心室細動 (いずれも頻度不明)

QT延長等の心疾患のある患者、低カリウム血症のある患者においては特に注意すること。[9.1.2 参照]

11.1.3 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全(いずれも頻度 不明)

劇症肝炎、AST、ALT、 γ -GTP、LDH、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸、肝不全があらわれることがある。[9.3参照]

- 11.1.4 血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、 無顆粒球症(いずれも頻度不明) [8.2 参照]
- 11.1.5 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑(いずれも頻度不明) 異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.6 PIE症候群・間質性肺炎(いずれも頻度不明)

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.7 偽膜性大腸炎、出血性大腸炎(いずれも頻度不明)

偽膜性大腸炎、出血性大腸炎等の重篤な大腸炎があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.8 横紋筋融解症(頻度不明)

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇があらわれることがある。横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

11.1.9 痙攣(頻度不明)

瘞攣(強直間代性、ミオクロヌス、意識消失発作等) があらわれることがある。

11.1.10 急性腎障害、尿細管間質性腎炎(いずれも頻度不明)

乏尿等の症状や血中クレアチニン値上昇等の腎機能低 下所見が認められた場合には、投与を中止し、適切な 処置を行うこと。

11.1.11 IgA血管炎(頻度不明)

11.1.12 薬剤性過敏症症候群18) (頻度不明)

初期症状として発疹、発熱がみられ、さらに肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

11.2 その他の副作用

〈一般感染症〉

	0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症	発疹	そう痒感	
精神神経系		めまい頭痛	幻覚 失意 意 き き を は病 眠気 、 振い で で で で で で で で で で で で で
感覚器		味覚異常(にがみ等)	耳鳴 聴力低下 嗅覚異常
消化器	悪心 嘔吐 胃部不快感 腹部膨満感 腹痛 下痢	食欲不振 軟便 口内炎 舌炎 口渇	口腔内びらん 胸やけ 歯牙変色 舌変色
血液	好酸球増多		
肝臓	AST上昇 ALT上昇 γ-GTP上昇 LDH上昇 Al-P上昇		
筋・骨格			筋肉痛
その他		倦怠感 浮腫 カンジダ症 発熱	動悸 CK上昇 脱毛 頻尿 低血糖

〈非結核性抗酸菌症〉

(2)[1	后修性机酸困亚		
	5~10%未満	1~5%未満	頻度不明
精神神経		不眠症	頭痛
系			めまい
			激越
			神経過敏症
			感覚異常
			痙攣
			妄想
			~
			幻覚
			運動過多
			躁病反応
			偏執反応
			末梢神経炎
			精神病
感覚器		味覚減退	味覚倒錯
			難聴
			耳鳴
			味覚喪失
			結膜炎
皮膚		発疹	和族火 そう痒感
汉間		光/多	
			斑状丘疹状皮疹
			ざ瘡
			帯状疱疹
			紫斑皮疹
			光線過敏性反応
			発汗
消化器	下痢	悪心	鼓腸放屁
		食欲不振	消化不良
		腹痛	便秘
		嘔吐	おくび
		逆流性食道炎	口渇
		之加工及之人	舌炎
			舌変色
rfn VIE		台面 話述人	口及已
血液		白血球減少	
		貧血	
		再生不良性貧血	
		好中球減少	
		骨髄機能不全	
肝臓	肝機能異常	γ-GTP上昇	AST上昇
		Al-P上昇	ALT上昇
			胆汁うっ滞性黄疸
			肝炎
			ビリルビン上昇
腎臓		急性腎障害	BUN上昇
日ル以		心压日件口	クレアチニン上昇
4 猫 叫		フ.合願却しか田形子	
生殖器		子宮頸部上皮異形成	
筋・骨格			筋肉痛
			関節痛
その他		高脂血症	無力症
		トリグリセリド上昇	アミラーゼ上昇
		高尿酸血症	カンジダ症
		低カリウム血症	疼痛
		徐脈	しゃっくり
		na ratif	発熱
			胸痛
			さむけ
1			酵素上昇

後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性MAC症を対象とした試験で認められた副作用である。

頻度は承認時の国内臨床試験及び製造販売後の使用成績調査の合算に基づいている。

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

	5%以上	1~5%未満	1%未満
過敏症		発疹	そう痒
精神神経			頭痛
系			しびれ感
			めまい
			眠気
			不眠
			うつ状態

	5%以上	1~5%未満	1%未満
消化器	1	腹痛 腹部膨満感 口内炎 便秘 食道炎	口渇 悪舌炎 道逆流 胸やけ 十二指腸炎 嘔核 食欲不振
血液		好中球減少 好酸球増多	貧血 白血球増多 血小板減少
肝臓		AST上昇 ALT上昇 LDH上昇 γ-GTP上昇	Al-P上昇 ビリルビン上昇
その他		尿蛋白陽性 トリグリセリド上昇 総コレステロール上 昇・減少	7 4 - 11/2 - 1

表中の副作用は胃潰瘍・十二指腸潰瘍における除菌療法(3剤併用:プロトンポンプインヒビターがランソプラゾール、オメプラゾール、ラベプラゾールナトリウムの場合)の承認時の国内臨床試験成績(アモキシシリン水和物及びオメプラゾールとの併用の場合の用法・用量変更時の製造販売後臨床試験を含む)に基づいている。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

ランソプラゾール等のプロトンポンプインヒビターやアモキシシリン水和物、クラリスロマイシン等の抗生物質の服用中や投与終了直後では、¹³C-尿素呼気試験の判定結果が偽陰性になる可能性があるため、¹³C-尿素呼気試験による除菌判定を行う場合には、これらの薬剤の投与終了後4週以降の時点で実施することが望ましい。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.2 非臨床試験に基づく情報

ラットにアモキシシリン水和物(2,000mg/kg/日)とランソプラゾール(15mg/kg/日以上)の4週間併用経口投与した試験、及びイヌにアモキシシリン水和物(500mg/kg/日)、ランソプラゾール(100mg/kg/日)、クラリスロマイシン(25mg/kg/日)の4週間併用経口投与した試験で、アモキシシリン水和物を単独あるいは併用投与した動物に結晶尿が認められているが、結晶はアモキシシリン水和物が排尿後に析出したものであり、体内で析出したものではないことが確認されている。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人に200mg、400mg(力価)を空腹時単回経口投与したときの平均血清中濃度及び各パラメータの値は以下のようであった 19)。なお、個体間のバラツキは少なかった。

	測定法	Cmax (µg/mL)	T _{max} (hr)	T1/2 (hr)	AUC (μg·hr/mL)
成人 (n=8) 200mg	Bioassay	1.16	1.9	4.04	8.98
成人 (n=8) 400mg	Bioassay	2.24	2.7	4.36	20.30

健康成人に200mg(力価)を空腹時に単回経口投与し、高速液体クロマトグラフ(HPLC)法で測定したところ、血清中には未変化体及び活性代謝物の14位水酸化体がほぼ同量存在し、その合算値はBioassayで測定した濃度とほぼ一致した²⁰⁾。

16.1.2 反復投与

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

健康成人にアモキシシリン水和物、プロトンポンプインヒビターと併用して400mg(力価)を1日2回7日間反復経口投与したときの平均血中濃度及び各パラメータの値は以下のようであった $^{21)}$ $^{-24}$)。

10000 0 0000 0						
		測定法	Cmax (µg/mL)	T _{max} (hr)	T1/2 (hr)	AUC0-12 (μg·hr/mL)
成人(n=7)400mg、アモキ シシリン水和物1,000mg、ラ ンソプラゾール30mg併用 時 ^{注1)}		HPLC 未変化体	2.42	2.7	4.4	18.45
		HPLC 代謝物	0.97	2.6	8.5	8.87
成人(n=11)400mg、アモキシシリン水和物1,000mg、オメプラゾール20mg併用時注1)		HPLC 未変化体	3.5	2.5	4.6	27.8注3)
# 1 400mm 7 7 7	EM ^{注2)} (n=15)	HPLC 未変化体	2.33	2.0注4)	6.43	17.50
成人400mg、アモキ シシリン水和物 750mg、ラベプラ		HPLC 代謝物	0.82	2.5注4)	9.71	7.65
バラOMg、フペッフ グールナトリウム 20mg併用時注1)	PM注2) (n=4)	HPLC 未変化体	1.99	2.5注4)	4.49	14.03
201118//////		HPLC 代謝物	0.95	2.5注4)	7.51	8.46
	太人 (n=11) 400mg、アモ		2.92	2.0注4)	4.62	18.26
キシシリン水和物750mg、ボ ノプラザン20mg併用時 ^{注1)}		LC/MS/MS 代謝物	0.88	2.0注4)	7.96	7.49

注1) ヘリコバクター・ピロリ感染症に対する承認用法・用量では、クラリスロマイシンは1回200mg (必要に応じて上限400mgまで適宜増量することができる)、アモキシシリン水和物は1回750mg、プロトンポンプインヒビターのラベプラゾールナトリウムは1回10mgである。

注2) 肝代謝酵素チトクロームP450 2C19遺伝子型

EM; extensive metabolizer

PM; poor metabolizer

注3) AUC_{0-∞} (μg·hr/mL)


注4) 中央値

16.1.3 生物学的同等性試験

クラリスロマイシン錠200mg 「NPI」とクラリス錠200を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(クラリスロマイシンとして200mg(力価))健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、 C_{max})について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $log(0.80) \sim log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された 25 。

	判定パラメータ		参考パラメータ		
	AUC0-12	Cmax	Tmax	T1/2	
	(μg·hr/mL)	(μg/mL)	(hr)	(hr)	
クラリスロマイシン 錠200mg「NPI」	2.996±1.135	0.514±0.223	2.05±0.58	3.60±0.81	
クラリス錠200	2.947±1.179	0.490±0.165	2.03 ± 0.41	3.51 ± 0.85	

 $(Mean \pm S.D., n=20)$



血漿中濃度並びにAUC、C_{max}等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 バイオアベイラビリティ

健康成人において、クラリスロマイシン錠剤 (250mg) を経口投与した場合 (2回測定) とクラリスロマイシンラクトビオン酸塩を静脈内投与した場合の薬物速度論的パラメータを比較検討した。その結果、未変化体のバイオアベイラビリティは52、55%であったが、初回通過効果によって生成される活性代謝物 (14位水酸化体) を含めたパラメータ解析結果から、クラリスロマイシンは経口投与後ほぼ完全に吸収されていることが示唆された²⁶⁾ (海外データ)。

16.2.2 食事の影響

健康成人に200mg (力価) を単回経口投与したときの血清中濃度には、食事の影響がほとんど認められなかった19)。

16.3 分布

健康成人における唾液 27 、また、患者における喀痰 28 、気管支分泌物 29)等への移行性を測定した結果、それぞれの組織への移行は良好で、血清中濃度と同等もしくはそれ以上の濃度を示した。また、皮膚 30 、扁桃 31 、上顎洞粘膜 31)等の組織中濃度はほとんどの例で血清中濃度を大きく上まわった。なお、ヒト血清蛋白結合率は $42\sim50\%$ であった 32 ($in\ vitro$)。

16.4 代謝

ヒトにおける主代謝物は14位水酸化体であり、血清中には未変化体とほぼ同量存在した 20)。

ヒト肝ミクロソームを用いた $in\ vitro$ 試験において、クラリスロマイシンは主としてCYP3Aで代謝されることが報告されている 33 。[10.、16.7.1参照]

16.5 排泄

健康成人に200mg (力価)を空腹時に単回経口投与し、Bioassayで測定したところ、投与後24時間までに投与量の38.3%が尿中へ排泄された¹⁹⁾。尿中には主に未変化体及び活性代謝物の14位水酸化体が認められた²⁰⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害者

腎機能正常者と種々な程度の腎機能障害者に200mg(力価)を空腹時単回経口投与し、クレアチニンクリアランス (Ccr) とその体内動態との関係を検討した結果、腎機能の低下に伴って C_{max} の上昇、 $T_{1/2}$ の延長及びAUCの増加が認められた 34 (測定法:Bioassay)。[9.2 参照]

クレアチニン クリアランス (mL/min)	C _{max} (μg/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)	AUC (μg·hr/mL)
Ccr = 100 (n=5)	2.02	1.24	2.38	8.89
Ccr = 50 (n=5)	2.15	1.89	5.74	21.69
Ccr ⇒ 30 (n=5)	2.55	0.96	4.69	18.73
Ccr≒ 5 (n=5)	3.54	1.48	6.13	36.89

16.6.2 高齢者

重篤な基礎疾患のない $66\sim82$ 歳(平均72.2歳)の女性3名に200mg(力価)を空腹時単回経口投与し、その体内動態を検討した結果、健康成人と比べると T_{max} 、 $T_{1/2}$ はほぼ同様であったが、 C_{max} 、AUCは明らかに高かった35)(測定法: Bioassay)。[9.8参照]

	Cmax	Tmax	T _{1/2}	AUC
	(μg/mL)	(hr)	(hr)	(μg·hr/mL)
高齢者 (n=3)	3.72	2.3	4.2	19.20

16.7 薬物相互作用

16.7.1 in vitro試験成績

CYP3A、P-gpに対する阻害作用を有する^{36),37)}。[10.、16.4 参照]

16.7.2 テオフィリン

健康成人男性にテオフィリンを400mg及びクラリスロマイシンを300mg併用した結果、併用5日目でテオフィリンの血清中濃度は C_{max} で1.26倍、AUCで1.19倍上昇し、クリアランスは16.4%減少したが統計的に有意差は認められなかった 4)。

また、気管支喘息患児にテオフィリンを $300\sim600$ mg/dayで1日分2経口投与し、更にクラリスロマイシン600mg/dayを1日分2併用投与した結果、併用7日目においてテオフィリンの血清中濃度は有意な上昇を示した5)。[10.2参照]

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

成人を対象とした二重盲検比較試験を含む臨床試験の概要 は次のとおりである。

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

17.1.1 胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ 感染症に対する国内及び海外臨床試験

胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ 感染症に対する二重盲検比較試験、オープン試験でクラ リスロマイシンの有用性が認められた。

リスロマイングの有用性が認められた。						
疾患名	有効率(%)【有効以上】					
胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバク						
ター・ピロリ感染症 (除菌率)						
(ランソプラゾールとの併用の場合) 38)~42)						
胃潰瘍 (400mg) 注1)	87.5 (84/ 96)					
(800mg) 注 ²⁾	89.2 (83/ 93)					
十二指腸潰瘍 (400mg) 注1)	91.1 (82/ 90)					
(800mg) 注2)	83.7 (82/ 98)					
(米国:14日間投与) ^{注3)}	87.6 (197/225)					
(米国:10日間投与) ^{注3)}	83.7 (103/123)					
(英国: 7日間投与) ^{注4)}	90.4 (103/114)					
(オメプラゾールとの併用の場合) 43) ~46)						
胃・十二指腸潰瘍 (800mg) 注5)	78.8 (89/113)					
(400mg) 注6)	81.1 (116/143)					
(800mg) 注7)	80.0 (116/145)					
(海外:十二指腸潰瘍) 注8)	96.4 (106/110)					
(海外:胃潰瘍) 注8)	79.2 (38/ 48)					
(ラベプラゾールナトリウムとの併用の場						
合) 47) ~50)						
胃潰瘍 (400mg) ^{注9)}	87.7 (57/ 65)					
(800mg) 注10)	89.7 (61/ 68)					
十二指腸潰瘍 (400mg) 注9)	83.3 (45/ 54)					
(800mg) 注10)	87.8 (36/ 41)					
胃・十二指腸潰瘍(米国:10日間投与)注11)	86.0 (147/171)					
(米国: 7日間投与)注11)	84.3 (140/166)					
(欧州: 7日間投与) 注11)	93.8 (61/ 65)					
¥1) b=11=1=1=1=000 /±						

- 注1) クラリスロマイシンとして1回200mg (力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg (力価)及びランソプラゾールとして1回30mgの3剤を同時に1日2回7日間経口投与。
- 注2) クラリスロマイシンとして1回400mg (力価)、アモキシシリン水和 物として1回750mg (力価) 及びランソプラゾールとして1回30mg の3剤を同時に1日2回7日間経口投与。
- 注3) 十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症患者を対象とした臨床試験(クラリスロマイシンとして1回500mg (力価)、アモキシシリン水和物として1回1,000mg (力価)及びランソプラゾールとして1回30mgの3剤を同時に1日2回経口投与)。本剤の承認最大用量は800mgである。
- 注4) 十二指腸潰瘍等におけるヘリコバクター・ピロリ感染症患者を対象とした臨床試験(クラリスロマイシンとして1回250mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回1,000mg(力価)及びランソプラゾールとして1回30mgの3剤を同時に1日2回経口投与)。本剤の承認最大用量は800mgである。
- 注5) クラリスロマイシンとして1回400mg (力価)、アモキシシリン水和 物として1回750mg (力価) 及びオメプラゾールとして1回20mgの3 剤を同時に1日2回7日間経口投与。
- 注6) クラリスロマイシンとして1回200mg (力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg (力価)及びオメプラゾールとして1回20mgの3剤を同時に1日2回7日間経口投与 (国内の製造販売後臨床試験)。
- 注7) クラリスロマイシンとして1回400mg (力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg (力価)及びオメプラゾールとして1回20mgの3剤を同時に1日2回7日間経口投与 (国内の製造販売後臨床試験)。
- 注8) クラリスロマイシンとして1回500mg (力価)、アモキシシリン水和物として1回1,000mg (力価)及びオメプラゾールとして1回20mgの3剤を同時に1日2回経口投与。本剤の承認最大用量は800mgである。
- 注9) クラリスロマイシンとして1回200mg (力価)、アモキシシリン水和 物として1回750mg (力価) 及びラベプラゾールナトリウムとして1回10mgの3剤を同時に1日2回7日間経口投与。
- 注10) クラリスロマイシンとして1回400mg (力価)、アモキシシリン水 和物として1回750mg (力価) 及びラベプラゾールナトリウムとして1回10mgの3剤を同時に1日2回7日間経口投与。
- 注11) 胃・十二指腸潰瘍等におけるヘリコバクター・ピロリ感染症患者を対象とした臨床試験(クラリスロマイシンとして1回500mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回1,000mg(力価)及びラベプラゾールナトリウムとして1回20mgの3剤を同時に1日2回経口投与)。本剤の承認最大用量は800mgである。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

細菌の70Sリボソームの50Sサブユニットと結合し、蛋白合成を阻害する $^{51)}$, $^{52)}$ 。

18.2 薬理作用

18.2.1 抗菌作用

ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌の好気性グラム陽性菌 $^{53)}$ $^{-57)}$ 、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ属、カンピロバクター属等の一部のグラム陰性菌 $^{53)}$ $^{-57)}$ 、ペプトストレプトコッカス属 $^{58)}$ 、クラミジア属 $^{59)}$ 、マイコプラズマ属 $^{57)}$.60)、マイコバクテリウム属 $^{61)}$ 及びヘリコバクター・ピロリ $^{62)}$ に抗菌作用を示し、その作用は他のマクロライド系抗生物質と同等以上である($in\ vitro$)。

18.2.2 ヒト主代謝物14位水酸化体の抗菌力

未変化体とほぼ同等の抗菌力を有する 63 が、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC) 64)及びヘリコバクター・ピロリ 62)に対しては未変化体より弱い($in\ vitro$)。

18.2.3 動物感染モデルに対する作用


マウスの腹腔内感染53),54),56),57),63)、皮下感染53),56),57)、呼吸器感染症53),54),57),63) モデルにおいては、クラリスロマイシンの良好な組織移行性を反映し、優れた効果を示す。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称:クラリスロマイシン (clarithromycin)

化学名:(2R,3S,4S,5R,6R,8R,10R,11R,12S,13R)-5- $(3,4,6-Trideoxy-3-dimethylamino-<math>\beta$ -D-xylo-hexopyranosyloxy)-3- $(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-<math>\alpha$ -L-ribo-hexopyranosyloxy)-11,12-dihydroxy-6-methoxy-2,4,6,8,10,12-hexamethyl-9-oxopentadecan-13-olide

略号: CAM 化学構造式:



分子式: C₃₈H₆₉NO₁₃

分子量:747.95

性状:白色の結晶性の粉末で、味は苦い。アセトン又はクロロホルムにやや溶けやすく、メタノール、エタノール (95) 又はジエチルエーテルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。

融点:220~227℃

22. 包装

100錠 [10錠 (PTP) ×10] 500錠 [10錠 (PTP) ×50]

23. 主要文献

- 1) 厚生労働省健康局結核感染症課編:抗微生物薬適正使用の手 引き
- 2) Griffith DE, et al.: Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175(4): 367-416
- 3) Desta Z, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1999; 65(1): 10-20
- 4) 二木芳人ほか:Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 515-520
- 5) 辻本善樹ほか:日本小児アレルギー学会誌. 1989;3(1): 48-55
- 6) Jacobson TA.: Am J Cardiol. 2004; 94(9): 1140-1146
- 7) Greenblatt DJ, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1998; 64(3): 278-285
- 8) Yeates RA, et al.: Int J Clin Pharmacol Ther. 1997; 35(12): 577-579
- 9) Hedaya MA, et al.: Biopharm Drug Dispos. 2006; 27(2):103-110
- 10) Kulanthaivel P, et al.: Cancer Res. 2016; 76(14 suppl): CT153
- 11) Liukas A, et al.: J Clin Psychopharmacol. 2011; 31(3): 302-308
- 12) Hardin TC, et al.: Pharmacotherapy. 1997; 17(1): 195

- 13) Ouellet D, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1998; 64(4): 355-362
- 14) Hafner R, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1998; 42(3): 631-639
- 15) Kakuda TN, et al.: J Antimicrob Chemother. 2014; 69(3): 728-734
- 16) Wallace RJ Jr, et al.: J Infect Dis. 1995; 171(3): 747-750
- 17) 高橋賢成ほか:臨床薬理. 1995; 26(1): 149-150
- 18) 厚生労働省: 重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過敏 症症候群
- 19) 諏訪俊男ほか:Chemotherapy. 1988; 36(12): 921-932
- 20) 諏訪俊男ほか:Chemotherapy. 1988; 36(12): 933-940
- 21) ランソプラゾール、アモキシシリン併用反復経口投与時の薬物動態(クラリス錠200/クラリシッド錠200mg等:2000年9月22日承認、申請資料概要へ.3.(1))
- 22) オメプラゾール、アモキシシリン併用反復経口投与時の薬物 動態(クラリス錠200/クラリシッド錠200mg等:2002年4 月11日承認、申請資料概要へ.3.2).(3))
- 23) ラベプラゾール、アモキシシリン併用反復経口投与時の薬物 動態 (クラリス錠200/クラリシッド錠200mg等:2007年1 月26日承認、申請資料概要2.7.6.1)
- 24) ボノプラザン、アモキシシリン併用反復経口投与時の薬物動態(タケキャブ錠10mg・20mg:2014年12月26日承認、申請資料概要2.7.6.12)
- 25) 日本薬品工業株式会社:生物学的同等性に関する資料(社内 資料)
- 26) Chu SY, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36(5): 1147-1150
- 27) 佐々木次郎ほか:Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 1058-1073
- 28) 古賀宏延ほか: Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 698-714
- 29) 力富直人ほか: Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 715-728
- 30) 塙伸太郎ほか: Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 950-954
- 31) 宮崎康博ほか: Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 926-934
- 32) 諏訪俊男ほか:Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 213-226
- 33) Suzuki A, et al.: Drug Metab Pharmacokin. 2003; 18(2): 104-113
- 34) 瀧井昌英ほか: Chemotherapy. 1989; 37(1): 15-21
- 35) 足立暁ほか:Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 660-666
- 36) Mayhew BS, et al.: Drug Metab Dispos. 2000; 28(9): 1031-1037
- 37) Sonja E, et al.: Clin Pharmacokinet. 2007; 46(12): 1039-1049
- 38) Asaka M, et al.: Helicobacter. 2001; 6(3): 254-261
- 39) Schwartz H, et al.: Am J Gastroenterol. 1998; 93(4): 584-590
- 40) Fennerty MB, et al.: Arch Intern Med. 1998; 158(15): 1651-1656
- 41) Misiewicz JJ, et al.: Gut. 1997; 41(6): 735-739
- 42) 外国における成績 (クラリス錠200/クラリシッド錠200mg 等:2000年9月22日承認、申請資料概要ト.4.2.(1))
- 43) Kuwayama H, et al.: Clin Drug Invest. 2005; 25(5): 293-305
- 44) Higuchi K, et al.: Clin Drug Invest. 2006; 26(7): 403-
- 45) Lind T, et al.: Helicobacter. 1996; 1(3): 138-144
- 46) Malfertheiner P, et al.: Aliment Pharmacol Ther.1999; 13(6): 703-712
- 47) Kuwayama H, et al.: Aliment Pharmacol Ther. 2007; 25(9): 1105-1113
- 48) 国内第Ⅲ相試験(クラリス錠200/クラリシッド錠200mg 等:2007年1月26日承認、申請資料概要2.7.3.2)
- 49) 欧州第Ⅲ相試験(クラリス錠200/クラリシッド錠200mg 等:2007年1月26日承認、申請資料概要2.7.6.5)
- 50) 米国第Ⅲ相試験 (クラリス錠200/クラリシッド錠200mg 等:2007年1月26日承認、申請資料概要2.7.6.6)
- 51) 懸川友人ほか: Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 123-128

- 52) CAMの抗菌剤としての特性と耐性獲得機序 (クラリス錠 200/クラリシッド錠200mg等:2002年4月11日承認、申請 資料概要ホ.2.(1))
- 53) 小野武夫ほか: Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 1-34
- 54) 五島瑳智子ほか:Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 35-58
- 55) 横田健ほか: Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 59-70
- 56) 西野武志ほか:Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 95-110
- 57) 長手尊俊ほか:Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 129-155
- 58) 加藤直樹ほか:Chemotherapy. 1988;36(S-3):71-81
- 59) 吉沢花子ほか:Chemotherapy. 1988;36(S-3):117-122
- 60) 洲崎健ほか:Chemotherapy. 1988; 36(S-3):111-116
- 61) Brown BA, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36(9): 1987-1990
- 62) Cederbrant G, et al.: J Antimicrob Chemother. 1994; 34(6): 1025-1029
- 63) 長手尊俊ほか: Chemotherapy. 1988; 36(S-3): 156-169
- 64) Cohen Y, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36(10): 2104-2107

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本薬品工業株式会社 安全管理課 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目2番3号 TEL 03-5833-5011 FAX 03-5833-5100

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

