

\*\*2025年5月改訂（第3版）  
\*2024年9月改訂（第2版）

日本標準商品分類番号  
872149

貯法：室温保存  
有効期間：3年

	承認番号	販売開始
配合錠LD	22600AMX00294000	2014年6月
配合錠HD	22700AMX00807000	2015年12月

持続性ARB／利尿薬合剤

# 日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠

## ロサルヒド配合錠LD「JG」

## ロサルヒド配合錠HD「JG」

### LOSARHYD Combination Tablets

処方箋医薬品<sup>注</sup>

注)注意－医師等の処方箋により使用すること

#### 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 チアジド系薬剤又はその類似化合物（例えばコロタリドン等のスルフォアミド誘導体）に対する過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5 参照]
- 2.4 重篤な肝機能障害のある患者 [9.3.1 参照]
- 2.5 無尿の患者又は透析患者 [9.2.1 参照]
- 2.6 急性腎障害の患者 [9.2.2 参照]
- 2.7 体液中のナトリウム・カリウムが明らかに減少している患者 [低ナトリウム血症、低カリウム血症等の電解質失調を悪化させるおそれがある。] [9.1.2、11.1.7、11.1.15 参照]
- 2.8 アリスケレンを投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く） [10.1 参照]
- 2.9 デスモプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者 [10.1 参照]

#### 3. 組成・性状

##### 3.1 組成

販売名	有効成分 (1錠中)	添加剤
ロサルヒド配合錠LD「JG」	日局 ロサルタンカリウム 50.00mg 日局 ヒドロクロロチアジド 12.50mg	乳糖水和物、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、カルナバウ
ロサルヒド配合錠HD「JG」	日局 ロサルタンカリウム 100.00mg 日局 ヒドロクロロチアジド 12.50mg	乳糖水和物、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、カルナバウ

##### 3.2 製剤の性状

販売名	色・剤形	外形・大きさ・重量			識別コード/ 本体表示
		表面	裏面	側面	
ロサルヒド配合錠LD「JG」	白色円形のフィルムコーティング錠				JG E59
		直径 9.1mm	厚さ 3.8mm	重量 260mg	
ロサルヒド配合錠HD「JG」	白色の楕円形のフィルムコーティング錠				ロサルヒド HD JG
		長径 13.7mm	短径 6.9mm	厚さ 5.2mm	

#### 4. 効能又は効果

##### 高血圧症

#### 5. 効能又は効果に関連する注意

過度な血圧低下のおそれ等があり、本剤を高血圧治療の第一選択薬としないこと。

#### 6. 用法及び用量

成人には1日1回1錠（ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして50mg/12.5mg又は100mg/12.5mg）を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。

#### 7. 用法及び用量に関連する注意

原則として、ロサルタンカリウム50mgで効果不十分な場合にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして50mg/12.5mgの投与を、ロサルタンカリウム100mg又はロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして50mg/12.5mgで効果不十分な場合にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして100mg/12.5mgの投与を検討すること。 [8.1 参照]

#### 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤はロサルタンカリウム50mgあるいは100mgとヒドロクロロチアジド12.5mgの配合剤であり、ロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジド双方の副作用が発現するおそれがあり、適切に本剤の使用を検討すること。 [7. 参照]
- 8.2 一過性の血圧低下（ショック症状、意識消失、呼吸困難等を伴う）を起こすおそれがあるので、本剤投与中は定期的（投与開始時：2週間ごと、安定後：月1回程度）に血圧のモニタリングを実施すること。
- 8.3 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは低カリウム血症を起こすことが知られている。ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして50mg/12.5mgが投与された国内臨床試験において、血清カリウム値は低下傾向を示し、また低カリウム血症の発現頻度は高カリウム血症よりも高かった。したがって、低カリウム血症の発現がより懸念されるので、血清カリウム値のモニタリングを定期的実施し、観察を十分に行うこと。 [9.1.2、11.1.7 参照]
- 8.4 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは高尿酸血症を発現させるおそれがあるので、本剤投与中は定期的な血清尿酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。 [9.1.8 参照]
- 8.5 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは血糖値上昇若しくは糖尿病顕性化のおそれがあるので、観察を十分に行うこと。 [9.1.8 参照]
- 8.6 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは重篤な血液障害を発現させるおそれがあるので、定期的な検査を実施するなど観察を十分に行うこと。 [11.1.10 参照]
- 8.7 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 8.8 手術前24時間は投与しないことが望ましい。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中の患者は、麻酔及び手術中にレニン・アンジオテンシン系の抑制作用による高度な血圧低下を起こすおそれがある。
- 8.9 本剤の成分を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中にまれに肝炎等の重篤な肝障害があらわれたとの報告がある。肝機能検査を実施するなど、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

- 8.10 本剤の投与により利尿効果が急激にあらわれることがあるので、電解質失調、脱水に十分注意すること。
- 8.11 夜間の休息が特に必要な患者には、夜間の排尿を避けるため、午前中に投与することが望ましい。
- \* \* 8.12 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出を発現させるおそれがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には、直ちに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。[11.1.16 参照]
- 9. 特定の背景を有する患者に関する注意**
- 9.1 合併症・既往歴等のある患者**
- 9.1.1 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者**  
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。腎血流量の減少や糸球体過剰圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがある。
- 9.1.2 血清カリウム値異常のある患者**  
低カリウム血症又は高カリウム血症を起こすおそれがある。[2.7、8.3、9.1.3、11.1.7 参照]
- 9.1.3 高カリウム血症のある患者**  
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。本剤の成分であるロサルタンカリウムは、高カリウム血症を増悪させるおそれがある。  
また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値のモニタリングを定期的に行い、観察を十分に行うこと。[9.1.2、11.1.7 参照]
- 9.1.4 脳血管障害のある患者**  
過度の降圧が脳血流不全を惹起し、病態を悪化させるおそれがある。
- 9.1.5 体液量が減少している患者（水分摂取の不十分な患者、過度の発汗をしている患者）**  
一過性の血圧低下を起こすおそれがある。[11.1.5 参照]
- 9.1.6 減塩療法中の患者**  
低ナトリウム血症を起こすおそれがある。特に、嚴重な減塩療法中の患者では、一過性の血圧低下を起こすおそれがある。[11.1.5、11.1.15 参照]
- 9.1.7 重篤な冠動脈硬化症又は脳動脈硬化症のある患者**  
急激な利尿があらわれた場合、急速な血漿量減少、血液濃縮を来し、血栓塞栓症を誘発するおそれがある。
- 9.1.8 本人又は両親、兄弟に痛風、糖尿病のある患者、及び高尿酸血症のある患者**  
高尿酸血症、高血糖症を来し、痛風、糖尿病の悪化や顕性化のおそれがある。[8.4、8.5 参照]
- 9.1.9 下痢、嘔吐のある患者**  
電解質失調があらわれるおそれがある。
- 9.1.10 高カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症のある患者**  
血清カルシウムを上昇させるおそれがある。
- 9.1.11 交感神経切除後の患者**  
本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。
- 9.2 腎機能障害患者**
- 9.2.1 無尿の患者又は透析患者**  
投与しないこと。[2.5 参照]
- 9.2.2 急性腎障害の患者**  
投与しないこと。腎機能を更に悪化させるおそれがある。[2.6 参照]
- 9.2.3 腎機能障害患者（血清クレアチニン値 2.0mg/dL超）**  
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。ヒドロクロロチアジドにより腎血流量が低下し、ロサルタンカリウムにより腎機能障害が悪化するおそれがある。
- 9.2.4 腎機能低下患者（血清クレアチニン値 1.5～2.0mg/dL）**  
本剤投与中は定期的に血清クレアチニン値及び血清尿酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。血清クレアチニン値上昇及び血清尿酸値上昇のおそれがある。
- 9.3 肝機能障害患者**
- 9.3.1 重篤な肝機能障害のある患者**  
投与しないこと。[2.4、9.3.2 参照]
- 9.3.2 肝機能障害又はその既往のある患者（ただし、重篤な肝機能障害のある患者を除く）**  
外国において、軽・中等度のアルコール性肝硬変患者にロサルタンカリウム50mgを単回経口投与すると、健康成人と比較してロサルタンの消失速度が遅延し、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約5倍及び約2倍に上昇することが報告されている。また、ヒドロクロロチアジドは肝性昏睡を誘発するおそれがある。[9.3.1 参照]
- 9.4 生殖能を有する者**
- 9.4.1 妊娠する可能性のある女性**  
妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響（腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等）が認められた例が報告されている<sup>1),2)</sup>。  
本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。[9.5 参照]
- (1) 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。
- (2) 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。また、投与中も必要に応じ説明すること。
- ・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
  - ・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
  - ・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。
- 9.5 妊婦**  
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。妊娠中期及び末期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を投与された患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、多臓器不全、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の奇形、肺の低形成等があらわれたとの報告がある。なお、チアジド系薬剤では新生児又は乳児に高ビリルビン血症、血小板減少症等を起こすことがある。また、利尿効果に基づく血漿量減少、血液濃縮、子宮・胎盤血流量減少があらわれることがある。[2.3、9.4.1 参照]
- 9.6 授乳婦**  
授乳しないことが望ましい。ラットの周産期及び授乳期にロサルタンカリウム1mg/kg/day/ヒドロクロロチアジド0.25mg/kg/day～ロサルタンカリウム50mg/kg/day/ヒドロクロロチアジド12.5mg/kg/dayを投与した試験において、ロサルタンカリウム50mg/kg/day/ヒドロクロロチアジド12.5mg/kg/day群で産児体重の減少及び腎の病理組織学的変化がみられた。また、ロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドの乳汁移行性も確認された。本試験の産児に対する無毒性量はロサルタンカリウム10mg/kg/day/ヒドロクロロチアジド2.5mg/kg/dayであった。ヒドロクロロチアジドは、ヒト母乳中への移行が報告されている。
- 9.7 小児等**  
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。乳児は電解質バランスがくずれやすい。
- 9.8 高齢者**
- 9.8.1** 一般に生理機能が低下している。
- 9.8.2** 一般に過度の降圧は好ましくないとされている。脳梗塞等が起こるおそれがある。
- 9.8.3** 高齢者でのロサルタンカリウム単独投与における薬物動態試験で、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度が非高齢者に比べて高かった（非高齢者に比較してロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約2倍及び約1.3倍に上昇）。
- 9.8.4** 急激な利尿は血漿量の減少を来し、脱水、低血圧等による立ちくらみ、めまい、失神等を起こすことがある。
- 9.8.5** 特に心疾患等で浮腫のある高齢者では急激な利尿は急速な血漿量の減少と血液濃縮を来し、脳梗塞等の血栓塞栓症を誘発するおそれがある。
- 9.8.6** 低ナトリウム血症、低カリウム血症があらわれやすい。

## 10. 相互作用

本剤の成分であるロスアルタンカリウムは、薬物代謝酵素チトクロームP450 2C9 (CYP2C9) 及び3A4 (CYP3A4) により活性代謝物であるカルボン酸体に代謝される。なお、本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは、ほとんど代謝されることなく尿中に排泄される。[16.4 参照]

### 10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスキレン ラジレス (糖尿病患者に使用する 場合。ただし、他の降圧 治療を行ってもなお血圧 のコントロールが著しく 不良の患者を除く。) [2.8 参照]	非致死性脳卒中、腎機能障 害、高カリウム血症及び低 血圧のリスク増加が報告さ れている。	レニン・アンジオテンシン系 阻害作用が増強される可能性 がある。
デスモプレシン酢酸塩水 和物 ミニリンメルト (男性における夜間多尿 による夜間頻尿) [2.9 参照]	低ナトリウム血症が発現す るおそれがある。	いずれも低ナトリウム血症が 発現するおそれがある。

### 10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤: スピロラクトン トリウムテン等 カリウム補給剤: 塩化カリウム トリメトプリム含有製剤: スルファミトキサゾール ・トリメトプリム	血清カリウム値が上昇する おそれがある。	本剤の成分であるロスアルタン カリウムとの併用によりカリ ウム貯留作用が増強するおそ れがある。腎機能障害のある 患者には特に注意すること。
利尿降圧剤: フロセミド トリクロルメチアジド 等 [11.1.5 参照]	一過性の血圧低下を起こす おそれがある。	利尿降圧剤で治療を受けてい る患者にはレニン活性が亢進 している患者が多く、本剤が 奏効しやすい。
アリスキレン	腎機能障害、高カリウム血 症及び低血圧を起こすおそ れがある。eGFRが60mL/ min/1.73m <sup>2</sup> 未満の腎機能 障害のある患者へのアリス キレンとの併用については、 治療上やむを得ないと 判断される場合を除き避け ること。	レニン・アンジオテンシン系 阻害作用が増強される可能性 がある。
アンジオテンシン変換酵 素阻害剤	腎機能障害、高カリウム血 症及び低血圧を起こすおそ れがある。	
バルビツール酸誘導体	起立性低血圧が増強され ることがある。	これらの薬剤の中核抑制作用 と本剤の成分であるヒドロク ロチアジドの降圧作用によ る。
あへんアルカロイド系麻 薬		本剤の成分であるヒドロク ロチアジドとあへんアルカ ロイドの大量投与で血圧下降 があらわれることが報告され ている。
アルコール		本剤の成分であるヒドロク ロチアジドと血管拡張作用を 有するアルコールとの併用 により降圧作用が増強される 可能性がある。
昇圧アミン: ノルアドレナリン アドレナリン	昇圧アミンの作用を減弱す ることがある。 手術前の患者に使用する場 合、本剤の一時休業等の処 置を講ずること。	本剤の成分であるヒドロク ロチアジドは昇圧アミンに対 する血管壁の反応性を低下さ せることが報告されている。
ツボクラリン及びその類 似作用物質: ツボクラリン塩化物塩 酸塩水合物	ツボクラリン及びその類似 作用物質の麻痺作用を増強 することがある。手術前の 患者に使用する場合、本剤 の一時休業等の処置を講ず ること。	本剤の成分であるヒドロク ロチアジドによる血清カリウ ム値の低下により、これらの 薬剤の神経・筋遮断作用を増 強すると考えられている。
降圧作用を有する他の薬 剤: β-遮断剤 ニトログリセリン等	降圧作用を増強するおそれ がある。降圧剤の用量調節 等に注意すること。	作用機序の異なる降圧作用に より互いに協力的に作用する。
ジギタリス剤: ジゴキシン	ジギタリスの心臓に対する 作用を増強し、不整脈等 を起こすことがある。血清カ リウム値に十分注意するこ と。	本剤の成分であるヒドロク ロチアジドによる血清カリウ ム値の低下により多量のジギ タリスが心筋Na-K ATPase に結合し、心収縮力増強と不 整脈が起こる。マグネシウム 低下も同様の作用を示す。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
乳酸ナトリウム	チアジド系薬剤による代謝 性アルカローシス、低カリ ウム血症を増強することが ある。	本剤の成分であるヒドロク ロチアジドのカリウム排泄作 用により低カリウム血症や代 謝性アルカローシスが引き起 こされることがある。アルカ リ化剤である乳酸ナトリウム の併用はこの状態を更に増強 させる。
リチウム: 炭酸リチウム	リチウム中毒が報告されて いる。血中リチウム濃度に 注意すること。  振戦、消化器愁訴等、リチ ウム中毒を増強することが ある。血清リチウム濃度に 注意すること。	本剤の成分であるロスアルタン カリウムのナトリウム排泄作 用により、リチウムの蓄積が 起こると考えられている。  本剤の成分であるヒドロク ロチアジドは腎におけるリチ ウムの再吸収を促進し、リチ ウムの血中濃度を上昇させる。
副腎皮質ホルモン剤 ACTH	低カリウム血症が発現する ことがある。	本剤の成分であるヒドロク ロチアジド及び副腎皮質ホル モン剤、ACTHともカリウム 排泄作用を持つ。
グリチルリチン製剤	血清カリウム値の低下があ らわれやすくなる。	グリチルリチン製剤は低カリ ウム血症を主徴とした偽アル ドステロン症を引き起こすこ とがある。したがって本剤の 成分であるヒドロクロロチア ジドとグリチルリチン製剤の 併用により低カリウム血症を 増強する可能性がある。
糖尿病用剤: SU剤 インスリン 速効型インスリン分泌 促進薬	糖尿病用剤の作用を著しく 減弱することがある。	機序は明確ではないが、本剤 の成分であるヒドロクロロチ アジドによるカリウム喪失に より膵臓のβ細胞のインスリン 放出が低下すると考えられ ている。
コレステラミン	チアジド系薬剤の作用が減 弱することがある。	コレステラミンの吸着作用に より本剤の成分であるヒドロ クロロチアジドの吸収が阻害 されることがある。
非ステロイド性消炎鎮痛 剤: インドメタシン等	降圧作用が減弱されるおそ れがある。  腎機能が悪化している患者 では、さらに腎機能が悪化 するおそれがある。  チアジド系薬剤の作用が減 弱することがある。	プロスタグランジンの合成阻 害作用により、本剤の降圧作 用を減弱させる可能性がある。  プロスタグランジンの合成阻 害作用により、腎血流量が低 下するためと考えられる。  非ステロイド性消炎鎮痛剤の プロスタグランジン合成酵素 阻害作用により、腎内プロス タグランジンが減少し、水・ ナトリウムの体内貯留が生じ て本剤の成分であるヒドロク ロチアジドの作用と拮抗す る。
グレープフルーツジュ ース	降圧作用が減弱されるおそ れがある。本剤の投与中は グレープフルーツジュース の摂取は避けること。	グレープフルーツジュースに 含まれる成分のCYP3A4阻害 作用により本剤の有効成分で あるロスアルタンカリウムの 活性代謝物の血中濃度が低下 するため、本剤の降圧作用が 減弱されるおそれがある。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 アナフィラキシー (頻度不明)

不快感、口内異常感、発汗、蕁麻疹、呼吸困難、全身潮紅、浮腫等があらわれることがある。

#### 11.1.2 血管浮腫 (頻度不明)

顔面、口唇、咽頭、舌等の腫脹があらわれることがある。

#### 11.1.3 急性肝炎又は劇症肝炎 (いずれも頻度不明)

#### 11.1.4 急性腎障害 (頻度不明)

#### 11.1.5 ショック、失神、意識消失 (いずれも頻度不明)

冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。[9.1.5、9.1.6、10.2 参照]

#### 11.1.6 横紋筋融解症 (頻度不明)

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

#### 11.1.7 低カリウム血症、高カリウム血症 (いずれも頻度不明)

血清カリウム値の異常変動に伴い、倦怠感、脱力感、不整脈等があらわれることがある。[2.7、8.3、9.1.2、9.1.3 参照]

11.1.8 不整脈 (頻度不明)

心室性期外収縮、心房細動等の不整脈があらわれることがある。

11.1.9 汎血球減少、白血球減少、血小板減少 (いずれも頻度不明)

11.1.10 再生不良性貧血、溶血性貧血 (いずれも頻度不明)

[8.6 参照]

11.1.11 壊死性血管炎 (頻度不明)

11.1.12 間質性肺炎、肺水腫、急性呼吸窮迫症候群 (いずれも頻度不明)

間質性肺炎、肺水腫があらわれることがある。また、ヒドロクロロチアジド服用後、数分から数時間以内に急性呼吸窮迫症候群が発現したとの報告がある<sup>3)-6)</sup>。

11.1.13 全身性エリテマトーデスの悪化 (頻度不明)

11.1.14 低血糖 (頻度不明)

脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。糖尿病治療中の患者であられやすい。

11.1.15 低ナトリウム血症 (頻度不明)

倦怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、痙攣、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがある。[2.7、9.1.6 参照]

\* \* 11.1.16 急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出 (いずれも頻度不明)

急性近視 (霧視、視力低下等を含む)、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出があらわれることがある。[8.12 参照]

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満 <sup>2)</sup>	頻度不明
精神神経系	めまい、浮遊感、眠気、頭痛	耳鳴、不眠、知覚異常
循環器系	低血圧、起立性低血圧、動悸	調律障害 (頻脈等)、胸痛
消化器	嘔吐・嘔気	口内炎、下痢、口角炎、胃不快感、胃潰瘍、腹部仙痛、膝炎、唾液腺炎、便秘、食欲不振、腹部不快感、口渇
肝臓	黄疸、肝機能障害 (AST上昇、ALT上昇、LDH上昇等)	
腎臓	BUN上昇、クレアチニン上昇	
皮膚	発疹、蕁麻疹	多形紅斑、光線過敏、紅皮症、紅斑、そう痒、顔面潮紅、皮膚エリテマトーデス
血液	貧血、赤血球数増加、赤血球数減少、ヘマトクリット低下、ヘマトクリット上昇、ヘモグロビン増加、白血球数増加、リンパ球数増加	好酸球数増加、好中球百分率増加、リンパ球数減少
その他	倦怠感、CK上昇、高尿酸血症、高血糖症、頸部異和感、多汗、頻尿、CRP増加、尿中ブドウ糖陽性、尿中赤血球陽性、尿中白血球陽性、尿中蛋白陽性、BNP増加	発熱、味覚障害、しびれ感、眼症状 (かすみ、異和感等)、黄視症、ほてり、浮腫、筋肉痛、咳嗽、低マグネシウム血症、低クロール性アルカローシス、血清カルシウム増加、インポテンシ、高カルシウム血症を伴う副甲状腺障害、筋痙攣、関節痛、鼻閉、紫斑、呼吸困難、血清脂質増加、女性化乳房

注) ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドとして100mg/12.5mg、50mg/12.5mg、50mg/6.25mg、25mg/6.25mgを投与した臨床試験を含む。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

甲状腺障害のない患者の血清PBIを低下させることがある。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

海外で実施された疫学研究において、ヒドロクロロチアジドを投与された患者で、基底細胞癌及び有棘細胞癌のリスクが増加することが報告されている<sup>7), 8)</sup>。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人にロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgを単回経口投与すると、ロサルタン及びカルボン酸体は、それぞれ投与後1.4及び3.7時間に最高血漿中濃度 (C<sub>max</sub>)

に達し、消失半減期 (t<sub>1/2</sub>) 1.7及び5.8時間で消失した。ヒドロクロロチアジドの血漿中濃度は、投与後2.8時間でC<sub>max</sub>に達し、t<sub>1/2</sub>は7.9時間であった<sup>9)</sup>。

表 健康成人におけるロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgを単回経口投与後の薬物動態パラメータ

	ロサルタンカリウム50mg/ ヒドロクロロチアジド12.5mg		
	ロサルタン	カルボン酸体	ヒドロクロロチアジド
C <sub>max</sub> (ng/mL)	291.0±96.9	592.9±137.4	95.9±20.9
T <sub>max</sub> (hr)	1.4±0.8	3.7±1.2	2.8±0.9
AUC <sub>0-∞</sub> (ng·hr/mL)	504.8±180.2	3674.1±680.2	516.2±89.8
t <sub>1/2</sub> (hr)	1.7±0.6	5.8±1.1	7.9±1.2

n=11、平均±標準偏差 (C<sub>max</sub>、AUC：幾何平均、T<sub>max</sub>：算術平均、t<sub>1/2</sub>：調和平均)

16.1.2 反復投与

軽症及び中等症の本態性高血圧症患者にロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgを1日1回14日間反復経口投与した時、血漿中ロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドのいずれにも蓄積性は認められなかった<sup>10)</sup>。

16.1.3 生物学的同等性試験

ロサルヒド配合錠LD [JG] とプレミネント配合錠LDを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠 (ロサルタンカリウム50mg、ヒドロクロロチアジド12.5mg) を健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中ロサルタン濃度及び血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、C<sub>max</sub>) について統計解析を行い、生物学的同等性を検証した<sup>11)</sup>。


ロサルタンでは、AUCについては対数値の平均値の差の90%信頼区間はlog (0.80)~log (1.25)の範囲内であった。また、C<sub>max</sub>については対数値の平均値の差はlog (0.90)~log (1.11)の範囲にあり、かつ、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン (平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号 別紙1)」に従った溶出試験で溶出挙動が類似していたことから、生物学的に同等であると判定された。

ヒドロクロロチアジドでは、AUC及びC<sub>max</sub>の対数値の平均値の差の90%信頼区間はそれぞれlog (0.80)~log (1.25)の範囲内であり、生物学的に同等であると判定された。

以上より、ロサルタン及びヒドロクロロチアジドについて生物学的同等性の判定基準を満たしていることから、両剤の生物学的同等性が確認された。

(1) ロサルタンカリウム

(ng/mL)




	薬物動態パラメータ			
	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-24</sub> (ng·hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
ロサルヒド配合錠LD [JG]	451.89±154.61	199.38±99.70	1.7±1.0	2.4±0.9
プレミネント配合錠LD	440.08±133.84	216.21±107.16	1.7±1.0	2.2±0.5

(Mean±S.D., n=22)

血漿中濃度並びにAUC、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(2) ヒドロクロロチアジド



	薬物動態パラメータ 判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-24</sub> (ng·hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
ロサルヒド配合錠LD [JG]	530.14±102.95	90.83±24.80	2.8±1.0	7.9±1.6
プレミメント配合錠LD	542.49±124.12	94.54±24.99	3.0±0.9	8.1±1.5

(Mean±S.D., n=22)

血漿中濃度並びにAUC、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

(1) 健康成人にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド 50mg/12.5mgを食後投与すると、空腹時投与に比べてロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドのいずれも最高血漿中濃度到達時間 (T<sub>max</sub>) が遅延 (0.7~1.7時間) し、ロサルタンの血漿中濃度-時間曲線下面積 (AUC) は差がなかったものの、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドのAUCがそれぞれ17%及び22%低下したが、臨床上問題とならない程度であった<sup>9)</sup>。

(2) 健康成人にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド 100mg/12.5mgを食後単回経口投与した場合、空腹時投与に比べてロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドのいずれもT<sub>max</sub>が遅延 (2.0~2.8時間) し、ロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドのAUCがそれぞれ22%、23%及び11%低下したが、臨床上問題とならない程度であった<sup>12)</sup>。

16.3 分布

ヒトにおけるロサルタン及びカルボン酸体の血漿蛋白結合率は、いずれも99%以上であった<sup>13)</sup>。

ヒドロクロロチアジドのヒト血清蛋白結合率は22%であった<sup>13)</sup>。

外国人におけるロサルタンの分布容積は34Lであった<sup>14)</sup>。

16.4 代謝

ヒトにおいて、ロサルタンは主としてカルボン酸体へ代謝され、この代謝には、主としてCYP2C9が関与した<sup>13)</sup>。

ヒトにおいてヒドロクロロチアジドはほとんど代謝されなかった<sup>13)</sup>。[10. 参照]

16.5 排泄

健康成人にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド 50mg/12.5mgを単回経口投与後48時間までに、ロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドが、尿中にそれぞれ投与量の3.7%、7.7%及び66.6%排泄された<sup>9)</sup>。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

腎機能障害を伴う高血圧症患者 (血清クレアチニン値1.5~2.5mg/dL) にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド 50mg/12.5mgを1日1回7日間反復経口投与した時のロサルタン及びカルボン酸体のC<sub>max</sub>は、腎機能正常患者に比べ1.2倍高く、AUC<sub>0-24hr</sub>は1.5~1.7倍高かった。ヒドロクロロチアジドのC<sub>max</sub>及びAUC<sub>0-24hr</sub>は、それぞれ腎機能正常患者の1.4倍及び2.2倍、腎クリアランスは27%であった<sup>15)</sup>。

16.6.2 高齢者

ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgを1日1回7日間反復経口投与後のロサルタン及びカルボン酸体

の血漿中濃度は、非高齢者と差はなく、ヒドロクロロチアジドの吸収も非高齢者と差がなかった<sup>16)</sup> (外国人データ)。

16.7 薬物相互作用

健康成人にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド 50mg/12.5mgを単回経口投与した後のロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドの血漿中濃度は、各単剤投与後と差がなく、ロサルタンとヒドロクロロチアジドとの薬物動態的な相互作用は認められなかった<sup>9)</sup>。

海外において、ロサルタンとシメチジン、フェノバルビタール、ワルファリン、ジゴキシン、ケトコナゾール及びエリスロマイシンとの相互作用について検討したが、いずれも臨床上問題となる薬物動態的な相互作用は認められなかった<sup>17)</sup>。ロサルタンとリファンピシン (代謝酵素誘導剤) との併用により、ロサルタン及びカルボン酸体の消失が速くなり、それらのAUCは減少した。また、ロサルタンとフルコナゾール (CYP2C9の阻害剤) の併用により、カルボン酸体のC<sub>max</sub>及びAUCが減少したが、ロサルタンのAUCは増加した<sup>18)</sup>。

16.8 その他


ロサルヒド配合錠HD [JG] は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン (平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号 別紙2)」に基づき、ロサルヒド配合錠LD [JG] を標準製剤とした溶出試験の結果、溶出挙動は同等と判定され、生物学的に同等とみなされた<sup>19)</sup>。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 第Ⅲ相二重盲検比較試験

日本人を対象とした二重盲検比較試験において、ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgはロサルタンカリウム50mg投与よりも有意に優れた降圧効果が認められた。降圧効果判定採用154例のうち有効 (拡張期血圧が90mmHg未満に又は10mmHg以上低下した症例) と判定された症例は112例 (73%) であった。なお、8週間時における拡張期血圧の平均変化量は下図のとおりであった<sup>20), 21)</sup>。



Pbo=プラセボ、L=ロサルタンカリウム、H=ヒドロクロロチアジド  
†主要評価項目のFAS解析対象例、‡平均値、§最小二乗平均値 (標準誤差)

ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgが投与された患者で自他覚症状の副作用が報告されたのは155例中14例 (9.0%) であり、主な副作用は浮動性めまい5例 (3.2%)、悪心2例 (1.3%) であった。また、臨床検査値の副作用が報告されたのは155例中22例 (14.2%) であり、主な臨床検査値の副作用は、尿酸増加8例 (5.3%)、ALT増加、CK増加各3例 (2.0%)、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、ヘモグロビン減少、AST増加、BUN増加各2例 (1.3%) であった。

また、ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgの副作用発現率は、プラセボと同程度であった<sup>20)</sup>。

17.1.2 国内第Ⅲ相長期投与試験

日本人を対象に長期の安全性を検討した第Ⅲ相試験において、ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgが投与された患者で自他覚症状の副作用が報告されたのは200例中28例 (14.0%) であり、主な副作用は頻尿6例 (3.0%)、浮動性めまい4例 (2.0%)、右脚ブロック、動悸、異常感、蕁麻疹各2例 (1.0%) であった。また、臨床検査値の副作用が報告されたのは200例中26例 (13.0%) であり、主な臨床検査値の副作用は尿酸増加6例 (3.0%)、ALT増加5例 (2.5%)、AST増

加、カリウム減少各4例(2.0%)、赤血球数減少、ヘマトクリット減少各3例(1.5%)、白血球数増加、ヘモグロビン減少、LDH増加、CK増加、尿中赤血球陽性各2例(1.0%)であった<sup>22)</sup>。

### 17.1.3 国内第Ⅲ相二重盲検比較試験

ロサルタンカリウム100mgを服用後に血圧コントロールが不十分であった日本人本態性高血圧症患者を対象とした第Ⅲ相二重盲検試験において、ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド100mg/12.5mgはロサルタンカリウム100mg投与よりも、投与8週時の平均トラフ坐位収縮期及び拡張期血圧共に、有意に優れた降圧効果を示した(P<0.001)。投与8週時における平均トラフ坐位血圧のベースラインからの変化量を表1に示す<sup>23)</sup>、<sup>24)</sup>。

表1 ロサルタンカリウム100mgで効果不十分な高血圧症患者を対象とした試験での平均トラフ坐位血圧のベースラインからの変化量<sup>†</sup>(mmHg)

		ベースラインの血圧 <sup>‡</sup>	投与8週時の変化量 <sup>†</sup>
ロサルタンカリウム100mg (N=170) <sup>§</sup>	収縮期	155.0 (10.4)	-5.4 (1.0)
	拡張期	97.7 (5.7)	-3.6 (0.6)
ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド100mg/12.5mg (N=166) <sup>§</sup>	収縮期	155.4 (11.0)	-14.5 (1.0)
	拡張期	97.1 (5.3)	-8.7 (0.6)

<sup>†</sup>最小二乗平均値(標準誤差)、<sup>‡</sup>平均値(標準偏差)、<sup>§</sup>主要評価項目のFAS解析対象例

ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド100mg/12.5mgが投与された患者で副作用が報告されたのは166例中16例(9.6%)であり、主な副作用は血中尿酸増加4例(2.4%)であった<sup>23)</sup>。

### 17.1.4 国内第Ⅲ相二重盲検比較試験及び長期投与試験

ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgを8週間服用後に血圧コントロールが不十分であった日本人本態性高血圧症患者を対象に長期安全性を評価した第Ⅲ相試験の二重盲検期(8週間)において、ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド100mg/12.5mgはロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgと比べて、投与8週時の平均トラフ坐位拡張期血圧では同程度の降圧効果を示し、投与8週時の平均トラフ坐位収縮期血圧では上乘せの降圧効果を示した。投与8週時における平均トラフ坐位血圧のベースラインからの変化量を表2に示す<sup>23)</sup>、<sup>24)</sup>。

表2 ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mgで効果不十分な高血圧症患者を対象とした試験での平均トラフ坐位血圧のベースラインからの変化量<sup>†</sup>(mmHg)

		ベースラインの血圧 <sup>‡</sup>	投与8週時の変化量 <sup>†</sup>
ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド50mg/12.5mg (N=144) <sup>§</sup>	収縮期	151.7 (9.5)	-6.2 (1.0)
	拡張期	95.9 (5.4)	-5.3 (0.7)
ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド100mg/12.5mg (N=134) <sup>§</sup>	収縮期	152.4 (11.2)	-8.5 (1.0)
	拡張期	95.1 (4.5)	-5.0 (0.7)

<sup>†</sup>最小二乗平均値(標準誤差)、<sup>‡</sup>平均値(標準偏差)、<sup>§</sup>FAS解析対象例

また、ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド100mg/12.5mgの降圧効果は、収縮期及び拡張期血圧共に52週時においても持続した<sup>23)</sup>。

二重盲検期(8週間)において、ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド100mg/12.5mgが投与された患者で副作用が報告されたのは134例中7例(5.2%)であった。延長期(52週間)において、ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド100mg/12.5mgが投与された患者で副作用が報告されたのは265例中32例(12.1%)であり、主な副作用は血中尿酸増加7例(2.6%)、高尿酸血症4例(1.5%)、AST増加、BNP増加各3例(1.1%)であった<sup>23)</sup>。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドの配合成分であるロサルタンカリウム(ロサルタン)は、経口投与後速やかに吸収され、その一部が主代謝物であるカルボン酸体に変換される<sup>25)</sup>。ロサルタン及びカルボン酸体は、いずれも生理的昇圧物質であるアンジオテンシンⅡ(AⅡ)が作用する受容体(AT1受容体)に極めて高い親和性を示し、AⅡの作用を選択的に拮抗することにより降圧効果を発揮する。ロサルタンは、レニン・アンジオテンシン系(RAS)が活性化されている高レニン性高血圧モデルにおいて著明な降圧効果を示し<sup>26)</sup>、<sup>27)</sup>、逆にRASの関与が少ない低レニン性高血圧モデルにおける降圧効果は弱いことが知

られている<sup>27)</sup>。一方の配合成分であるヒドロクロロチアジドは、チアジド系の降圧利尿薬である。ヒドロクロロチアジドの降圧機序に関しては、尿細管におけるナトリウム再吸収抑制作用による循環血液量減少作用が考えられている<sup>28)</sup>。また、ヒドロクロロチアジドはその利尿作用によりRASの活性化を起こす<sup>29)</sup>。したがって、ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドはRAS活性化状態で著明な降圧効果を示すロサルタンとRASを活性化させるヒドロクロロチアジドとの配合剤であるため、両成分の併用投与は各単剤投与に比較しより顕著な降圧効果を示すと考える。

### 18.2 降圧作用

自然発症高血圧ラットにおいて、単剤投与で中等度の降圧効果(約15mmHg低下)を示した用量のロサルタンと単剤投与では降圧効果が認められなかった用量のヒドロクロロチアジドを併用投与することにより、著明な降圧効果(約30mmHg低下)が認められた。併用投与群における降圧効果は各単剤投与群の効果と比較し有意であった<sup>30)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的見聞

一般名：ロサルタンカリウム (Losartan Potassium)

化学名：Monopotassium 5-[[4'-(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazol-1-ide


分子式：C<sub>22</sub>H<sub>22</sub>ClKN<sub>6</sub>O

分子量：461.00

性状：白色の結晶性の粉末である。

水に極めて溶けやすく、メタノール又はエタノール(99.5)に溶けやすい。

構造式：



一般名：ヒドロクロロチアジド (Hydrochlorothiazide)

化学名：6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide


分子式：C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>ClN<sub>3</sub>O<sub>4</sub>S<sub>2</sub>

分子量：297.74

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は僅かに苦い。

アセトンに溶けやすく、アセトニトリルにやや溶けにくく、水又はエタノール(95)に極めて溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。水酸化ナトリウム試液に溶ける。

構造式：



融点：約267°C(分解)

## 22. 包装

〈ロサルヒド配合錠LD「JG」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

500錠 [10錠 (PTP) × 50、乾燥剤入り]

〈ロサルヒド配合錠HD「JG」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

## 23. 主要文献

- 1) 阿部真也 他：周産期医学 2017；47：1353-1355
- 2) 齊藤大祐 他：鹿児島産科婦人科学会雑誌 2021；29：49-54

- 3) Rai, A. et al. : Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2016 ; 193 : A1890
- 4) Jansson, P.S. et al. : J. Emerg. Med. 2018 ; 55 : 836-840
- 5) Vadas, P. : Am. J. Emerg. Med. 2020 ; 38 : 1299.e1-2
- 6) Kane, S.P. et al. : Perfusion. 2018 ; 33 : 320-322
- 7) Pottgård, A. et al. : J. Intern. Med. 2017 ; 282 : 322-331
- 8) Pedersen, S.A. et al. : J. Am. Acad. Dermatol. 2018 ; 78 : 673-681
- 9) 第I相単回投与試験（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.7.6.3）
- 10) 第I相反復投与試験（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.7.6.4）
- 11) 社内資料：生物学的同等性試験（配合錠LD）
- 12) 食事の影響試験（プレミネント配合錠：2013年9月20日承認、審査報告書）
- 13) 配合成分の薬物動態（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.7.2.3.1）
- 14) Lo, M.W. et al. : Clin. Pharmacol. Ther. 1995 ; 58 : 641-649
- 15) 腎障害患者における薬物動態（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.7.2.3.5）
- 16) 高齢者における薬物動態（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.7.6.7）
- 17) 食物-薬物及び薬物-薬物相互作用を含む既知又は可能性のある相互作用の患者に対するリスク（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.5.6.2）
- 18) 配合成分の薬物動態（プレミネント錠：2006年10月20日承認、審査報告書）
- 19) 社内資料：生物学的同等性試験（配合錠HD）
- 20) 第Ⅲ相二重盲検比較試験（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.7.2.2、2.7.6.8）
- 21) Saruta, T. et al. : Hypertens. Res. 2007 ; 30 : 729-739
- 22) 第Ⅲ相長期投与試験（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.7.6.13）
- 23) Rakugi, H. et al. : Hypertens. Res. 2014 ; 37 : 1042-1049
- 24) 国内第Ⅲ相試験（プレミネント配合錠：2013年9月20日承認、審査報告書）
- 25) 作用機序（プレミネント配合錠：2013年9月20日承認、審査報告書）
- 26) 岡田恵 他：基礎と臨床 1994；28：4063-4073
- 27) Wong, P.C. et al. : J. Pharmacol. Exp. Ther. 1990 ; 252 : 726-732
- 28) Shah, S. et al. : Am. Heart J. 1978 ; 95 : 611-618
- 29) Lijnen, P. et al. : Br. J. Clin. Pharmacol. 1981 ; 12 : 387-392
- 30) ロサルタンとヒドロクロロチアジド併用による降圧作用（プレミネント錠：2006年10月20日承認、申請資料概要 2.6.2.2）

**\* 24. 文献請求先及び問い合わせ先**

日本ジェネリック株式会社 お客様相談室  
〒108-0014 東京都港区芝五丁目33番11号  
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

**26. 製造販売業者等**

**\* 26.1 製造販売元**

 **日本ジェネリック株式会社**  
東京都港区芝五丁目33番11号