

※ 2026年10月改訂（第5版）
※ 2024年11月改訂（第4版）

日本標準商品分類番号
87259

貯法：室温保存
有効期間：3年

	承認番号	販売開始
錠 2.5mg	30200AMX00059000	2020 年 6 月
錠 5mg	30200AMX00058000	2020 年 6 月

前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
(ホスホジエステラーゼ5阻害剤)
タダラフィル錠

タダラフィル錠 2.5mgZA「JG」 タダラフィル錠 5mgZA「JG」

Tadalafil Tablets

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

- 1.1 本剤と硝酸剤又は一酸化窒素（NO）供与剤（ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等）との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧を下降させることがあるので、本剤投与の前に、硝酸剤又は一酸化窒素（NO）供与剤が投与されていないことを十分確認し、本剤投与中及び投与後においても硝酸剤又は一酸化窒素（NO）供与剤が投与されないよう十分注意すること。[2.2、10.1 参照]
- 1.2 死亡例を含む心筋梗塞等の重篤な心血管系等の有害事象が報告されているので、本剤投与の前に、心血管系障害の有無等を十分確認すること。[2.4.1～2.4.5、8.1、11.2、15.1.1 参照]

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 硝酸剤又は一酸化窒素（NO）供与剤（ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等）を投与中の患者 [1.1、10.1 参照]
- 2.3 可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤（リオシグアト）を投与中の患者 [10.1 参照]
- 2.4 次に掲げる心血管系障害を有する患者 [これらの患者は臨床試験では除外されている。]
- 2.4.1 不安定狭心症のある患者 [1.2、8.1、15.1.1 参照]
- 2.4.2 心不全（NYHA 分類Ⅲ度以上）のある患者 [1.2、8.1、15.1.1 参照]
- 2.4.3 コントロール不良の不整脈、低血圧（血圧＜90/50mmHg）又はコントロール不良の高血圧（安静時血圧＞170/100mmHg）のある患者 [1.2、8.1、15.1.1 参照]
- 2.4.4 心筋梗塞の既往歴が最近3ヵ月以内にある患者 [1.2、8.1、15.1.1 参照]
- 2.4.5 脳梗塞・脳出血の既往歴が最近6ヵ月以内にある患者 [1.2、8.1、15.1.1 参照]
- 2.5 重度の腎障害のある患者 [9.2.1 参照]
- 2.6 重度の肝障害のある患者 [9.3.1 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	有効成分 (1錠中)	添加剤
タダラフィル錠 2.5mgZA「JG」	タダラフィル 2.5mg	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、トリアセチン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、カルナウバロウ

タダラフィル錠 5mgZA「JG」	タダラフィル 5mg	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、トリアセチン、カルナウバロウ
-------------------	------------	---

3.2 錠剤の性状

販売名	色・剤形	外形 ^{注)} ・大きさ・重量	本体表示
タダラフィル錠 2.5mgZA「JG」	淡橙黄色のティアドロップ形のフィルムコーティング錠	表面 裏面 側面	タダラフィル ZA 2.5 JG
		長径 短径 厚さ 重量	
タダラフィル錠 5mgZA「JG」	白色のティアドロップ形のフィルムコーティング錠	表面 裏面 側面	タダラフィル ZA 5 JG
		長径 短径 厚さ 重量	

注) 錠剤の向きと印字の組み合わせは2通りある。

4. 効能又は効果

前立腺肥大症に伴う排尿障害

5. 効能又は効果に関連する注意

- 5.1 本剤の適用にあたっては、前立腺肥大症の診断・診療に関する国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に、適切な検査により診断を確定すること。
- 5.2 本剤による治療は原因療法ではなく、対症療法であることに留意し、本剤投与により期待する効果が得られない場合は、手術療法等、他の適切な処置を考慮すること。

6. 用法及び用量

通常、成人には1日1回タダラフィルとして5mgを経口投与する。

7. 用法及び用量に関連する注意

- 7.1 中等度の腎障害のある患者では、本剤の血漿中濃度が上昇するおそれがあること及び投与経験が限られていることから、患者の状態を観察しながら1日1回2.5mgから投与を開始するなど考慮すること。[9.2.2 参照]
- 7.2 チトクローム P450 3A4（CYP3A4）を強く阻害する薬剤を投与中の患者では、本剤の血漿中濃度が上昇することが認められているので、1日1回2.5mgから投与を開始し、患者の状態を観察しながら適宜5mgへ増量すること。[10.2 参照]

8. 重要な基本的注意

- 8.1 他のホスホジエステラーゼ（PDE）5 阻害剤と同様に、本剤は血管拡張作用を有するため一過性の軽度の血圧低下があらわれる場合がある。本剤投与の前に、心血管系障害の有無等を十分確認すること。[1.2、2.4.1～2.4.5、15.1.1 参照]
- 8.2 4 時間以上の勃起の延長又は持続勃起（6 時間以上持続する痛みを伴う勃起）が外国にてごくまれに報告されている。持続勃起に対する処置を速やかに行わないと陰茎組織の損傷又は勃起機能を永続的に損なうことがあるので、勃起が 4 時間以上持続する症状がみられた場合、直ちに医師の診断を受けるよう指導すること。
- 8.3 本剤投与後に急激な視力低下又は急激な視力喪失があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、速やかに眼科専門医の診察を受けるよう、患者に指導すること。[15.1.2 参照]
- 8.4 臨床試験において、めまいや視覚障害が認められているので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 8.5 本剤投与後に急激な聴力低下又は突発性難聴（耳鳴り、めまいを伴うことがある）があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、速やかに耳鼻科専門医の診察を受けるよう、患者に指導すること。[11.2、15.1.4 参照]
- 8.6 国内において他の前立腺肥大症治療薬と併用した際の臨床効果は確認されていない。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 陰茎の構造上欠陥（屈曲、陰茎の線維化、Peyronie 病等）のある患者

本剤の薬理作用により勃起がおこり、その結果陰茎に痛みを引き起こすおそれがある。

9.1.2 持続勃起症の素因となり得る疾患（鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病等）のある患者

9.1.3 出血性疾患又は消化性潰瘍のある患者

in vitro 試験でニトロプルシドナトリウム（NO 供与剤）の血小板凝集抑制作用を増強することが認められている。出血性疾患又は消化性潰瘍のある患者に対する安全性は確立していない。

9.1.4 網膜色素変性症患者

PDE の遺伝的障害を持つ症例が少数認められる。

9.1.5 PDE5 阻害剤を投与中の患者

併用使用の経験がない。

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重度の腎障害患者

投与しないこと。本剤の血漿中濃度が上昇する。また、これらの患者は本剤の曝露が増加する可能性があるため臨床試験では除外されている。[2.5、16.6.1 参照]

9.2.2 中等度の腎障害患者

本剤の血漿中濃度が上昇する可能性がある。[7.1、16.6.1 参照]

9.2.3 軽度の腎障害患者

[16.6.1 参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重度の肝障害患者

投与しないこと。これらの患者は臨床試験では除外されている。[2.6 参照]

9.3.2 軽度・中等度の肝障害患者

これらの患者を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

一般に生理機能が低下している。[16.6.3 参照]

10. 相互作用

本剤は主に CYP3A4 により代謝される。

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
硝酸剤及び NO 供与剤 ニトログリセリン 亜硝酸アミル 硝酸イソソルビド ニコランジル等 [1.1、2.2 参照]	併用により、降圧作用を増強するとの報告がある ^{1)～3)} 。	NO は cGMP の産生を刺激し、一方、本剤は cGMP の分解を抑制することから、両剤の併用により cGMP の増大を介する NO の降圧作用が増強する。
sGC 刺激剤 リオシグアト（アデムパス） [2.3 参照]	併用により、血圧低下を起こすおそれがある。	併用により、細胞内 cGMP 濃度が増加し、全身血圧に相加的な影響を及ぼすおそれがある。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4 阻害剤 イトラコナゾール クラリスロマイシン テラプレビル グレープフルーツジュース等 [7.2、16.7.1 参照]	強い CYP3A4 阻害作用を有するケトコナゾール（経口剤、国内未発売）との併用により、本剤の AUC 及び C _{max} が 312% 及び 22% 増加するとの報告がある ⁴⁾ 。	CYP3A4 阻害によるクリアランスの減少。
HIV プロテアーゼ阻害剤 リトナビル インジナビル サキナビル ダルナビル等 [16.7.2 参照]	リトナビルとの併用により、本剤の AUC が 124% 増加するとの報告がある ⁴⁾ 。	CYP3A4 阻害によるクリアランスの減少。
CYP3A4 誘導剤 リファンピシン フェニトイン フェノバルビタール等	リファンピシンとの併用により、本剤の AUC 及び C _{max} がそれぞれ 88% 及び 46% 低下するとの報告がある ⁵⁾ 。	CYP3A4 誘導によるクリアランスの増加により本剤の血漿中濃度が低下し、本剤の効果が減弱するおそれがある。
α 遮断剤 ドキサゾシン テラゾシン等 [16.7.3 参照]	ドキサゾシンとの併用により、立位収縮期血圧及び拡張期血圧は最大それぞれ 9.81mmHg 及び 5.33mmHg 下降するとの報告がある ⁶⁾ 。また、α 遮断剤との併用で失神等の症状を伴う血圧低下を来したとの報告がある。患者背景を考慮して治療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ慎重に投与すること。	本剤は血管拡張作用による降圧作用を有するため、併用により降圧作用を増強するおそれがある。
降圧剤 アムロジピン メトプロロール エナラプリル カンデサルタン等	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤（単剤又は多剤）との併用により、自由行動下収縮期血圧及び拡張期血圧は最大それぞれ 8mmHg 及び 4mmHg 下降するとの報告がある ⁷⁾ 。	本剤は血管拡張作用による降圧作用を有するため、併用により降圧作用を増強するおそれがある。
カルベリチド	併用により降圧作用が増強するおそれがある。	本剤は血管拡張作用による降圧作用を有するため、併用により降圧作用を増強するおそれがある。
セビアブテリン	併用により降圧作用が増強するおそれがある。	NO を介した血管弛緩作用を増強するおそれがある。
ベルイシグアト	症候性低血圧を起こすおそれがある。治療上の有益性及び危険性を十分に考慮し、治療上やむを得ないと判断された場合にのみ併用すること。	細胞内 cGMP 濃度が増加し、降圧作用を増強するおそれがある。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 過敏症（頻度不明）

発疹、蕁麻疹、顔面浮腫、剥脱性皮膚炎、Stevens-Johnson 症候群等があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	1%以上	1%未満	頻度不明
循環器		動悸、ほてり、潮紅	心筋梗塞 ^{注1)} 、胸痛、心突然死 ^{注1)} 、失神、低血圧
感覚器			眼痛、霧視、結膜充血、網膜動脈閉塞、網膜静脈閉塞、眼瞼腫脹、視野欠損、非動脈炎性前部虚血性視神経症 ^{注2)} 、突発性難聴 ^{注3)} 、中心性漿液性脈絡網膜症
消化器	消化不良	胃食道逆流性疾患、下痢、胃炎	腹痛
腎臓		腎クレアチニン・クリアランス減少	
筋骨格		筋肉痛、背部痛	四肢痛
精神・神経系	頭痛	浮動性めまい	片頭痛、脳卒中 ^{注1)}
泌尿・生殖器		勃起増強、自発陰茎勃起	持続勃起症、勃起の延長
呼吸器			呼吸困難、鼻出血
皮膚			多汗症
その他		CK 上昇	

注1) [1.2 参照]

注2) [15.1.2 参照]

注3) [8.5 参照]

13. 過量投与

13.1 処置

特異的な解毒薬はない。なお、腎透析によるクリアランスの促進は期待できない。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 勃起不全治療剤として使用されたタダラフィルの市販後の自発報告において、心筋梗塞、心突然死、心室性不整脈、脳出血、一過性脳虚血発作等の重篤な心血管系障害がタダラフィル投与後に発現している。これらの多くが心血管系のリスクファクターを有している患者であった。多くの事象が、性行為中又は性行為後に認められ、少数例ではあるが、性行為なしにタダラフィル投与後に認められたものもあった。その他は、タダラフィルを投与し性行為後の数時間から数日後に報告されている。これらの症例について、タダラフィル、性行為、本来患者が有していた心血管系障害、これらの要因の組み合わせ又は他の要因に直接関連するかどうかを確定することはできない。なお、性行為を控える必要がある心血管系障害を有する患者には、タダラフィルを勃起不全治療剤として使用することは禁忌とされている。[1.2、2.4.1～2.4.5、8.1 参照]

*** 15.1.2 薬剤との因果関係は明らかではないが、外国において男性勃起不全治療剤として使用されたタダラフィルを含む PDE5 阻害剤投与後に、まれに視力低下や視力喪失の原因となりうる非動脈炎性前部虚血性視神経症（NAION）の発現が報告されている⁸⁾。**これらの患者の多くは、NAION の危険因子【年齢（50 歳以上）、糖尿病、高血圧、冠動脈障害、高脂血症、喫煙等】を有していた⁹⁾。

外国において、NAION を発現した 45 歳以上の男性を対象として実施された自己対照研究では、PDE5 阻害剤の投与から消失半減期（ $T_{1/2}$ ）の 5 倍の期間内（タダラフィルの場合約 4 日以内に相当）は、NAION 発現リスクが約 2 倍になることが報告されている¹⁰⁾。[8.3、11.2 参照]

15.1.3 薬剤との因果関係は明らかではないが、外国において本剤を含む PDE5 阻害剤投与後に、まれに、痙攣発作の発現が報告されている^{11)、12)}。

15.1.4 薬剤との因果関係は明らかではないが、外国において本剤を含む PDE5 阻害剤投与後に、まれに、急激な聴力低下又は突発性難聴が報告されている。これらの患者では、耳鳴りやめまいを伴うことがある。[8.5 参照]

15.1.5 アルコール飲用時に本剤を投与した外国の臨床薬理試験（本剤 10mg、20mg）^{注)}において、アルコール血中濃度、本剤の血漿中濃度のいずれも相互に影響を受けなかったが、アルコールを高用量（0.7g/kg）飲用した被験者において、めまいや起立性低血圧が報告された^{13)、14)}。

注) 承認最大用量は 5mg である。

15.2 非臨床試験に基づく情報

25mg/kg/day 以上の用量でタダラフィルをイヌに 3～12 ヶ月間連日経口投与した毒性試験において、精巣重量の低下、精細管上皮の変性、精巣上体の精子数の減少が認められたとの報告がある。ヒトにおける精子形成能に対する影響を検討した外国臨床試験の一部では平均精子濃度の減少が認められたが、精子運動率、精子形態及び生殖ホルモン値はいずれの試験においても変化が認められなかった^{15)、16)}。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

日本人健康成人 36 例にタダラフィル 5、10、20、40mg^{注1)}を単回経口投与したときのタダラフィルの血漿中濃度は、投与 0.5～4 時間（ T_{max} の中央値、3 時間）の間にピークに達した後、消失した。消失半減期は約 14～15 時間であった¹⁷⁾。

注1) 最大承認用量は 5mg である。

健康成人にタダラフィル 5、10、20、40mg^{注1)}を単回投与したときの血漿中タダラフィル濃度より算出した薬物動態パラメータ

用量	n	AUC _{0-∞} ($\mu\text{g} \cdot \text{h/L}$)	C _{max} ($\mu\text{g/L}$)	T _{max} (h) ^{注2)}	T _{1/2} (h)
5mg	24	1784 (35.3)	95.6 (30.0)	3.00 (0.500～4.00)	14.2 (19.9)
10mg	23	3319 (32.5)	174 (26.5)	3.00 (0.500～4.00)	14.6 (20.9)
20mg	24	5825 (23.2)	292 (26.1)	3.00 (1.00～4.03)	13.6 (17.1)
40mg	23	10371 (32.3)	446 (20.2)	3.00 (0.500～4.00)	14.9 (20.0)

幾何平均値（変動係数%）

注2) 中央値（範囲）

16.1.2 反復投与

前立腺肥大症に伴う排尿障害日本人患者 12 例にタダラフィル 5mg を 1 日 1 回 10 日間反復経口投与した。定常状態でのタダラフィルの AUC 及び C_{max} は初回投与時と比べて約 2 倍に増加した¹⁸⁾。

前立腺肥大症に伴う排尿障害日本人患者にタダラフィル 5mg を 1 日 1 回 10 日間反復投与したときの血漿中タダラフィル濃度より算出した薬物動態パラメータ

日数	n	AUC ₀₋₂₄ ($\mu\text{g} \cdot \text{h/L}$)	C _{max} ($\mu\text{g/L}$)	T _{max} (h) ^{注3)}	T _{1/2} (h)
1 日目	12	1410 (31)	102 (27)	4.00 (1.00～4.00)	—
10 日目	12	2710 (27)	173 (24)	3.00 (2.00～4.00)	23.9 (25)

幾何平均値（変動係数%）

注3) 中央値（範囲）


前立腺肥大症に伴う排尿障害日本人患者を対象とした第Ⅱ相二重盲検比較臨床試験において、タダラフィル 2.5mg 又は 5mg のいずれかを 1 日 1 回反復経口投与した。5mg を投与したときの血漿中タダラフィル濃度は 2.5mg の約 2 倍となった¹⁹⁾。

16.1.3 生物学的同等性試験

〈タダラフィル錠 2.5mgZA [JG]〉

タダラフィル錠 2.5mgZA [JG] とザルティア錠 2.5mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（タダラフィルとして 2.5mg）健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、C_{max}）について 90%信頼区間法にて統計解析を行っ

た結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された²⁰⁾。




	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₇₂ (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
タダフィル錠 2.5mgZA [JG]	984.77±218.97	46.19±6.98	3.1±1.2	17.1±4.0
ザルティア錠 2.5mg	936.06±207.17	51.50±9.18	2.2±1.2	16.1±3.3

(Mean±S.D., n=32)

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

＜タダフィル錠 5mgZA [JG]＞

タダフィル錠 5mgZA [JG] とザルティア錠 5mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（タダフィルとして 5mg）健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、C_{max}）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された²¹⁾。



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₇₂ (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
タダフィル錠 5mgZA [JG]	1798.43±500.33	88.00±17.28	2.9±1.1	15.6±4.2
ザルティア錠 5mg	1923.01±695.71	102.91±23.10	2.3±1.4	15.8±4.4

(Mean±S.D., n=32)

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人 18 例にタダフィル 20mg^{注1)} を食後（高脂肪食）又は空腹時に単回経口投与したとき、AUC_{0-∞} 及び C_{max} 共に食事摂取による影響は認められなかった²²⁾（外国人データ）。

16.3 分布

16.3.1 血漿蛋白結合率

タダフィルの血漿蛋白結合率は 94%（*in vitro*、平衡透析法）であり²³⁾、主にアルブミン及び α₁ 酸性糖蛋白と結合する²⁴⁾。

16.4 代謝

健康成人 6 例に¹⁴C-タダフィル 100mg^{注1)} を単回経口投与したとき、血漿中には主にタダフィル未変化体及びメチルカテコールグルクロン酸抱合体が認められた²⁵⁾。血漿中のメチルカテコール体はメチルカテコールグルクロン酸抱合体の 10%未満であった²⁶⁾（外国人データ）。

16.5 排泄

健康成人 6 例に¹⁴C-タダフィル 100mg^{注1)} を単回経口投与したときの、投与後 312 時間までの放射能回収率は糞便中 60.5%、尿中 36.1%であった。糞便中には主にメチルカテコール体、カテコール体、尿中には主にメチルカテコールグルクロン酸抱合体及びカテコールグルクロン酸抱合体が認められた²⁵⁾（外国人データ）。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎障害患者

(1) 軽度及び中等度腎障害患者

健康成人 12 例、軽度腎障害患者（CLcr = 51～80mL/min）8 例、中等度腎障害患者（CLcr = 31～50mL/min）8 例にタダフィル 5mg 及び 10mg^{注1)} を単回経口投与したとき、AUC_{0-∞} 及び C_{max} は健康成人のそれぞれ約 100% 及び 20～30% 増加した^{27),28)}（外国人データ）。[9.2.2、9.2.3 参照]

(2) 血液透析を受けている末期腎不全患者

健康成人 8 例及び肝障害患者 25 例^{注4)} にタダフィル 10mg^{注1)} を単回経口投与したとき、軽度肝障害患者（Child-Pugh class A）と中等度肝障害患者（Child-Pugh class B）の AUC_{0-∞} は健康成人とほぼ同様であった²⁸⁾（外国人データ）。

16.6.2 肝障害患者

健康成人 8 例及び肝障害患者 25 例^{注4)} にタダフィル 10mg^{注1)} を単回経口投与したとき、軽度肝障害患者（Child-Pugh class A）と中等度肝障害患者（Child-Pugh class B）の AUC_{0-∞} は健康成人とほぼ同様であった²⁸⁾（外国人データ）。

注4) 軽度肝障害（脂肪肝が認められた患者）、n = 8; 軽度肝障害（Child-Pugh class A）、n = 8; 中等度肝障害（Child-Pugh class B）、n = 8; 重度肝障害（Child-Pugh class C）、n = 1。

16.6.3 高齢者

健康高齢者 12 例（65～78 歳）及び健康若年者 12 例（19～45 歳）にタダフィル 10mg^{注1)} を単回経口投与したとき、C_{max} は高齢者と若年者とではほぼ同様であったが、高齢者の AUC_{0-∞} は若年者に比べ約 25% 高値であった²⁸⁾（外国人データ）。[9.8 参照]

高齢者及び若年者にタダフィル 10mg^{注1)} を単回投与したときの血漿中タダフィル濃度より算出した薬物動態パラメータ

	n	AUC _{0-∞} (μg・h/L)	C _{max} (μg/L)	T _{max} (h) ^{注5)}	T _{1/2} (h)
高齢者	12	4881 (31.7)	196 (26.9)	2.00 (1.00～4.00)	21.6 (39.0)
若年者	12	3896 (42.6)	183 (25.5)	2.50 (1.00～6.00)	16.9 (29.1)

幾何平均値（変動係数%）

注5) 中央値（範囲）

前立腺肥大症に伴う排尿障害の高齢者 12 例（70～76 歳）及び非高齢者 12 例（42～59 歳）にタダフィル 20mg^{注1)} を 1 日 1 回 10 日間反復経口投与したとき、高齢者の AUC₀₋₂₄ と C_{max} は非高齢者に比べわずかに（約 13%）低かった²⁹⁾。

高齢者及び非高齢者にタダフィル 20mg^{注1)} を 10 日間反復投与したときの血漿中タダフィル濃度より算出した薬物動態パラメータ

	n	AUC ₀₋₂₄ (μg・h/L)	C _{max} (μg/L)	T _{max} (h) ^{注6)}	T _{1/2} (h)
単回 (Day1)	高齢者	12	3900 (39)	273 (32)	4.00 (2.00～8.00)
	非高齢者	10 ^{注7)}	4500 (26)	328 (23)	4.00 (3.00～8.00)
反復 (Day10)	高齢者	12	7360 (40)	472 (33)	3.52 (2.00～4.03)
	非高齢者	10 ^{注7)}	8280 (41)	536 (35)	3.50 (2.00～4.00)

幾何平均値（変動係数%）

注6) 中央値（範囲）

注7) 非高齢者の要約統計量は軽度腎障害を有する被験者及び投与前サンプルに血漿中タダフィル濃度が検出された被験者を除く 10 例（42～58 歳）から算出

16.7 薬物相互作用

16.7.1 経口コナゾール

健康成人 12 例にコナゾール 400mg（1 日 1 回経口投与、国内未発売）とタダフィル 20mg^{注1)} を併用投与したとき、タダフィルの AUC_{0-∞} 及び C_{max} は、それぞれ 312% 及び 22% 増加した⁴⁾（外国人データ）。

健康成人 11 例にコナゾール 200mg（1 日 1 回経口投与）とタダフィル 10mg^{注1)} を併用投与したとき、タダフィルの AUC_{0-∞} 及び C_{max} はそれぞれ 107% 及び 15% 増加した⁵⁾（外国人データ）。[10.2 参照]

16.7.2 リトナビル

健康成人 16 例にリトナビル 500mg 又は 600mg (1 日 2 回) とタダラフィル 20mg^{注1)}を併用投与したとき、タダラフィルの C_{max} は 30%低下したが、AUC_{0-∞}は 32%増加した³⁰⁾ (外国人データ)。
健康成人 8 例にリトナビル 200mg (1 日 2 回) とタダラフィル 20mg^{注1)}を併用投与したとき、タダラフィルの C_{max} は同程度であったが、AUC_{0-∞}は 124%増加した⁴⁾ (外国人データ)。^[10.2 参照]

16.7.3 α 遮断剤

(1) ドキサゾシン

健康成人 18 例にドキサゾシン 8mg を反復経口投与時の定常状態で、タダラフィル 20mg^{注1)}を単回経口投与したとき、立位の収縮期及び拡張期血圧の最大下降量はそれぞれ 9.81mmHg 及び 5.33mmHg、臥位の収縮期及び拡張期血圧の最大下降量はそれぞれ 3.64mmHg 及び 2.78mmHg であった⁶⁾ (外国人データ)。
健康成人 45 例にドキサゾシン (4mg まで漸増) とタダラフィル 5mg を 1 日 1 回反復経口投与したとき、ドキサゾシンの血圧降下作用に増強がみられた。この試験において、失神等の症状を伴う血圧変化に関する有害事象がみられた³¹⁾ (外国人データ)。^[10.2 参照]

(2) タムスロシン

健康成人 18 例にタムスロシン 0.4mg を反復経口投与時の定常状態で、タダラフィル 10mg 又は 20mg^{注1)}を単回投与したとき、立位の収縮期及び拡張期血圧の最大下降量はそれぞれ 2.3mmHg 及び 2.2mmHg、臥位の収縮期及び拡張期血圧の最大下降量はそれぞれ 3.2mmHg 及び 3.0mmHg であり、明らかな血圧への影響は認められなかった⁶⁾ (外国人データ)。
健康成人 39 例にタムスロシン 0.4mg とタダラフィル 5mg を 1 日 1 回反復経口投与したとき、明らかな血圧への影響は認められなかった³²⁾ (外国人データ)。

16.7.4 その他の薬剤

他剤 (ニザチジン、制酸配合剤) 又はアルコールがタダラフィル (10 又は 20mg)^{注1)}に及ぼす影響について検討した結果、ニザチジン、制酸配合剤又はアルコールによるタダラフィルの薬物動態に対する明らかな影響は認められなかった。また、タダラフィル (10 又は 20mg)^{注1)}が他剤 (ミダゾラム、テオフィリン、ワルファリン及びアムロジピン) 又はアルコールに及ぼす影響について検討した結果、タダラフィルによるミダゾラム、テオフィリン、ワルファリン、アムロジピン又はアルコールの薬物動態に対する明らかな影響は認められなかった^{13),14),33)-38)} (外国人データ)。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内第Ⅱ相二重盲検比較臨床試験

日本人の前立腺肥大症に伴う排尿障害患者 (422 例) を対象にプラセボ、タダラフィル 2.5mg 又は 5mg を 1 日 1 回 12 週間投与した結果、IPSS トータルスコアのベースラインからの変化量 (最小二乗平均値) はプラセボ群で-3.8、タダラフィル 2.5mg 群で-4.5、5mg 群で-4.9 であった。変化量のプラセボ群との差は、5mg 群 (-1.1) が 2.5mg 群 (-0.7) に比べて 57%大きく、用量依存的な改善傾向が認められた^{39),40)}。(試験①)
副作用発現頻度は、タダラフィル 2.5mg 群で 4.9% (7/142 例) 及びタダラフィル 5mg 群で 6.4% (9/140 例) であった。主な副作用は、2.5mg 群では、ほてりが 2.1% (3/142 例) 及び動悸が 1.4% (2/142 例)、5mg 群では、消化不良が 2.1% (3/140 例) 及びほてりが 1.4% (2/140 例) であった。

17.1.2 国際共同第Ⅲ相二重盲検比較臨床試験

日本、韓国及び台湾の前立腺肥大症に伴う排尿障害患者 (309 例) を対象に、プラセボ又はタダラフィル 5mg を 1 日 1 回 12 週間投与した結果、IPSS トータルスコアのベースラインからの変化量 (最小二乗平均値) はプラセボ群で-3.0、タダラフィル 5mg 群で-4.7 であり、5mg 群はプラセボ群と比較して統計学的に有意な改善を示した。5mg 群では投与 2 週後の早期から IPSS トータルスコアの改善が認められた^{41),42)}。また、日本人患者 (173 例) における IPSS トータルスコアのベースラインからの変化量 (最小二乗平均値) はプラセボ群で-3.1、タダラフィル 5mg 群で-4.8 であり、5mg 群はプラセボ群と比較して統計学的に有意な改善を示した (プラセボ群との差:-1.7, p=0.036)。(試験②)
副作用発現頻度は、タダラフィル 2.5mg 群で 9.9% (15/151 例) 及び 5mg 群で 13.5% (21/155 例) であった。主な副作用は、2.5mg 群では、筋攣縮、筋肉痛及び頭痛が各 1.3% (2/151 例)、5mg 群では、筋肉痛が 3.2% (5/155 例)、消化不良、悪心、血中クレアチンホスホキナーゼ増加及び筋緊張が各 1.3% (2/155 例) であった。

17.1.3 国際共同第Ⅲ相二重盲検比較臨床試験


日本及び韓国の前立腺肥大症に伴う排尿障害患者 (610 例) を対象に、プラセボ又はタダラフィル 5mg を 1 日 1 回 12 週間投与した結果、IPSS トータルスコアのベースラインからの変化量 (最小二乗平均値) はプラセボ群で-4.5、タダラフィル 5mg 群で-6.0 であり、5mg 群はプラセボ群と比較して統計学的に有意な改善を示した。5mg 群では投与 4 週間後から IPSS トータルスコアの改善が認められた⁴³⁾。また、日本人患者 (449 例) における IPSS トータルスコアのベースラインからの変化量 (最小二乗平均値) はプラセボ群で-4.8、タダラフィル 5mg 群で-6.0 であり、5mg 群はプラセボ群と比較して統計学的に有意な改善を示した (プラセボ群との差:-1.2, p=0.017)。(試験③)
副作用発現頻度は、タダラフィル 5mg 群で 15.0% (46/306 例) であった。主な副作用は、消化不良が 3.3% (10/306 例)、頭痛が 2.6% (8/306 例) 及び血中クレアチンホスホキナーゼ増加が 2.0% (6/306 例) であった。

IPSS トータルスコアの投与前後における変化量


	投与群	n	投与前 (平均値)	投与 12 週間 (平均値)	変化量 (最小 二乗 平均値)	プラセボ 群 との差	p 値
第Ⅱ 相 ^{注1)} 臨床試験 (試験①)	プラセボ	140	16.5	12.8	-3.8	-	-
	2.5mg	142	16.3	12.0	-4.5	-0.7	0.201
	5mg	140	16.4	11.7	-4.9	-1.1	0.062
第Ⅲ 相 ^{注1)} 臨床試験 (試験②)	プラセボ	154	16.8	13.6	-3.0	-	-
	5mg	155	17.2	12.2	-4.7	-1.7	0.004
第Ⅲ 相 ^{注2)} 臨床試験 (試験③)	プラセボ	304	18.7	13.9	-4.5	-	-
	5mg	306	18.7	12.1	-6.0	-1.5	<0.001

注 1) 共分散分析モデル解析 (LOCF を使用)

注 2) 経時測定データの混合効果モデル解析



IPSS トータルスコアの投与前後における変化量の推移 (第Ⅲ相二重盲検比較臨床試験 (試験②))



IPSS トータルスコアの投与前後における変化量の推移 (第Ⅲ相二重盲検比較臨床試験 (試験③))

17.1.4 国内長期投与非盲検試験

第Ⅱ相試験を完了した 394 例の被験者が 42 週の長期投与非盲検試験に参加した。前立腺肥大症に伴う排尿障害患者にタダラフィル 5mg を 1 日 1 回 54 週間 (二重盲検期間 12 週を含む) 長期継続投与した結果、IPSS トータルスコアの継続的な改善の維持が認められ、長期の安全性及び良好な忍容性が確認された^{39),44)}。
副作用発現頻度は、タダラフィル 5mg 群で 10.7% (42/394 例) であった。主な副作用は、消化不良及び胃食道逆流性疾患が各 1.3% (5/394 例) であった。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

タダラフィルは PDE5 を阻害することにより、前立腺及び膀胱平滑筋、並びに下部尿路血管の平滑筋内 cGMP 濃度を上昇させる。タダラフィルによる血管拡張作用を介した血流増加が前立腺肥大症に伴う排尿障害の症状緩和に寄与していると考えられる。また、前立腺及び膀胱における平滑筋弛緩が血管に対する作用を補完している可能性がある⁴⁵⁾。

18.2 PDE5 阻害作用

タダラフィルは選択的 PDE5 阻害剤である。ヒト遺伝子組み換え PDE5 を約 1nM の IC₅₀ 値で阻害し、PDE6 及び PDE11 と比較するとそれぞれ 700 及び 14 倍、その他の PDE サブタイプと比較すると 9000 倍以上の選択性を示した⁴⁶⁾ (in vitro)。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名: タダラフィル (Tadalafil)


化学名: (6*R*,12*aR*)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12*a*-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-*b*]indole-1,4-dione

分子式: C₂₂H₁₉N₃O₄

分子量: 389.40

性 状: 白色の結晶又は粉末である。

構造式：



22. 包装

〈タダラフィル錠 2.5mgZA「JG」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10]

〈タダラフィル錠 5mgZA「JG」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10]

23. 主要文献

- 1) Kloner, R.A. et al. : Am. J. Cardiol. 2003 ; 92 (Suppl.) : 37M-46M
- 2) Patterson, D. et al. : Br. J. Clin. Pharmacol. 2005 ; 60 (5) : 459-468
- 3) Kloner, R.A. et al. : J. Am. Coll. Cardiol. 2003 ; 42 (10) : 1855-1860
- 4) リトナビル及びケトコナゾールとの薬物相互作用 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.2)
- 5) リファンピシン及びケトコナゾールとの薬物相互作用 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.1)
- 6) Kloner, R.A. et al. : J. Urol. 2004 ; 172 (5 Pt 1) : 1935-1940
- 7) Kloner, R.A. et al. : Am. J. Cardiol. 2003 ; 92 (Suppl.) : 47M-57M
- 8) Pomeranz, H.D. et al. : J. Neuroophthalmol. 2005 ; 25 (1) : 9-13
- 9) Lee, A.G. et al. : Am. J. Ophthalmol. 2005 ; 140 (4) : 707-708
- 10) Campbell, U.B. et al. : J. Sex Med. 2015 ; 12 (1) : 139-151
- 11) Gilad, R. et al. : BMJ. 2002 ; 325 (7369) : 869
- 12) Striano, P. et al. : BMJ. 2006 ; 333 (7572) : 785
- 13) アルコールとの薬物相互作用 (タダラフィル 10mg) (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.9、2.7.2.2.2.4.7)
- 14) アルコールとの薬物相互作用 (タダラフィル 20mg) (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.9、2.7.2.2.2.4.7)
- 15) Hellstrom, W.J.G. et al. : J. Urol. 2003 ; 170 (3) : 887-891
- 16) 精液特性に及ぼす影響 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.4.4.3)
- 17) 健康成人における薬物動態 (単回投与) (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.1.1)
- 18) 日本人及び外国人患者における薬物動態 (反復投与) (ザルティア錠：2014年1月17日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2、2.7.2.3.1)
- 19) 前立腺肥大症に伴う排尿障害を有する日本人患者における第Ⅱ相試験 (ザルティア錠：2014年1月17日承認、申請資料概要 2.7.2.2.1)
- 20) 社内資料：生物学的同等性試験 (錠 2.5mg)
- 21) 社内資料：生物学的同等性試験 (錠 5mg)
- 22) 食事の影響 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.1.1.3)
- 23) 蛋白結合 (*in vitro*；ラット、イヌ及びヒト血漿) (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.6.4.4.3)
- 24) 蛋白結合 (*in vitro*；ヒト血漿蛋白) (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.1.1)
- 25) 放射性標識体投与時の薬物動態 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.1.3)
- 26) 代謝 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.3.1.3)
- 27) 腎機能障害患者における薬物動態 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.2.1、2.7.2.3.5.2)
- 28) Forgue, S.T. et al. : Br. J. Clin. Pharmacol. 2007 ; 63 (1) : 24-35
- 29) 高齢及び非高齢患者における薬物動態 (反復投与) (ザルティア錠：2014年1月17日承認、申請資料概要 2.7.2.2.3)
- 30) リトナビルとの薬物相互作用 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.3)
- 31) ドキサゾシンとの薬物相互作用 (アドシルカ錠：2009年10月16日承認、申請資料概要 2.7.2.1.1.2.5.3、2.7.6.2.9)
- 32) タムスロシンとの薬物相互作用 (アドシルカ錠：2009年10月16日承認、申請資料概要 2.7.2.1.1.2.5.3、2.7.6.2.8)
- 33) 制酸剤及びH₂受容体拮抗剤との薬物相互作用 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.8)
- 34) ミダゾラムとの薬物相互作用 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.5)
- 35) テオフィリンとの薬物相互作用 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.7)
- 36) ワルファリンとの薬物相互作用 (タダラフィル 10mg) (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.6)

- 37) ワルファリンとの薬物相互作用 (タダラフィル 20mg) (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.6)
- 38) アムロジピンとの薬物相互作用 (シアリス錠：2007年7月31日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2.3.10)
- 39) Takeda, M. et al. : Low Urin. Tract Symptoms. 2012 ; 4 (3) : 110-119
- 40) 前立腺肥大症に伴う排尿障害を有する日本人患者を対象とした第Ⅱ相試験 (ザルティア錠：2014年1月17日承認、申請資料概要 2.7.6.3.1)
- 41) Yokoyama, O. et al. : Int. J. Urol. 2013 ; 20 (2) : 193-201
- 42) 前立腺肥大症に伴う排尿障害を有する患者を対象としたアジア第Ⅲ相臨床試験 (ザルティア錠：2014年1月17日承認、申請資料概要 2.7.3.2.1.2、2.7.6.3.2)
- 43) 前立腺肥大症に伴う排尿障害患者における第Ⅲ相試験 (ザルティア錠：2014年1月17日承認、申請資料概要 2.7.3.2.1.3)
- 44) 前立腺肥大症に伴う排尿障害を有する日本人患者を対象とした長期投与試験 (ザルティア錠：2014年1月17日承認、申請資料概要 2.7.6.3.13)
- 45) 作用機序 (ザルティア錠：2014年1月17日承認、申請資料概要 2.6.2.1)
- 46) Saenz de Tejada, I. et al. : Int. J. Impot. Res. 2002 ; 14 (Suppl.4) : S20

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本ジェネリック株式会社 お客さま相談室
〒108-0014 東京都港区芝五丁目33番11号
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

25. 保険給付上の注意

- 25.1 本製剤の効能又は効果は、「前立腺肥大症に伴う排尿障害」であること。
- 25.2 本製剤が「前立腺肥大症に伴う排尿障害」以外の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととする。

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



日本ジェネリック株式会社
東京都港区芝五丁目33番11号