

貯法：室温保存  
有効期間：3年

	0.25 $\mu$ g	0.5 $\mu$ g	1.0 $\mu$ g
承認番号	22500AMX00429	22500AMX00430	22500AMX00431
販売開始	1990年7月		

## 活性型ビタミンD<sub>3</sub>製剤 アルファカルシドール

# アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」 アルファカルシドールカプセル0.5 $\mu$ g「フソー」 アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」

## Alfacalcidol Capsules "FUSO"

劇薬

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」	アルファカルシドールカプセル0.5 $\mu$ g「フソー」	アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」
有効成分	1カプセル中 アルファカルシドール 0.25 $\mu$ g	1カプセル中 アルファカルシドール 0.5 $\mu$ g	1カプセル中 アルファカルシドール 1.0 $\mu$ g
添加剤	ジブチルヒドロキソトールエン、無水エタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、カプセル本体にコハク化ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール液、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60	ジブチルヒドロキソトールエン、無水エタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、カプセル本体にコハク化ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール液、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60	ジブチルヒドロキソトールエン、無水エタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、カプセル本体にコハク化ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール液、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60

#### 3.2 製剤の性状

販売名	アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」	アルファカルシドールカプセル0.5 $\mu$ g「フソー」	アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」
性状	褐色の透明な球形軟カプセル剤であり、内容物は無色～微黄色の澄明な粘性の液で、においはない。	淡褐色の透明な球形軟カプセル剤であり、内容物は無色～微黄色の澄明な粘性の液で、においはない。	淡黄褐色の透明な球形軟カプセル剤であり、内容物は無色～微黄色の澄明な粘性の液で、においはない。
外形			
大きさ	7.0mm	7.0mm	7.0mm
識別コード	FS-E12 (一次包装シートに記載)	FS-E13 (一次包装シートに記載)	FS-E14 (一次包装シートに記載)

### 4. 効能・効果

- 下記の疾患におけるビタミンD代謝異常に伴う諸症状（低カルシウム血症、テタニー、骨痛、骨病変等）の改善  
慢性腎不全、副甲状腺機能低下症、ビタミンD抵抗性骨軟化症
- 骨粗鬆症

### 6. 用法・用量

#### （効能共通）

本剤は患者の血清カルシウム濃度の十分な管理のもとに投与量を調整する。

#### （慢性腎不全、骨粗鬆症）

通常、成人1日1回アルファカルシドールとして0.5～1.0 $\mu$ gを経口投与する。

ただし、年齢、症状により適宜増減する。

〈副甲状腺機能低下症、その他のビタミンD代謝異常に伴う疾患〉  
通常、成人1日1回アルファカルシドールとして1.0～4.0 $\mu$ gを経口投与する。

ただし、疾患、年齢、症状、病型により適宜増減する。

（小児用量）

通常、小児に対しては骨粗鬆症の場合には1日1回アルファカルシドールとして0.01～0.03 $\mu$ g/kgを、その他の疾患の場合には1日1回アルファカルシドールとして0.05～0.1 $\mu$ g/kgを経口投与する。ただし、疾患、症状により適宜増減する。

### 8. 重要な基本的注意

- 8.1 血清カルシウム上昇を伴った急性腎障害があらわれることがあるので、血清カルシウム値及び腎機能を定期的に観察すること。[8.2、8.3、10.2、11.1.1参照]
- 8.2 過量投与を防ぐため、本剤投与中、血清カルシウム値の定期的測定を行い、血清カルシウム値が正常値を超えないよう投与量を調整すること。[8.1、8.3、9.7、10.2、11.1.1参照]
- 8.3 高カルシウム血症を起こした場合には、直ちに休薬する。休薬により血清カルシウム値が正常域に達したら、減量して投薬を再開する。[8.1、8.2、10.2、11.1.1参照]

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

##### 9.1.1 高リン血症のある患者

リン酸結合剤を併用し、血清リン値を下げること。

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。動物実験（ラット）で大量投与の場合、胎児化骨遅延等がみられている。

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験（ラット）で授乳による新生児への移行率は、母動物投与量の1/20に相当する。

#### 9.7 小児等

血清カルシウム値等の観察を十分に行いながら少量から投与を開始し、漸増投与するなど、過量投与にならぬよう慎重に投与すること。幼若ラット経口投与における急性毒性は成熟ラットに比べ強くあらわれている。[8.2参照]

#### 9.8 高齢者

用量に注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
* マグネシウムを含有する製剤 酸化マグネシウム、炭酸 マグネシウム等	高マグネシウム血症 が起きたとの報告が ある。	他のビタミンD誘導体 と同様に腸管でのマ グネシウムの吸収を促 進させると考えられる。 血中マグネシウムの増 加により代謝性アルカ ローシスが持続するた め、尿細管でのカルシ ウム再吸収が増加する。
ジギタリス製剤 ジゴキシン等 [8.1-8.3参照]	不整脈があらわれる おそれがある。	本剤により高カルシウム 血症が発症した場合、 ジギタリス製剤の作用 が増強される。
カルシウム製剤 乳酸カルシウム水和物、 炭酸カルシウム等 [8.1-8.3参照]	高カルシウム血症が あらわれるおそれ がある。	本剤は腸管でのカルシ ウムの吸収を促進させ る。
ビタミンD及びその誘導体 カルシトリオール等 [8.1-8.3参照]		相加作用による。
* PTH製剤 テリパラチド等 PTHrP製剤 アバロパラチド酢酸塩 [8.1-8.3参照]		

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 急性腎障害 (頻度不明)

血清カルシウム上昇を伴った急性腎障害があらわれることがある。[8.1-8.3参照]

11.1.2 肝機能障害、黄疸 (いずれも頻度不明)

AST、ALT、AI-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1~5%未満	0.1%未満
消化器	食欲不振、悪心・嘔気、 下痢、便秘、胃痛	嘔吐、腹部膨満感、胃部不快感、 消化不良、口内異和感、口渇等
精神神経系		頭痛・頭重、不眠・いらいら感、 脱力・倦怠感、めまい、しびれ感、 眠気、記憶力・記憶力の減退、耳 鳴り、老人性難聴、背部痛、肩こ り、下肢のつっぱり感、胸痛等
循環器		軽度の血圧上昇、動悸
肝臓	AST、ALTの上昇	LDH、γ-GTPの上昇
腎臓	BUN、クレアチニンの 上昇 (腎機能の低下)	腎結石
皮膚	そう痒感	発疹、熱感
眼	結膜充血	
骨		関節周囲の石灰化 (化骨形成)
その他		嗄声、浮腫

注) 副作用の発現頻度は使用成績調査を含む

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するように指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人にアルファカルシドールとして5μg<sup>注1)</sup> 単回経口投与した場合、血漿中1α, 25-(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>濃度は速やかに上昇し9時間後に最高値となり以後漸減した。その半減期は17.6時間であった<sup>1)</sup>。


16.1.2 生物学的同等性試験

<アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」>

アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」とアルファロールカプセル0.25μgを、クロスオーバー法によりそれぞれ20カプセル (アルファカルシドールとして5μg<sup>注1)</sup>) 健康成人男子に絶食時単回経口投与して血清中1α, 25(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、C<sub>max</sub>) について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>2)</sup>。

	判定パラメータ		参考パラメータ
	AUC <sub>0-48hr</sub> (pg·hr/mL)	C <sub>max</sub> (pg/mL)	t <sub>max</sub> (hr)
アルファカルシドール カプセル0.25μg「フソー」	2021.4 (402.1)	63.4 (14.5)	8.6 (2.2)
アルファロールカプセル 0.25μg	2041.7 (473.1)	65.1 (16.3)	9.0 (2.3)

Mean(S.D.), n=24




<アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」>

アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」とアルファロールカプセル0.5μgを、クロスオーバー法によりそれぞれ10カプセル (アルファカルシドールとして5μg<sup>注1)</sup>) 健康成人男子に絶食時単回経口投与して血清中1α, 25(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、C<sub>max</sub>) について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>3)</sup>。

	判定パラメータ		参考パラメータ
	AUC <sub>0-48hr</sub> (pg·hr/mL)	C <sub>max</sub> (pg/mL)	t <sub>max</sub> (hr)
アルファカルシドール カプセル0.5μg「フソー」	1840.0 (476.8)	56.2 (11.8)	8.9 (2.5)
アルファロールカプセル 0.5μg	2071.3 (281.0)	62.4 (10.7)	8.4 (2.3)

Mean(S.D.), n=20




## 〈アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」〉

アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」とアルファロールカプセル1μgを、クロスオーバー法によりそれぞれ5カプセル（アルファカルシドールとして5μg<sup>注1）</sup>健康成人男子に絶食時単回経口投与して血清中1α, 25(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、C<sub>max</sub>）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>4)</sup>。

	判定パラメータ		参考パラメータ
	AUC <sub>0-48hr</sub> (pg·hr/mL)	C <sub>max</sub> (pg/mL)	t <sub>max</sub> (hr)
アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」	2002.4 (312.4)	60.9 (11.0)	8.4 (2.1)
アルファロールカプセル1μg	2015.8 (363.6)	62.4 (12.4)	8.6 (2.2)

Mean(S.D.), n=20



血清中濃度並びにAUC、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

注) 承認された最大用量は、1回4.0μgである。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 17.1.1 国内臨床試験

二重盲検法により、慢性腎不全、副甲状腺機能低下症及び骨粗鬆症に対する比較試験が行われ、いずれも有用性が認められた<sup>5-7)</sup>。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

#### 18.1.1 作用の発現（アルファカルシドールの25位水酸化）

経口投与後、血中に吸収され、肝の25-hydroxylaseによって側鎖の25位が水酸化され、速やかに1α, 25-(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>に代謝される<sup>8)</sup>。この肝での25位水酸化反応は四塩化炭素投与の肝障害時にも保持されている<sup>9)</sup>（ラット）。1α, 25-(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>は骨、小腸に作用し、骨形成促進作用、骨代謝改善作用、小腸からのCa吸収促進作用等を発現する。

### 18.2 作用・効果

#### 18.2.1 骨石灰化促進作用

ビタミンD欠乏あるいは低リン・高Ca食飼育ラットに対し、抗クル病作用、骨石灰化前線形成の促進作用を示す<sup>10)</sup>。

#### 18.2.2 骨吸収作用・再構成作用

アルファカルシドールの活性型代謝産物1α, 25-(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>は骨吸収作用及び骨再構成作用（軟骨細胞の骨細胞への増殖・分化）を有する<sup>11)</sup>（*in vitro*）。

#### 18.2.3 骨形成促進作用

骨形態計測においてアルファカルシドール投与により、骨芽細胞を有する類骨面比率が増加し、骨芽細胞に直接作用して骨形成を促進することが示唆されている<sup>12)</sup>（ヒト骨粗鬆症）。

#### 18.2.4 腸管におけるCa吸収作用

連日投与により、血清1α, 25-(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>値の上昇とともに低下している小腸でのCa吸収率を改善する<sup>13)</sup>（ヒト骨粗鬆症）。

### 18.2.5 血清Ca上昇作用

低Ca血症に対し、小腸からのCa吸収促進作用（ヒト慢性腎不全、副甲状腺機能低下症）と骨塩溶出作用（腎あるいは副甲状腺摘出ラット）により血清Caを上昇させる<sup>10, 14-16)</sup>。投与中止後の血清Ca値は速やかな低下を示し、血清Caの推移による半減期は3.4日と報告されている<sup>17)</sup>（ヒト）。

### 18.2.6 腎不全時の骨代謝改善作用

腎性骨ジストロフィーの骨吸収窩面、肥厚した類骨層を改善する（ヒト慢性腎不全<sup>14)</sup>、柴田腎炎ラット<sup>18, 19)</sup>）。また、肥大した副甲状腺重量及び血中副甲状腺ホルモンを低下させ、続発性の副甲状腺機能亢進を抑制する<sup>14, 18, 19)</sup>。


### 18.2.7 1α, 25-(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>との作用比較

経口投与されたアルファカルシドールの働きは、1α, 25-(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>のそれと同等、ないしそれ以上であることが示唆されている<sup>18-20)</sup>（ヒト、柴田腎炎ラット）。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：アルファカルシドール（Alfacalcidol）

構造式：



分子式：C<sub>27</sub>H<sub>44</sub>O<sub>2</sub>

分子量：400.64

化学名：(5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1α, 3β-diol

性状：白色の結晶である。エタノール（99.5）又はクロロホルムに溶けやすく、ジエチルエーテルにやや溶けやすく、水又はイソオクタンにほとんど溶けない。空気又は光によって変化する。

## 22. 包装

〈アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」〉

(PTP)100カプセル [10カプセル×10]

(PTP)500カプセル [10カプセル×50]

〈アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」〉

(PTP)100カプセル [10カプセル×10]

(PTP)500カプセル [10カプセル×50]

〈アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」〉

(PTP)100カプセル [10カプセル×10]

(PTP)500カプセル [10カプセル×50]

## 23. 主要文献

- 東平靖雄 ほか：骨代謝. 1979；12：152-162
- 社内資料：生物学的同等性試験（0.25μg）
- 社内資料：生物学的同等性試験（0.5μg）
- 社内資料：生物学的同等性試験（1.0μg）
- 藤田拓男 ほか：腎と透析. 1978；5：583-611
- 藤田拓男 ほか：ホルモンと臨床. 1979；27：99-113
- 伊丹康人 ほか：医学のあゆみ. 1982；123：958-973
- Fukushima M., et al.：Biochem Biophys Res Commun. 1975；66：632-638
- 須田立雄 ほか：診療と新薬. 1978；15：1295-1306
- 須田立雄 ほか：診療と新薬. 1976；13：1595-1617
- 鈴木不二男：ビタミン. 1982；56：457-468
- 渡辺正美 ほか：整形外科基礎科学. 1983；10：175-180
- 滋野長平 ほか：日本内分泌学会雑誌. 1982；58：1473-1481
- 鈴木正司 ほか：診療と新薬. 1978；15：1355-1374
- 福永仁夫 ほか：診療と新薬. 1978；15：1521-1524
- Kaneko C., et al.：Steroids. 1974；23：75-92
- Kanis JA., et al.：Br Med J. 1977；1：78-81
- Nishii Y., et al.：Endocrinology. 1980；107：319-27
- Fukushima M., et al.：Endocrinology. 1980；107：328-33
- 須田立雄：ビタミン. 1980；54：407-21

24. 文献請求先及び問い合わせ先

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL : 0120-381-999 FAX : 06-7708-8966

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



**扶桑薬品工業株式会社**

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

26.2 販売元

**沢井製薬株式会社**

大阪市淀川区宮原5丁目2-30