

貯 法：室温保存
有効期間：3年処方箋医薬品^{注)}

Crestor[®]錠2.5mg Crestor[®]錠5mg Crestor[®]OD錠2.5mg Crestor[®]OD錠5mg

CRESTOR[®] Tablets 2.5mg・5mg
CRESTOR[®] OD Tablets 2.5mg・5mg

	錠2.5mg	錠5mg	OD錠2.5mg	OD錠5mg
承認番号	21700AMY00008	21700AMY00007	22800AMX00102	22800AMX00103
販売開始	2005年4月		2016年6月	

注)注意－医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 肝機能が低下していると考えられる以下のような患者
急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸[9.3.1、9.3.2、16.6.2参照]
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦[9.5、9.6参照]
- 2.4 シクロスポリンを投与中の患者[10.1、16.7.2参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

〈 Crestor[®]錠2.5mg、5mg〉

販売名	Crestor [®] 錠2.5mg	Crestor [®] 錠5mg
有効成分	1錠中ロスバスタチン2.5mg (ロスバスタチンカルシウム として2.6mg)	1錠中ロスバスタチン5mg (ロスバスタチンカルシウム として5.2mg)
添加剤	乳糖水和物、結晶セルロース、第三リン酸カルシウム、クロス ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、トリ アセチン、酸化チタン、黄色三산화鉄	

〈 Crestor[®]OD錠2.5mg、5mg〉

販売名	Crestor [®] OD錠2.5mg	Crestor [®] OD錠5mg
有効成分	1錠中ロスバスタチン2.5mg (ロスバスタチンカルシウム として2.6mg)	1錠中ロスバスタチン5mg (ロスバスタチンカルシウム として5.2mg)
添加剤	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、酸化マグネシ ウム、カルメロース、スクラロース、アセスルファムカリウ ム、黄色三산화鉄、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシ ウム、香料	

3.2 製剤の性状

〈 Crestor[®]錠2.5mg、5mg〉

販売名	Crestor [®] 錠2.5mg	Crestor [®] 錠5mg
剤形	うすい赤みの黄色から くすんだ赤みの黄色の フィルムコーティング錠	うすい赤みの黄色から くすんだ赤みの黄色の フィルムコーティング錠
外形 表面		
外形 裏面		
外形 側面		
直径	約5.5mm	約7mm
厚さ	約3.1mm	約3.8mm
重量	約0.08g	約0.15g
識別コード	ZD4522 : 2 1/2	ZD4522 5

〈 Crestor[®]OD錠2.5mg、5mg〉

販売名	Crestor [®] OD錠2.5mg	Crestor [®] OD錠5mg
剤形	淡黄色の円形の素錠	淡黄色の円形の素錠
外形 表面		
外形 裏面		
外形 側面		
直径	約6mm	約8mm
厚さ	約2.7mm	約3.1mm
重量	約0.12g	約0.24g
識別コード	AZ 153	AZ 154

4. 効能又は効果

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

5. 効能又は効果に関連する注意

- 5.1 適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。
- 5.2 家族性高コレステロール血症ホモ接合体については、LDL-アフェレーシス等の非薬物療法の補助として、あるいはそれらの治療法が実施不能な場合に本剤の適用を考慮すること。

6. 用法及び用量

通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない、家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大20mgまでとする。

7. 用法及び用量に関連する注意

- 7.1 クレアチニンクリアランスが30mL/min/1.73m²未満の患者に投与する場合には、2.5mgより投与を開始し、1日最大投与量は5mgとする。[9.2.2、9.2.3、16.6.3参照]
- 7.2 特に20mg投与時においては腎機能に影響があらわれるおそれがある。20mg投与開始後12週までの間は原則、月に1回、それ以降は定期的(半年に1回等)に腎機能検査を行うなど、観察を十分に行うこと。[9.2.2、9.2.3、16.6.3参照]

8. 重要な基本的注意

- 8.1 あらかじめ高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法や高血圧、喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分考慮すること。
- 8.2 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。
- 8.3 投与開始又は増量後12週までの間は原則、月に1回、それ以降は定期的(半年に1回等)に肝機能検査を行うこと。[11.1.5参照]

8.4 血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等の観察を十分に行うこと。[11.1.6参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある以下の患者

- ・アルコール中毒患者
- ・甲状腺機能低下症の患者
- ・遺伝性の筋疾患(筋ジストロフィー等)又はその家族歴のある患者
- ・薬剤性の筋障害の既往歴のある患者

*9.1.2 重症筋無力症又はその既往歴のある患者

重症筋無力症(眼筋型、全身型)が悪化又は再発することがある。[11.1.4参照]

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 腎機能検査値異常のある患者

本剤とフィブラート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状(筋肉痛、脱力感)の発現、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。[10.2参照]

9.2.2 腎障害又はその既往歴のある患者

横紋筋融解症の報告例の多くが腎機能障害を有する患者であり、また、横紋筋融解症に伴って急激な腎機能悪化があらわれることがある。[7.1、7.2、16.6.3参照]

9.2.3 重度の腎障害のある患者

本剤の血中濃度が高くなるおそれがある。[7.1、7.2、16.6.3参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 肝機能が低下していると考えられる以下のような患者

急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸

投与しないこと。これらの患者では、本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。また、本剤は主に肝臓に分布して作用するので、肝障害を悪化させるおそれがある。[2.2、16.6.2参照]

9.3.2 肝障害又はその既往歴のある患者

本剤は主に肝臓に分布して作用するので、肝障害又はその既往歴のある患者では、肝障害を悪化させるおそれがある。特に、Child-Pughスコアが8～9の患者では、血漿中濃度が他に比べて高かったとの報告がある。[2.2、16.6.2参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。ラットに他のHMG-CoA還元酵素阻害剤を大量投与した場合に胎児の骨格奇形が報告されている。更にヒトでは、他のHMG-CoA還元酵素阻害剤で、妊娠3ヵ月までの間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれたとの報告がある。[2.3参照]

9.6 授乳婦

投与しないこと。ラットで乳汁中への移行が報告されている。[2.3参照]

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

10. 相互作用

本剤は、OATP1B1及びBCRPの基質である。

10.1 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シクロスポリン (サンディミュン、ネオオーラル等) [2.4、16.7.2参照]	シクロスポリンを投与されている心臓移植患者に併用したとき、シクロスポリンの血中濃度に影響はなかったが、本剤のAUC _{0-24h} が健康成人に単独で反復投与したときに比べて約7倍上昇したとの報告がある。	シクロスポリンがOATP1B1及びBCRP等の機能を阻害する可能性がある。

**10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フィブラート系薬剤 ベザフィブラート等 [9.2.1参照]	フェノフィブラートとの併用においては、いずれの薬剤の血中濃度にも影響はみられていない。しかし一般に、HMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	両剤共に横紋筋融解症の報告がある。 危険因子：腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者
ニコチン酸	一般に、HMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	危険因子：腎機能障害のある患者
アゾール系抗真菌薬 イトラコナゾール等		
マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン等		
チカグレロル	本剤の血漿中濃度上昇により横紋筋融解症やミオパチーのリスクが増加するおそれがある。	チカグレロルがBCRPを阻害することにより本剤の排出が阻害され、本剤の血漿中濃度が上昇する可能性がある ^{1),2)} 。
クマリン系抗凝固剤 ワルファリン	抗凝血作用が増強することがある。本剤を併用する場合は、本剤の投与開始時及び用量変更時にも頻回にプロトロンビン時間国際標準比(INR)値等を確認し、必要に応じてワルファリンの用量を調節する等、注意深く投与すること。	機序は不明
制酸剤 水酸化マグネシウム・水酸化アルミニウム [16.7.1参照]	本剤の血中濃度が約50%に低下することが報告されている。本剤投与後2時間経過後に制酸剤を投与した場合には、本剤の血中濃度は非併用時の約80%であった。	
ロビナビル・リトナビル アタザナビル/リトナビル ダルナビル/リトナビル グレカプレビル・ビブレンタスビル	本剤とロビナビル・リトナビルを併用したとき本剤のAUCが約2倍、C _{max} が約5倍、アタザナビル及びリトナビル両剤と本剤を併用したとき本剤のAUCが約3倍、C _{max} が7倍、ダルナビル及びリトナビル両剤と本剤を併用したとき本剤のAUCが約1.5倍、C _{max} が約2.4倍上昇したとの報告がある。また本剤とグレカプレビル・ビブレンタスビル ^{注)} を併用したとき、本剤のAUCが約2.2倍、C _{max} が約5.6倍上昇したとの報告がある。	左記薬剤がOATP1B1及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
ダクラタスビル アスナプレビル ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル	本剤とダクラタスビル、アスナプレビル、またはダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル ^{注)} を併用したとき、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。	ダクラタスビル、ベクラブビルがOATP1B1、1B3及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。また、アスナプレビルがOATP1B1、1B3の機能を阻害する可能性がある。
グラゾプレビル/エルバスビル	本剤とグラゾプレビル ^{注)} 及びエルバスビルを併用したとき、本剤のAUCが約2.3倍、C _{max} が約5.5倍上昇したとの報告がある。	左記薬剤がBCRPの機能を阻害する可能性がある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ソホスブビル・ベルパタスビル	本剤とベルパタスビルを併用したとき、本剤のAUCが約2.7倍、C _{max} が約2.6倍上昇したとの報告がある。	ベルパタスビルがOATP1B1、1B3及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
ダロルタミド	本剤とダロルタミドを併用したとき、本剤のAUCが5.2倍 ³⁾ 、C _{max} が5.0倍上昇したとの報告がある。	ダロルタミドがOATP1B1、1B3及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
レゴラフェニブ	本剤とレゴラフェニブを併用したとき、本剤のAUCが3.8倍、C _{max} が4.6倍上昇したとの報告がある。	レゴラフェニブがBCRPの機能を阻害する可能性がある。
カプマチニブ塩酸塩水和物	本剤とカプマチニブ塩酸塩水和物を併用したとき、本剤のAUCが約2.1倍、C _{max} が約3.0倍上昇したとの報告がある。	カプマチニブ塩酸塩がBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。
バダデュスタット	本剤とバダデュスタットを併用したとき、本剤のAUCが約2.5倍、C _{max} が約2.7倍上昇したとの報告がある。	バダデュスタットがBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。
フェブキシソスタット	本剤とフェブキシソスタットを併用したとき、本剤のAUCが約1.9倍、C _{max} が約2.1倍上昇したとの報告がある。	フェブキシソスタットがBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。
エルトロンボパグ	本剤とエルトロンボパグを併用したとき、本剤のAUCが約1.6倍上昇したとの報告がある。	エルトロンボパグがOATP1B1及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
* ホスタマチニブナトリウム水和物	本剤とホスタマチニブナトリウム水和物を併用したとき、本剤のAUCが1.96倍、C _{max} が1.88倍上昇したとの報告がある。	ホスタマチニブナトリウム水和物がBCRPの機能を阻害する可能性がある。
* ロキサデュスタット	本剤とロキサデュスタットを併用したとき、本剤のAUCが2.93倍、C _{max} が4.47倍上昇したとの報告がある。	ロキサデュスタットがOATP1B1及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
* タファミジス	本剤とタファミジスを併用したとき、本剤のAUCが1.97倍、C _{max} が1.86倍上昇したとの報告がある。	タファミジスがBCRPの機能を阻害する可能性がある。

注)承認用量外の用量における試験結果に基づく。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 横紋筋融解症(0.1%未満)

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止すること。

11.1.2 ミオパチー(頻度不明)

広範な筋肉痛、高度な脱力感や著明なCKの上昇があらわれた場合には投与を中止すること。

11.1.3 免疫介在性壊死性ミオパチー(頻度不明)

近位筋脱力、CK高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗HMG-CoA還元酵素(HMGCR)抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例がある。

*11.1.4 重症筋無力症(頻度不明)

重症筋無力症(眼筋型、全身型)が発症又は悪化することがある。[9.1.2参照]

11.1.5 肝炎(0.1%未満)、肝機能障害(1%未満)、黄疸(頻度不明)

肝炎、AST、ALTの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。[8.3参照]

11.1.6 血小板減少(0.1%未満)

[8.4参照]

11.1.7 過敏症状(0.1%未満)

血管浮腫を含む過敏症状があらわれることがある。

11.1.8 間質性肺炎(0.1%未満)

長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.9 末梢神経障害(0.1%未満)

四肢の感覚鈍麻、しびれ感等の感覚障害、疼痛、あるいは筋力低下等の末梢神経障害があらわれることがある。

11.1.10 多形紅斑(頻度不明)

*11.2 その他の副作用

	2～5%未満	0.1～2%未満	0.1%未満	頻度不明
* 皮膚		そう痒症、発疹、蕁麻疹		苔癬様皮疹
消化器		腹痛、便秘、嘔気、下痢	膝炎、口内炎	
筋・骨格系	CK上昇	無力症、筋肉痛、関節痛	筋痙攣	
精神神経系		頭痛、浮動性めまい	健忘、睡眠障害(不眠、悪夢等)、抑うつ	
内分泌				女性化乳房
代謝異常			HbA1c上昇、血糖値上昇	
肝臓	肝機能異常(AST上昇、ALT上昇)			
腎臓		蛋白尿 ^{注)} 、腎機能異常(BUN上昇、血清クレアチニン上昇)		

注) 通常一過性であるが、原因不明の蛋白尿が持続する場合には減量するなど適切な処置を行うこと。

発現頻度は使用成績調査から算出した。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

〈OD錠〉

本剤は一包化調剤を避けること。[20.2参照]

14.2 薬剤交付時の注意

〈製剤共通〉

14.2.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

〈OD錠〉

14.2.2 本剤は舌の上のにせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

海外において、本剤を含むHMG-CoA還元酵素阻害剤投与中の患者では、糖尿病発症のリスクが高かったとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人男性6例にロスバスタチンカルシウムを5mgの用量で空腹時に単回経口投与したところ、血漿中ロスバスタチン濃度は投与後5時間にC_{max}を示し、消失半減期(t_{1/2})は20.2±7.8時間であった。また、C_{max}及びAUC_{0-24h}はそれぞれ3.56±1.35ng/mL及び31.3±13.6ng・h/mLであった(平均値±標準偏差)⁴⁾。
なお、ロスバスタチンの体内動態は線形であると考えられている(外国人

データ⁵⁾。

16.1.2 生物学的同等性

健康成人男性にクレストール錠5mg又はクレストールOD錠5mgそれぞれ1錠をクロスオーバー法にて空腹時に単回経口投与し、薬物動態を比較した。 C_{max} 及びAUCの対数の平均値の差について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.8) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、クレストールOD錠は、水なしで服用又は水ありで服用した場合のいずれにおいてもクレストール錠と生物学的に同等であった⁶⁾。

クレストールOD錠2.5mgは、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性ガイドライン」(平成24年2月29日付 薬食審査発0229第10号)に基づき、クレストールOD錠5mgを標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。

表1 健康成人男性における薬物動態パラメータ

用量		n	$C_{max}^a)$ (ng/mL)	$T_{max}^b)$ (h)	$AUC_{0-last}^a)$ (ng·h/mL)	$t_{1/2}^b)$ (h)
クレストール錠5mg		65	4.56 (50.3)	4.02 ± 1.49	48.90 (39.7)	14.0 $\pm 10.9^c)$
クレストールOD錠5mg	水なし	65	4.31 (49.1)	3.89 ± 1.35	48.26 (40.1)	14.2 $\pm 11.8^c)$
	水あり	64	4.53 (51.3)	3.92 ± 1.47	48.31 (40.6)	14.7 $\pm 10.3^d)$

a) 幾何平均値(変動係数)、b) 平均値±標準偏差、c) n=64、d) n=63




図 クレストール錠 5mg 及びクレストール OD 錠 5mg を水なし、水ありで服用したときの血漿中ロスバスタチン濃度推移 (平均値 ± 標準偏差)

16.1.3 反復投与

健康成人男性6例にロスバスタチンカルシウム10及び20mgを1日1回7日間、空腹時に反復経口投与したところ、投与後24時間の血漿中ロスバスタチン濃度は徐々に上昇し、反復投与3回目にはほぼ定常状態に到達した⁷⁾。定常状態における AUC_{0-24h} は単回投与時の1.2倍であり、その値は単回投与での結果からの予測値と同程度であった。したがって、反復投与による予想以上の蓄積性はないと考えられた。なお、日本人における C_{max} 及びAUCは白人の約2倍であった。

表2 健康成人男性におけるロスバスタチンの薬物動態パラメータ (n=6)

用量 (mg)		$C_{max}^a)$ (ng/mL)	$T_{max}^b)$ (h)	$AUC_{0-24h}^a)$ (ng·h/mL)	$AUC_{0-\infty}^a)$ (ng·h/mL)	$t_{1/2}^c)$ (h)
10	単回	7.87 (54.4)	5(4-5)	74.2(56.0)	126(39.3) ^{d)}	$15.1 \pm 5.36^d)$
	反復	9.38 (71.5)	5(5-5)	90.5(67.0)	167(30.0) ^{e)}	$18.4 \pm 4.62^e)$
20	単回	20.5 (54.6)	4(3-5)	171(53.0)	209(50.1)	19.1 ± 5.81
	反復	22.1 (68.0)	5(5-5)	206(63.9)	248(62.2)	14.8 ± 5.76

a) 幾何平均値(変動係数)、b) 中央値(範囲)、c) 平均値±標準偏差

d) n=3、e) n=4




図 健康成人男性における1日1回7日間反復経口投与時の血漿中ロスバスタチン濃度推移(幾何平均値±標準偏差、n=6)

高コレステロール血症患者に本剤2.5~20mgを1日1回6週間反復経口投与し、定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度を測定した⁸⁾。高コレステロール血症患者の血漿中ロスバスタチン濃度は用量にほぼ比例して増加し、健康成人男性での値(投与後10時間の幾何平均値、10mg: 4.06ng/mL、20mg: 9.82ng/mL)とほぼ同程度であった。なお、本試験で日本人と白人の結果を比較したところ、日本人における定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度は白人の約2倍であった。

表3 高コレステロール血症患者における定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度

投与量	血漿中ロスバスタチン濃度(ng/mL)
2.5mg(n=16)	1.26(72.7)
5mg(n=12)	2.62(41.5)
10mg(n=13)	4.17(75.5)
20mg(n=17)	11.7(50.0)

幾何平均値(変動係数) 採血時間: 投与後7~16時間

16.1.4 投与時間の影響

外国人健康成人21例にロスバスタチンカルシウム10mgをクロスオーバー法で1日1回14日間、午前7時あるいは午後6時に経口投与したところ、血漿中ロスバスタチン濃度推移は両投与時間で同様であり、本剤の体内動態は投与時間の影響を受けないと考えられた⁹⁾。

16.2 吸収

16.2.1 生物学的利用率

健康成人男性10例におけるロスバスタチンの生物学的利用率は29.0%(90%信頼区間: 24.1~34.9)であった¹⁰⁾。また、静脈内投与して得られたロスバスタチンの全身クリアランス及び腎クリアランスはそれぞれ31.9及び11.6L/hであり、ロスバスタチンは主に肝臓による消失を受けると考えられた。

16.2.2 食事の影響

外国人健康成人20例にロスバスタチンカルシウム10mgをクロスオーバー法で1日1回14日間、空腹時(食後3時間)あるいは食後に経口投与した¹¹⁾。食後投与したときの本剤の吸収は空腹時に比べて緩やかであり、 C_{max} は食事によって20%低下した。しかし、食後投与時の AUC_{0-24h} は空腹時投与の94%であり、本剤の吸収量への食事の影響はないと考えられた。

16.3 分布

ヒト血漿中におけるロスバスタチンの蛋白結合率は89.0%(日本人)~88.0%(外国人)であり、主結合蛋白はアルブミンであった¹²⁾。

16.4 代謝

外国人健康成人男性6例に¹⁴C-ロスバスタチンカルシウム20mgを単回経口投与したところ、尿及び糞中に存在する放射能の主成分は未変化体であり、尿糞中の主な代謝物は、*N*-脱メチル体及び5*S*-ラクトン体であった¹³⁾。ヒト血漿中には*N*-脱メチル体及び5*S*-ラクトン体が検出されたが、HMG-CoA還元酵素阻害活性体濃度はロスバスタチン濃度と同様の推移を示し、血漿中におけるHMG-CoA還元酵素阻害活性性に対する代謝物の寄与はわずかとであるとされた(外国人データ¹⁴⁾)。

16.5 排泄

外国人健康成人男性6例に¹⁴C-ロスバスタチンカルシウム20mgを単回経口投与したところ、放射能は主に糞中に排泄され(90.2%)、尿中放射能排泄率は10.4%であった。また、尿及び糞中への未変化体排泄率は、それぞれ投与量の4.9%及び76.8%であった¹³⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 性差及び加齢の影響

外国人の男性若年者、男性高齢者、女性若年者及び女性高齢者各8例にロスバスタチンカルシウム40mg(承認外用量)を単回経口投与したところ、男性の C_{max} 及び AUC_{0-t} はそれぞれ女性の82%及び91%であった¹⁵⁾。また、若年者の C_{max} 及び AUC_{0-t} はそれぞれ高齢者の112%及び106%であり、臨床問題となる性差や加齢の影響はないと考えられた。

16.6.2 肝障害の影響

Child-Pugh A(スコア：5～6)あるいはChild-Pugh B(スコア：7～9)の肝障害を有する外国人患者各6例にロスバスタチンカルシウム10mgを1日1回14日間反復経口投与し、血漿中ロスバスタチン濃度を測定した¹⁶⁾。肝障害患者のC_{max}及びAUC_{0-24h}は健康成人群のそれぞれ1.5～2.1倍及び1.05～1.2倍であり、特に、Child-Pughスコアが8～9の患者2例における血漿中濃度は、他に比べて高かった。[2.2、9.3参照]

16.6.3 腎障害の影響

重症度の異なる腎障害を有する外国人患者(4～8例)にロスバスタチンカルシウム20mgを1日1回14日間反復経口投与し、血漿中ロスバスタチン濃度を測定した¹⁷⁾。軽度から中等度の腎障害のある患者では、ロスバスタチンの血漿中濃度に対する影響はほとんど認められなかった。しかし、重度(クレアチニンクリアランス<30mL/min/1.73m²)の腎障害のある患者では、健康成人に比べて血漿中濃度が約3倍に上昇した。[7.1、9.2参照]

16.7 薬物相互作用

16.7.1 制酸剤

制酸剤を同時併用投与した場合、ロスバスタチンのC_{max}及びAUC_{0-24h}はそれぞれ50%及び46%まで低下したが、ロスバスタチン投与後2時間に制酸剤を投与した場合には、ロスバスタチンのC_{max}及びAUC_{0-24h}はそれぞれ非併用時の84%及び78%であった(外国人データ)¹⁸⁾。[10.2参照]

16.7.2 シクロスポリン

シクロスポリンを投与されている心臓移植患者にロスバスタチンを併用投与したとき、ロスバスタチンのC_{max}及びAUC_{0-24h}は、健康成人に単独で反復投与したときに比べてそれぞれ10.6倍及び7.1倍上昇した(外国人データ)¹⁹⁾。ロスバスタチンはOATP1B1を介して肝臓に取り込まれ、シクロスポリンはその取り込みを阻害することによって、ロスバスタチンの血漿中濃度を増加させると考えられている。[2.4、10.1参照]

16.7.3 ゲムフィブロジル

ゲムフィブロジル(本邦未承認)と併用投与したとき、ロスバスタチンのC_{max}及びAUC_{0-t}はそれぞれ2.21倍及び1.88倍に増加した(外国人データ)²⁰⁾。ロスバスタチンはOATP1B1を介して肝臓に取り込まれ、ゲムフィブロジルはその取り込みを阻害することによって、ロスバスタチンの血漿中濃度を増加させると考えられている。

16.7.4 その他の薬剤

ロスバスタチンの体内動態に及ぼすP450阻害剤の影響を検討するために、フルコナゾール²¹⁾(CYP2C9及びCYP2C19の阻害剤)、ケトコナゾール²²⁾、イトラコナゾール²³⁾及びエリスロマイシン²⁴⁾(以上CYP3A4及びP糖蛋白の阻害剤)との併用試験を実施したが、明らかな相互作用は認められなかった(外国人データ)。ワルファリン²⁵⁾(CYP2C9及びCYP3A4の基質)あるいはジゴキシン²⁶⁾の体内動態に及ぼす影響を検討したが、薬物動態学的相互作用は認められなかった(外国人データ)。CYP3A4誘導作用の有無を検討するために、経口避妊薬との併用試験を実施したが、エチニルエストラジオールの血漿中濃度に減少はみられず、ロスバスタチンはCYP3A4に対する誘導作用を示さないと考えられた(外国人データ)²⁷⁾。

16.7.5 *in vitro* 試験

ヒト遊離肝細胞を用いる*in vitro* 試験において*N*-脱メチル体が生成したが、その代謝速度は非常に緩徐であった。また、*N*-脱メチル化に関与する主なP450分子種はCYP2C9及びCYP2C19であったが、CYP2D6やCYP3A4が関与する可能性も示唆された²⁸⁾。ロスバスタチン(50μg/mL)によるP450(CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1及びCYP3A4)活性の阻害率は10%以下であった²⁸⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈高コレステロール血症〉

17.1.1 海外第III相用量反応試験²⁹⁾

高コレステロール血症患者を対象として二重盲検法により実施された試験において、本剤(5～80mg)又はアトルバスタチン(10～80mg)を1日1回6週間投与した結果、本剤は、LDL-コレステロール、総コレステロール、トリグリセリドには低下効果を、HDL-コレステロールには増加効果を示した。また、アポ蛋白B、非HDL-コレステロールを低下させ、アポ蛋白A-Iを増加させた。更に、LDL-コレステロール/HDL-コレステロール比、総コレステロール/HDL-コレステロール比、非HDL-コレステロール/HDL-コレステロール比、アポ蛋白B/アポ蛋白A-I比を低下させた。本剤の薬効は、投与後1週間以内にあらわれ、通常2週間までに最大効果の90%となった。最大効果は通常4週間までにあらわれ、その後持続した。副作用発現頻度は、本剤5mg投与群で10.5%(4/38例)、10mg投与群では15.6%(7/45例)、及び20mg投与群で17.9%(7/39例)であった。いずれの投与群でも、3例以上発現した副作用はなかった。

17.1.2 国内第II相試験³⁰⁾

二重盲検法により実施された試験において、本剤2.5～20mgを1日1回6週間投与した際の血清脂質値の平均変化率は表1のとおりであった。

表1 血清脂質値の平均変化率(高コレステロール血症患者対象試験)

投与量	2.5mg (n=17)	5mg (n=12)	10mg (n=14)	20mg (n=18)
LDL-コレステロール(%)	- 44.99	- 52.49	- 49.60	- 58.32
総コレステロール(%)	- 31.59	- 36.40	- 34.60	- 39.58
トリグリセリド(%)	- 17.35	- 23.58	- 19.59	- 17.01
HDL-コレステロール(%)	7.64	9.09	14.04	11.25
アポ蛋白B(%)	- 38.56	- 45.93	- 43.97	- 50.38
アポ蛋白A-I(%)	5.42	6.25	10.61	9.72
アポ蛋白A-II(%)	0.38	4.27	7.78	7.73

副作用発現頻度は、本剤2.5mg投与群で38.9%(7/18例)、5mg投与群で20.0%(3/15例)、10mg投与群で13.3%(2/15例)、及び20mg投与群で47.4%(9/19例)であった。計67例において3例以上認められた副作用は、腹痛、CK上昇及びγ-GTP上昇(各3例)であった。

17.1.3 海外第III相試験³¹⁾

二重盲検法により実施された3試験の集積データをまとめた。本剤5mg又は10mgを1日1回12週間投与した際の血清脂質の平均変化率は表2のとおりであり、高コレステロール血症患者の脂質レベルを総合的に改善することが認められた。

表2 血清脂質値の平均変化率(外国人高コレステロール血症患者対象試験)

投与量	5mg(n=390)	10mg(n=389)
LDL-コレステロール(%)	- 41.9	- 46.7
総コレステロール(%)	- 29.6	- 33.0
トリグリセリド(%)	- 16.4	- 19.2
HDL-コレステロール(%)	8.2	8.9
非HDL-コレステロール(%)	- 38.2	- 42.6
アポ蛋白B(%)	- 32.7	- 36.5
アポ蛋白A-I(%)	6.0	7.3

17.1.4 海外第III相長期投与試験^{32),33)}

高コレステロール血症患者を対象として二重盲検法により実施された試験において、本剤5mg又は10mgから投与を開始し、LDL-コレステロール値がNCEP IIガイドラインの目標値に達するまで増量した。52週時において初回投与量の5mg又は10mgの継続投与を受けていた症例の割合は、それぞれ76%(92/121例)及び82%(88/107例)であった。副作用の発現率は本剤5mg群で29.4%(40/136例)、本剤10mg群で26.5%(35/132例)であった。いずれかの投与群で3例以上発現した副作用は便秘、下痢、消化不良、鼓腸、筋痛、不眠症、発疹、味覚錯乱、腹痛及び無力症であった。

〈家族性高コレステロール血症〉

17.1.5 国内第II相長期投与試験³⁴⁾

家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体患者に本剤10mgから投与を開始し、6週間隔で強制増量した。そのときの血清脂質値の平均変化率は表3のとおりであった。

表3 血清脂質値の平均変化率

(家族性高コレステロール血症患者対象試験)

投与量	10mg(n=36)	20mg(n=36)
LDL-コレステロール(%)	- 49.17	- 53.91
総コレステロール(%)	- 39.35	- 43.30
トリグリセリド(%)	- 18.20	- 23.62
HDL-コレステロール(%)	9.57	13.75

3例以上に認められた副作用はCK上昇(3/37例、8.1%)であった。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ロスバスタチンカルシウムは、肝臓内に能動的に取り込まれ、肝臓でのコレステロール合成系の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素を選択的かつ競合的に阻害し、コレステロール合成を強力に抑制する。その結果、肝臓内のコレステロール含量が低下し、これを補うためLDL受容体の発現が誘導される。このLDL受容体を介して、コレステロール含有率の高いリポ蛋白であるLDLの肝臓への取り込みが増加し、血中コレステロールが低下する。本剤は、肝臓では主として能動輸送系を介して取り込まれ³⁵⁾、脂質親和性が比較的低いため、能動輸送系を持たない他の臓器には取り込まれにくく、肝特異的なHMG-CoA還元酵素阻害剤であると考えられる。

18.1.1 HMG-CoA還元酵素阻害作用

ロスバスタチンカルシウムは、ラット及びヒト肝ミクロソーム由来のHMG-CoA還元酵素及びヒトHMG-CoA還元酵素の触媒ドメインに対して阻害作用を示した(*in vitro*)³⁶⁾。

18.1.2 肝コレステロール合成阻害作用

ロスバスタチンカルシウムは、ラット肝細胞のコレステロール合成を用量依存的に阻害した。また、その阻害作用は、他のHMG-CoA還元酵素阻害剤に比

べて長期間持続した³⁶⁾。

18.1.3 LDL受容体誘導作用

ロスバスタチンカルシウムは、ヒト肝癌由来HepG2細胞のLDL受容体mRNAの発現を濃度依存的に誘導し、また、LDL結合活性を増加させた(*in vitro*)³⁷⁾。

18.2 血中コレステロール低下作用

ロスバスタチンカルシウムは、イヌ³⁸⁾、カンクイザル³⁹⁾、WHHLウサギ(ヒト家族性高コレステロール血症のモデル動物)⁴⁰⁾において血清総コレステロールを、また、アポ蛋白E³Leidenトランスジェニックマウス(高VLDL血症モデル動物)⁴¹⁾及びヒトアポ蛋白B/CETP(コレステロールエステル転送蛋白)トランスジェニックマウス(ヒトのコレステロール代謝に類似した脂質代謝環境を有するモデル動物)⁴²⁾においては血漿中コレステロールを有意に低下させた。イヌにおいては、HMG-CoA還元酵素の反応産物であるメバロン酸の血中濃度を用量依存的に低下させた³⁸⁾。

18.3 動脈硬化進展抑制作用

ロスバスタチンカルシウムは、WHHLウサギにおいて、大動脈の脂質沈着面積、コレステロール含量の低下をもたらし、動脈硬化病変の進展を抑制した⁴⁰⁾。

18.4 トリグリセリド低下作用

ロスバスタチンカルシウムは、アポ蛋白E³Leidenトランスジェニックマウス及びヒトアポ蛋白B/CETPトランスジェニックマウスの血漿中トリグリセリドを低下させた^{41),42)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称

ロスバスタチンカルシウム(Rosuvastatin Calcium)(JAN)(日局)

化学名

Monocalcium bis[(3*R*,5*S*,6*E*)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate]


分子式

(C₂₂H₂₇FN₃O₆S)₂Ca

分子量

1001.14

化学構造式



性状

本品は白色の粉末である。

本品はアセトニトリルに溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、水又はエタノール(99.5)に溶けにくい。

本品は吸湿性である。

20. 取扱い上の注意

〈錠〉

20.1 アルミピロー包装開封後は湿気を避けて保存すること。

〈OD錠〉

20.2 アルミピロー包装開封後は湿気を避けて保存すること。また、光によって分解するため、服用直前までPTPシートから取り出さないこと。

22. 包装

〈フレストール錠2.5mg〉

100錠[10錠(PTP)×10]

500錠[10錠(PTP)×50]

〈フレストール錠5mg〉

100錠[10錠(PTP)×10]

500錠[10錠(PTP)×50]

〈フレストールOD錠2.5mg〉

100錠[10錠(PTP)×10]

500錠[10錠(PTP)×50]

700錠[14錠(PTP)×50]

〈フレストールOD錠5mg〉

100錠[10錠(PTP)×10]

700錠[14錠(PTP)×50]

**23. 主要文献

- 1) Lehtisalo M, et al. Br J Clin Pharmacol. 2023;89(7):2309-15
- 2) Lehtisalo M, et al. Clin Pharmacol Ther. 2024;115(1):71-9
- 3) Zurth C, et al.: Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2019;44(6):747-59
- 4) 社内資料(単回投与後の血漿中濃度, 1996)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.3.1.2)
- 5) Martin PD, et al. Clin Ther 2003;25(8):2215-24
- 6) 社内資料(生物学的同等性, 2014)
- 7) 社内資料(反復投与後の血漿中濃度, 2001)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.4)
- 8) 社内資料(患者における血漿中濃度, 2002)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.6)
- 9) Martin PD, et al. Br J Clin Pharmacol. 2002;54(5):472-7
- 10) 社内資料(生物学的利用率, 2001)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.5)
- 11) 社内資料(食事の影響, 2000)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.7.5)
- 12) 社内資料(蛋白結合率, 2000)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ2.2.5)
- 13) 社内資料(尿糞中排泄率, 1999)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.7.9.5)
- 14) 社内資料(HMG-CoA還元酵素阻害活性体の血漿中濃度, 2000)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.7.9.4)
- 15) Martin PD, et al. J Clin Pharmacol. 2002;42(10):1116-21
- 16) Simonson SG, et al. Eur J Clin Pharmacol. 2003;58(10):669-75
- 17) 社内資料(腎障害の影響, 2001)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.7.11)
- 18) 社内資料(薬物相互作用－制酸剤, 2000)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要へ3.7.12.2 (f))
- 19) Simonson SG, et al. Clin Pharmacol Ther. 2004;76(2):167-77
- 20) Schneck DW, et al. Clin Pharmacol Ther. 2004;75(5):455-63
- 21) Cooper KJ, et al. Eur J Clin Pharmacol. 2002;58(8):527-31
- 22) Cooper KJ, et al. Br J Clin Pharmacol. 2003;55(1):94-9
- 23) Cooper KJ, et al. Clin Pharmacol Ther. 2003;73(4):322-9
- 24) Cooper KJ, et al. Eur J Clin Pharmacol. 2003;59(1):51-6
- 25) Simonson SG, et al. J Clin Pharmacol. 2005;45(8):927-34
- 26) Martin PD, et al. J Clin Pharmacol. 2002;42(12):1352-7
- 27) Simonson SG, et al. Br J Clin Pharmacol. 2004;57(3):279-86
- 28) McCormick AD, et al. J Clin Pharmacol 2000;40:1055
- 29) Schneck DW, et al. Am J Cardiol. 2003;91(1):33-41
- 30) 社内資料(日本人高コレステロール血症患者における有効性, 2002)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト1.2.3)
- 31) 社内資料(外国人高コレステロール血症患者における有効性, 2001)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト2.1.2.1)
- 32) 社内資料(外国人高コレステロール血症患者の長期投与における有効性, 2001)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト1.5.2)
- 33) Olsson AG, et al. Am Heart J. 2002;144(6):1044-51
- 34) Mabuchi H, et al. J Atheroscler Thromb. 2004;11(3):152-8
- 35) Nezasa K, et al. Xenobiotica. 2003;33(4):379-88
- 36) McTaggart F, et al. Am J Cardiol. 2001;87(5A):28B-32B
- 37) 社内資料(LDL受容体に対する作用, 2002)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト1.2.3)
- 38) 社内資料(イヌの血中脂質に対する作用, 2002)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト1.1.1)
- 39) 社内資料(カンクイザルの血清コレステロール及びリポ蛋白コレステロールに対する作用, 2002)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト1.1.2)
- 40) 社内資料(WHHLウサギの血清コレステロール及び動脈硬化病変に対する作用, 2002)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト1.1.3)
- 41) 社内資料(アポ蛋白E³Leidenトランスジェニックマウスに対する作用, 2002)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト1.1.4)
- 42) 社内資料(ヒトアポ蛋白B/CETPトランスジェニックマウスに対する作用, 2002)(承認年月日:2005.01.19、申請資料概要ト1.1.5)

24. 文献請求先・製品情報問い合わせ先

アストラゼネカ株式会社 メディカルインフォメーションセンター

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号

TEL 0120-189-115

®: アストラゼネカグループであるIPR社の登録商標です。

<https://www.astrazeneca.com> © AstraZeneca 2005

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



アストラゼネカ株式会社

大阪市北区大深町3番1号

CRS