

貯 法：室温保存
有効期間：3年

パーキンソン症候群治療剤

日本薬局方トリヘキシフェニジル塩酸塩錠

トリヘキシフェニジル 塩酸塩錠 2 mg「アメル」

Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets 「AMEL」

処方箋医薬品

注意 - 医師等の処方箋により使用すること

承認番号	22700AMX00093
販売開始	1998年12月

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 閉塞隅角線内障の患者【抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。】
- 2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 重症筋無力症の患者【抗コリン作用により症状を増悪させるおそれがある。】

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg 「アメル」
有効成分	1錠中、日局トリヘキシフェニジル塩酸塩 2mg を含有する。
添加剤	結晶セルロース、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物

3.2 製剤の性状

販売名	剤形・色	外形・大きさ等	識別コード
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg 「アメル」	割線入り素錠 白色	直径：約 6.0mm 厚さ：約 2.7mm 質量：約 100.0mg	KW331

4. 効能又は効果

- 特発性パーキンソニズム
- その他のパーキンソニズム（脳炎後、動脈硬化性）
- 向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア（遅発性を除く）・アカシジア

5. 効能又は効果に関する注意

抗パーキンソン病薬はフェノチアジン系薬剤、レセルピン誘導体等による口周部等の不随意運動（遅発性ジスキネジア）を通常軽減しない。場合によってはこのような症状を増悪顕性化させることがある。

6. 用法及び用量

<特発性パーキンソニズム及びその他のパーキンソニズム（脳炎後、動脈硬化性）>

通常成人にはトリヘキシフェニジル塩酸塩として、第1日目 1mg、第2日目 2mg、以後1日につき 2mg ずつ增量し、1日量 6~10mg を維持量として3~4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

<向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア（遅発性を除く）・アカシジア>

通常成人にはトリヘキシフェニジル塩酸塩として、1日量 2~10mg を3~4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

7. 用法及び用量に関する注意

本剤の投与は、少量から開始し、観察を十分に行い慎重に維持量まで增量すること。また、他剤から本剤に切り替える場合には、他剤を徐々に減量しながら本剤を增量するのが原則である。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤投与中は定期的に隅角検査及び眼圧検査を行うことが望ましい。
- 8.2 眠気、眼の調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 開放隅角線内障の患者

抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。

9.1.2 前立腺肥大等尿路に閉塞性疾患のある患者

抗コリン作用により症状を増悪させるおそれがある。

9.1.3 不整脈又は頻拍傾向のある患者

抗コリン作用により症状を増悪させるおそれがある。

9.1.4 高血圧の患者

抗コリン作用により症状を増悪させるおそれがある。

9.1.5 高温環境にある患者

抗コリン作用により発汗抑制が起りやすい。

9.1.6 胃腸管に閉塞性疾患のある患者

抗コリン作用により症状を増悪させるおそれがある。

9.1.7 動脈硬化性パーキンソン症候群の患者

精神神経系の副作用が起りやすい。

9.1.8 脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者

悪性症候群が起りやすい。

9.2 腎機能障害患者

副作用が強くあらわれるおそれがある。

9.3 肝機能障害患者

副作用が強くあらわれるおそれがある。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

せん妄、不安等の精神症状及び抗コリン作用による口渴、排尿困難、便秘等があらわれやすい。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗コリン作用を有する薬剤（フェノチアジン系薬剤、三環系抗うつ剤等）	腸管麻痺（食欲不振、恶心、嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうつ滞等の症状）を来し、麻痺性イレウスに移行することがある。 腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 なお、この恶心、嘔吐はフェノチアジン系薬剤等の制吐作用により不顕性化することもある。	相互に抗コリン作用が増強されるためと考えられている。
中枢神経抑制剤（フェノチアジン系薬剤、三環系抗うつ剤、モノアミン酸化酵素阻害剤等）	本剤の作用が増強されることがある。 また、三環系抗うつ剤との併用では、精神錯乱、興奮、幻覚等の副作用が増強されることがある。 このような症状があらわれた場合には減量又は休薬など適切な処置を行うこと。	相互に中枢神経抑制作用が増強されるためと考えられている。
他の抗パーキンソン病薬（レボドバ、アマンタジン等）	精神神経系の副作用が増強されることがある。 このような場合には減量又は休薬など適切な処置を行うこと。	作用機序は明らかでない。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 悪性症候群（頻度不明）

抗精神病薬、抗うつ薬及びドパミン作動系抗パーキンソン病薬との併用において、本剤及び併用薬の減量又は中止により、発熱、無動緘默、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血清CKの上昇があらわれることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下があらわれることがある。

11.1.2 精神錯乱（頻度不明）、幻覚（頻度不明）、せん妄（頻度不明）

11.1.3 閉塞隅角緑内障（頻度不明）

長期投与により閉塞隅角緑内障があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
精神神経系	興奮、神経過敏、気分高揚、多幸症、見当識障害、眠気、運動失調、眩暈、頭痛、倦怠感
消化器	恶心、嘔吐、食欲不振、口渴、便秘
泌尿器	排尿困難、尿閉
過敏症	発疹
循環器	心悸亢進
眼	調節障害、散瞳

13. 過量投与

13.1 症状

アトロビン様の口内乾燥（口渴）、呼吸抑制、顔面紅潮、恶心、嘔吐、意識混濁（精神錯乱）、精神障害、残尿感、痙攣、筋の不協調等の症状があらわれる。また、急性器質性神経症（激興、見当識障害、記憶減退を伴う幻覚等）があらわれる。

これは服用数時間のうちに症状が最高となる。中毒症状は通常2~3日で消失するが、精神症状の場合、ときには数ヵ月続くこともある^{1)~3)}。

13.2 処置

特異的な解毒剤としてサリチルフィゾスチグミン^{注)}がある。治療は次のように行なう。

- ・1~2mgのサリチルフィゾスチグミンを直ちに筋注する。
サリチルフィゾスチグミンは血液脳関門を通過するので本剤による精神症状は注射後5~10分後に消失する。
- ・サリチルフィゾスチグミン注射は90分毎に必要に応じて繰返す。その他推奨できる治療法として、抑うつに対する興奮剤、興奮に対する鎮静剤、大量流涎に対するピロカルピン又はメタコリン散瞳又は毛様筋麻痺に対する縮瞳剤等の使用がある。

注) 国内では多くはネオスチグミンメチル硫酸塩が代用されている。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縫隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

中枢性に抗コリン作用を発揮することにより奏功する抗パーキンソン病薬。パーキンソン病の原因はドパミン作動性神経の変性脱落であり、この神経と機能的にバランスをとっているコリン作動性神経が相対的に過剰活動状態となっている。したがって、コリン作動性神経を抑制することにより治療効果が得られる⁴⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名

トリヘキシフェニル塩酸塩（Trihexyphenidyl Hydrochloride）

化学名

(1RS)-1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol monohydrochloride

分子式

C₂₀H₃₁NO · HCl

分子量

337.93


性状

白色の結晶性の粉末で、においはなく、味は苦い。

エタノール(95)にやや溶けやすく、酢酸(100)にやや溶けにくく、水に溶けにくく、無水酢酸に極めて溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

融点：約250°C（分解）。

構造式



及び鏡像異性体

22. 包装

- 100錠 [10錠（PTP）×10]
- 1,000錠 [10錠（PTP）×100]
- 1,000錠 [瓶、バラ]

23. 主要文献

- 1) Bolin, R. R. : J Nerv Ment Dis. 1960; 131 (3) : 256-259
- 2) Hussain, M. Z. : Can Med Assoc J. 1971; 104 (5) : 420-421
- 3) Stephens, D. A. : Br J Psychiatry. 1967; 113 (495) : 213-218
- 4) 第十八改正日本薬局方解説書. 廣川書店. 2021 : C-3671

24. 文献請求先及び問い合わせ先

共和薬品工業株式会社 お問い合わせ窓口
〒 530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4
TEL 0120-041-189
FAX 06-6121-2858

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

共和薬品工業株式会社

大阪市北区中之島 3 - 2 - 4