

貯 法：室温保存
有効期間：3年

副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合錠

ヒスタブ"ロック"配合錠

Histablock Combination Tablets

処方箋医薬品
注意 - 医師等の処方箋により使用すること

承認番号	22100AMX00918
販売開始	1994年7月

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 適応、症状を考慮し、他の治療法によって十分に治療効果が期待できる場合には、本剤を投与しないこと。また、局所的投与で十分な場合には、局所療法を行うこと。
- 2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 閉塞隅角緑内障の患者【抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。】
- 2.4 前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患のある患者【抗コリン作用により排尿困難、尿閉等があらわれ、症状が増悪することがある。】
- 2.5 デスモプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者[10.1 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ヒスタブロック配合錠
有効成分	1錠中 日局ベタメタゾン 0.25mg 日局 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.0mg
添加剤	無水乳糖、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム

3.2 製剤の性状

販売名	剤形・色	外形・大きさ等	識別コード
ヒスタブロック配合錠	素錠	KW 513	KW513
	白色	直径：約 8.0mm 厚さ：約 3.4mm 質量：約 190mg	

4. 効能又は効果

- 蕁麻疹（慢性例を除く）
- 湿疹・皮膚炎群の急性期及び急性増悪期
- 葉疹
- アレルギー性鼻炎

6. 用法及び用量

通常、成人には1回1~2錠を1日1~4回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
ただし、本剤を漫然と使用するべきではない。

7. 用法及び用量に関する注意

本剤は副腎皮質ホルモンをブレドニゾロン換算で、1錠中2.5mg相当量を含有するので、症状改善後は漫然として使用することのないよう注意すること。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
- 8.2 本剤の投与により、誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍、糖尿病、精神障害等の重篤な副作用があらわれることがある。特に、本剤投与中に水痘又は麻疹に感染

すると、致命的な経過をたどることがある。このため、本剤の投与にあたっては次の注意が必要である。

- ・本剤投与前に水痘又は麻疹の既往や予防接種の有無を確認すること。
- ・水痘又は麻疹の既往のない患者においては、水痘又は麻疹への感染を極力防ぐよう常に十分な配慮と観察を行うこと。感染が疑われる場合や感染した場合には、直ちに受診するよう指導し、適切な処置を講ずること。
- ・水痘又は麻疹の既往や予防接種を受けたことがある患者であっても、本剤投与中は、水痘又は麻疹を発症する可能性があるので留意すること。
- ・投与中は副作用の出現に対し、常に十分な配慮と観察を行い、また、患者をストレスから避けるようにし、事故、手術等の場合には增量するなど適切な処置を行うこと。
- ・連用後、投与を急に中止すると、ときに発熱、頭痛、食欲不振、脱力感、筋肉痛、関節痛、ショック等の離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。離脱症状があらわれた場合には、直ちに再投与又は增量すること。

8.3 連用により眼圧亢進、緑内障、後嚢白内障を来すことがあるので、定期的に検査をすることが望ましい。[9.1.1、11.1.6 参照]

8.4 褐色細胞腫の合併を認識していないかった状態でベタメタゾン製剤（注射剤）を投与した際に褐色細胞腫クリーゼを発現したとの報告がある。本剤投与後に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等が認められた場合は、褐色細胞腫クリーゼの発現を考慮した上で適切な処置を行うこと。[9.1.10 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 以下の患者には治療上やむを得ないと判断される場合を除き投与しないこと。

- (1) **開放隅角緑内障の患者**
眼圧の亢進により、緑内障が増悪することがある。[8.3、11.1.6 参照]
- (2) **有効な抗菌剤の存在しない感染症、全身の真菌症の患者**
免疫機能抑制作用により、感染症が増悪することがある。[11.1.1、15.1.2 参照]
- (3) **結核性疾患の患者**
免疫機能抑制作用により、結核性疾患が増悪することがある。[11.1.1 参照]
- (4) **消化性潰瘍の患者**
胃酸分泌の亢進、肉芽組織増殖抑制作用により、潰瘍が増悪又は治癒が遅れることがある。[11.1.3 参照]
- (5) **精神病の患者**
中枢神経系に影響し、精神病が増悪することがある。[11.1.4 参照]
- (6) **単純疱疹性角膜炎の患者**
免疫機能抑制作用により、単純疱疹性角膜炎が増悪することがある。[11.1.1 参照]
- (7) **後嚢白内障の患者**
水晶体線維に影響し、後嚢白内障が増悪することがある。[8.3、11.1.6 参照]
- (8) **高血圧症の患者**
水及び電解質代謝作用により、高血圧症が増悪することがある。

(9) 電解質異常のある患者

電解質代謝作用により、電解質異常が増悪することがある。

(10) 血栓症の患者

血液凝固促進作用により、血栓症が増悪することがある。

[11.1.7 参照]

(11) 最近行った内臓の手術創のある患者

創傷治癒（組織修復）が障害されることがある。

(12) 急性心筋梗塞を起こした患者

副腎皮質ホルモン剤で心破裂を起こしたとの報告がある。

9.1.2 感染症の患者（有効な抗菌剤の存在しない感染症、全身の真菌症の患者を除く）

免疫機能抑制作用により、感染症が増悪するおそれがある。

[11.1.1、15.1.2 参照]

9.1.3 糖尿病の患者

糖新生促進作用（血糖値上昇）等により、糖尿病が増悪するおそれがある。

9.1.4 骨粗鬆症の患者

骨形成の抑制、骨からのカルシウム排泄の増加により、骨粗鬆症が増悪するおそれがある。[11.1.5 参照]

9.1.5 甲状腺機能低下のある患者

副腎皮質ホルモン剤の血中からの半減時間が長くなるとの報告があり、副作用があらわれるおそれがある。

9.1.6 脂肪肝の患者

脂肪分解・再分布作用により、肝臓への脂肪沈着を増大させ、脂肪肝が増悪するおそれがある。

9.1.7 脂肪塞栓症の患者

副腎皮質ホルモン剤の大量投与により、脂肪塞栓症が起こるとの報告があり、症状が増悪するおそれがある。

9.1.8 重症筋無力症の患者

蛋白異化作用により、使用当初、一時症状が増悪するおそれがある。

9.1.9 B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者

本剤の投与期間中及び投与終了後は継続して肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B型肝炎ウイルス増殖の徵候や症状の発現に注意すること。異常が認められた場合には、本剤の減量を考慮し、抗ウイルス剤を投与するなど適切な処置を行うこと。副腎皮質ホルモン剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリアの患者において、B型肝炎ウイルスの増殖による肝炎があらわれることがある。なお、投与開始前にHBs抗原陰性の患者において、B型肝炎ウイルスによる肝炎を発症した症例が報告されている。[11.1.1、15.1.2 参照]

9.1.10 褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及びその疑いのある患者

褐色細胞腫クリーゼがあらわれることがある。[8.4 参照]

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 腎不全の患者

薬物の排泄が遅延するため、体内蓄積により副作用があらわれるおそれがある。

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 肝硬変の患者

代謝酵素の活性低下等により、副作用があらわれるおそれがある。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験（マウス）で催奇形作用が報告されており、また、新生仔に副腎不全を起こすことがある。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。母乳中へ移行することがある。

9.7 小児等

9.7.1 觀察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。幼児・小児の発育抑制があらわれることがある。[11.1.9 参照]

9.7.2 長期投与した場合、頭蓋内圧亢進症状があらわれことがある。[11.1.9 参照]

9.8 高齢者

長期投与した場合、感染症の誘発、糖尿病、骨粗鬆症、高血圧症、後囊白内障、緑内障等の副作用があらわれやすい。

10. 相互作用

ペタメタゾンは、主としてCYP3A4で代謝される。

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト (男性における夜間多尿による夜間頻尿) [2.5 参照]	低ナトリウム血症 が発現するおそれ がある。	機序不明。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤、 アルコール、 MAO阻害剤、 抗コリン作用を有する薬剤	相互に作用を増強することがあるので、併用する場合は、減量するなど慎重に投与すること。 MAO阻害剤：d-クロルフェニラミンマレイン酸塩の中枢抑制作用により、作用が増強される。	中枢神経抑制剤、アルコール：d-クロルフェニラミンマレイン酸塩の中中枢抑制作用により、作用が増強される。
ドロキシドバ、 ノルアドレナリン	併用により血圧の異常上昇を来すおそれがある。	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩がヒスタミンによる毛細血管拡張を抑制する。
バルビツール酸誘導体 フェノバルビタール フェニトイン、 リファンピシン、 エフェドリン	副腎皮質ホルモンの作用が減弱することが報告されているので、併用する場合には、用量について注意すること。	バルビツール酸誘導体、フェニトイン、リファンピシンはP-450を誘導し、副腎皮質ホルモンの代謝が促進される。
サリチル酸誘導体 アスピリン、 アスピリンダイアルミネート、 サザピリン	併用時に副腎皮質ホルモン剤を減量すると、血清中のサリチル酸濃度が上昇し、サリチル酸中毒を起こすことが報告されているので、併用する場合には、用量について注意すること。	副腎皮質ホルモン剤は、サリチル酸誘導体の腎排泄と肝代謝を促進し、血清中のサリチル酸誘導体の濃度を低下させる作用を持っているので減量するとその血中濃度が上昇する。
抗凝血剤 ワルファリンカリウム	副腎皮質ホルモン剤が、抗凝血剤の作用を減弱させることが報告されているので、併用する場合には、用量について注意すること。	副腎皮質ホルモン剤は血液凝固促進作用がある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
糖尿病用薬 ビグアナイド系 薬剤 スルホニルウレア剤 速効型インスリ ン分泌促進剤 <i>a</i> -グルコシダ ーゼ阻害剤 チアゾリジン系 薬剤 DPP-4 阻害剤 GLP-1 受容体作 動薬 SGLT2 阻害剤 インスリン製 剤等	副腎皮質ホルモン 剤が糖尿病用薬の 作用を減弱させる ことが報告されて いるので、併用する 場合には、用量につ いて注意するとと もに、血糖値その他 患者の状況を十分 観察しながら投与 すること。	副腎皮質ホルモン 剤は、肝臓での糖新 生を促進し、末梢組 織での糖利用を阻 害することによる 血糖上昇作用があ る。
利尿剤（カリウム保 持性利尿剤を除く） トリクロルメチ アジド、 アセタゾラミド、 フロセミド	副腎皮質ホルモン 剤との併用により 低カリウム血症が あらわれる場合が あるので、併用する 場合には、用量につ いて注意すること。 カリウム排泄型利 尿剤との併用時に は、血清カリウム濃 度と心機能のモニ タリングが推奨さ れる。	副腎皮質ホルモン 剤は、尿細管でのカ リウム排泄促進作 用がある。
ソマトロピン	併用により、ソマト ロピンの効果が減 弱することがある。	副腎皮質ホルモン 剤がソマトロピン の効果を減弱させ る。機序不明。
シクロスボリン	シクロスボリンの 血中濃度が上昇す るとの報告があ るので、併用する場 合には、用量につい て注意すること。	本剤はシクロスボ リンの代謝を阻害 する。
非脱分極性筋弛 緩剤 パンクロニウム 臭化物、 ベクロニウム臭 化物	筋弛緩作用が減弱 又は増強するとの 報告があるので、併 用する場合には、用 量について注意す ること。	機序不明。
リトドリン塩酸塩	ベタメタゾンの注 射剤との併用によ り肺水腫があらわ れたとの報告があ る。	体内の水分貯留傾 向が促進される。
エリスロマイシン	ベタメタゾンの作 用が増強されると の報告があるので、 併用する場合には 本剤の用量に注意 すること。	エリスロマイシン の CYP3A4 に対す る阻害作用により、 ベタメタゾンの代 謝が抑制される。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 誘発感染症、感染症の増悪 (0.1~5%未満)
B型肝炎ウイルスの増殖による肝炎があらわれることがある。[9.1.1、9.1.2、9.1.9、15.1.2 参照]

- 11.1.2 繰発性副腎皮質機能不全、糖尿病 (頻度不明)、急性副腎不全 (0.1~5%未満)
- 11.1.3 消化性潰瘍 (0.1~5%未満)、膵炎 (頻度不明)
胃潰瘍等の消化性潰瘍があらわれることがある。[9.1.1 参照]
- 11.1.4 精神変調 (0.1~5%未満)、うつ状態、痙攣、錯乱 (頻度不明)
[9.1.1 参照]
- 11.1.5 骨粗鬆症、ミオパシー (0.1~5%未満)、大腿骨及び上腕骨等の骨頭無菌性壊死 (頻度不明)
[9.1.4 参照]
- 11.1.6 緑内障、後囊白内障 (頻度不明)
[8.3、9.1.1 参照]
- 11.1.7 血栓症 (0.1%未満)
[9.1.1 参照]
- 11.1.8 再生不良性貧血、無顆粒球症^{1),2)} (0.1%未満)
- 11.1.9 幼児・小児の発育抑制 (頻度不明)
[9.7.1、9.7.2 参照]

11.2 その他の副作用

	5%以上又は頻度不明	0.1~5%未満	0.1%未満
過敏症	発疹、光線過敏症等		
精神神経系	鎮静、神経過敏、焦燥感、多幸症、複視、頭痛、めまい、耳鳴、前庭障害、情緒不安、振戦、感覺異常、ヒステリー、神経炎、協調異常	不眠、眠気、頭重感	
消化器	口渴、胸やけ、腹部膨満感、食欲不振、便秘	腹痛、恶心・嘔吐、食欲亢進、下痢等	
泌尿器	頻尿、排尿困難、尿閉、ステロイド腎症等		
循環器	低血圧、心悸亢進、頻脈、期外収縮		
呼吸器	鼻及び気道の乾燥、気管分泌液の粘液化、喘鳴、鼻閉		
血液	溶血性貧血、白血球增多		血小板減少
肝臓	肝機能障害 (AST の上昇、ALT の上昇、ALP の上昇等)		
内分泌	月経異常、糖尿等		
筋・骨格	筋肉痛、関節痛等		
脂質・蛋白質代謝	満月様顔貌、野牛肩、窒素負平衡、脂肪肝等		
体液・電解質	浮腫、低カリウム性アルカローシス	血圧上昇等	
眼	中心性漿液性網膜絡膜症等による網膜障害、眼球突出等		

	5%以上又は頻度不明	0.1~5%未満	0.1%未満
皮膚	多毛、脱毛、ざ瘡、色素沈着、皮下溢血、紫斑、線条、瘙痒感、発汗異常、顔面紅斑、創傷治癒障害、皮膚菲薄化・脆弱化、脂肪織炎		
その他	発熱、疲労感、精子数及びその運動性の増減、胸痛	倦怠感、体重增加	

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 副腎皮質ホルモン剤を投与中の患者にワクチン（種痘等）を接種して神經障害、抗体反応の欠如が起きたとの報告がある。

15.1.2 免疫機能が抑制されている可能性のある患者に対し本剤を投与する場合は、以下の点を患者に伝えること。
[9.1.1、9.1.2、9.1.9、11.1.1 参照]

- ・水痘、麻疹等に感染する危険性があること。
- ・感染した場合は医療機関を受診すること。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度


16.1.1 生物学的同等性試験

ヒスタブロック配合錠とセレスタミン配合錠を、クロスオーバー法によりそれぞれ 2錠（ベタメタゾンとして 0.5mg、*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩として 4mg）健康成人男子に絶食単回経口投与してベタメタゾン及びクロルフェニラミンの血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された³⁾。

薬物動態パラメータ（生物学的同等性、ベタメタゾン）

	AUC _(0→24) (ng · hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ヒスタブロック配合錠	31.28 ± 5.82	3.81 ± 0.89	2.00 ± 0.43	8.41 ± 2.26
セレスタミン配合錠	30.88 ± 5.78	3.82 ± 0.84	2.33 ± 0.49	7.98 ± 1.61


(Mean ± S. D., n = 12)



血漿中ベタメタゾン濃度（生物学的同等性）

	AUC _(0→24) (ng · hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ヒスタブロック配合錠	130.24 ± 25.23	11.53 ± 2.40	2.33 ± 0.49	9.80 ± 2.89
セレスタミン配合錠	126.51 ± 23.78	11.65 ± 2.90	2.25 ± 0.45	10.10 ± 2.19

(Mean ± S. D., n = 12)



血漿中クロルフェニラミン濃度（生物学的同等性）

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

18.1.1 ベタメタゾン

合成副腎皮質ホルモンで、天然の糖質コルチコイドと同じ機序により抗炎症作用を発現するが、天然のものに比べて鉱質コルチコイド作用は減弱されている⁴⁾。

18.1.2 *d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩

クロルフェニラミンの H₁受容体遮断作用の殆どは *d* 体によるので、*dl* 体に比して約 2 倍の効力を有する⁵⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名

ベタメタゾン (Betamethasone)

化学名

9-Fluoro-11 β ,17,21-trihydroxy-16 β -methylpregna-1,4-diene-3,20-dione

分子式

C₂₂H₂₉FO₅

分子量

392.46


性状

白色～微黄白色の結晶性の粉末である。
メタノール、エタノール (95) 又はアセトンにやや溶けにくく、水にほとんど溶けない。

融点：約 240°C (分解)。

結晶多形が認められる。

構造式



一般名

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 (*d*-Chlorpheniramine Maleate)

化学名

(3S)-3-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropylamine monomaleate

分子式

C₁₆H₁₉ClN₂ · C₄H₄O₄


分子量

390.86

性 状

白色の結晶性の粉末である。
水、メタノール又は酢酸(100)に極めて溶けやすく、*N,N*-ジメチルホルムアミド又はエタノール(99.5)に溶けやすい。
希塗酸に溶ける。

構造式



融 点

111~115°C

20. 取扱い上の注意

アルミピロー開封後、光を避けて保存すること。

22. 包装

100錠 [10錠(PTP)×10]
1,000錠 [10錠(PTP)×100]

23. 主要文献

- 1) Deringer, P. M., et al. : Lancet. 1976 ; I : 432
- 2) Kanoh, T., et al. : Lancet. 1977 ; I : 546-547
- 3) 社内資料：生物学的同等性試験
- 4) 第十八改正日本薬局方解説書. 廣川書店. 2021 ; C-5181
- 5) 第十八改正日本薬局方解説書. 廣川書店. 2021 ; C-1846

24. 文献請求先及び問い合わせ先

共和薬品工業株式会社 お問い合わせ窓口
〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4
 0120-041-189
FAX 06-6121-2858

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

共和薬品工業株式会社
大 阪 市 北 区 中 之 島 3 - 2 - 4