

貯 法：室温保存
有効期間：3年

カルニチン欠乏症治療剤

レボカルニチン錠

レボカルニチンFF錠100mg「アメル」

レボカルニチンFF錠250mg「アメル」

Levocarnitine FF Tablets [AMEL]

処方箋医薬品

注意-医師等の処方箋により使用すること

	錠100mg	錠250mg
承認番号	30400AMX00321	30400AMX00322
販売開始	2023年12月	2023年12月

2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	レボカルニチン FF 錠 100mg「アメル」	レボカルニチン FF 錠 250mg「アメル」
有効成分	1錠中、レボカルニチン100mgを含有する。	1錠中、レボカルニチン250mgを含有する。
添加剤	軽質無水ケイ酸、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ	軽質無水ケイ酸、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ

3.2 製剤の性状

販売名	剤形・色	外形・大きさ等	識別コード
レボカルニチン FF 錠 100mg「アメル」	フィルム コーティ ング錠		100 レボ カルニチ ン FF ア メル
	白色	直径：約 7.2mm 厚さ：約 3.2mm 質量：約 128.6mg	
レボカルニチン FF 錠 250mg「アメル」	フィルム コーティ ング錠		250 レボ カルニチ ン FF ア メル
	白色	直径：約 10.3mm 厚さ：約 4.1mm 質量：約 317.0mg	

4. 効能又は効果

カルニチン欠乏症

5. 効能又は効果に関連する注意

- 5.1 本剤は、臨床症状・検査所見からカルニチン欠乏症と診断された場合あるいはカルニチン欠乏症が発症する可能性が極めて高い状態である場合にのみ投与すること。
- 5.2 本剤の投与に際しては、原則として、カルニチンの欠乏状態の検査に加え、カルニチン欠乏の原因となる原疾患を特定すること。

6. 用法及び用量

通常、成人には、レボカルニチンとして、1日1.5~3gを3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。

通常、小児には、レボカルニチンとして、1日体重1kgあたり25~100mgを3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。

7. 用法及び用量に関連する注意

7.1 本剤の投与に際しては、低用量から投与を開始し、臨床症状の改善の程度と副作用の発現の程度及び定期的な臨床検査、バイタルサイン、カルニチンの欠乏状態等から投与量を総合的に判断すること。また、増量する場合には慎重に判断し、漫然と投与を継続しないこと。[8. 参照]

7.2 血液透析患者への本剤の投与に際しては、高用量を長期間投与することは避けること。また、血液透析日には透析終了後に投与すること。[9.2.2 参照]

7.3 小児への投与に際しては、原則として、成人用量を超えないことが望ましい。

8. 重要な基本的注意

本剤投与中は、定期的にバイタルサイン、臨床検査（血液検査、肝・腎機能検査、尿検査）、カルニチンの欠乏状態のモニタリングを行うことが望ましい。[7.1 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者又は透析下の末期腎疾患患者

低用量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与し、漫然と投与を継続しないこと。本剤の高用量の長期投与により、トリメチルアミン等の有害な代謝物が蓄積するおそれがある。重篤な腎機能障害のある患者を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.2.2 血液透析患者

本剤投与により期待する効果が得られない場合には、漫然と投与を継続しないこと。[7.2 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。レボカルニチン塩化物を投与した動物実験（ラット）で胎児への移行が報告されている¹⁾。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。レボカルニチン塩化物を投与した動物実験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている¹⁾。

9.8 高齢者

患者の状態を観察し、減量するなど十分に注意しながら本剤を投与すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
糖尿病用薬 経口糖尿病治療薬 インスリン製剤等	低血糖症状があらわれるおそれがある。	機序は不明である。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	1%未満 ^{注)}	頻度不明
消化器	食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満感	悪心・嘔吐、腹痛
過敏症		発疹、そう痒感
その他	顔面浮腫、血尿、貧血	体臭

注) エルカルチン錠 (レボカルニチン塩化物錠) の使用成績調査における発現頻度

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 服用直前にPTPシートから錠剤を取り出すこと。[20. 参照]

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 生物学的同等性試験

レボカルニチンFF錠250mg「アメル」とエルカルチンFF錠250mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ4錠 (レボカルニチンとして1000mg) 健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中遊離カルニチン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、C_{max}) について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

なお、血漿中遊離カルニチン濃度及び薬物動態パラメータ算出には、投与前の血漿中濃度 (内因性遊離カルニチン濃度) を差し引いた値を用いた²⁾。

表 16-1 薬物動態パラメータ (生物学的同等性)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC (0→36) ($\mu\text{mol}\cdot\text{hr}/\text{L}$)	C _{max} ($\mu\text{mol}/\text{L}$)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
レボカルニチン FF錠250mg 「アメル」	409.90±118.25	28.10±8.47	5.0±1.3	18.40±13.63
エルカルチン FF錠250mg	394.63±101.59	27.51±6.93	4.7±1.2	16.95±11.17

(Mean±S.D., n = 40)




図 16-1 血漿中遊離カルニチン濃度 (生物学的同等性)

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.5 排泄

16.5.1 尿中排泄率

健康成人に、レボカルニチン内用液 30、60 及び 90mg/kg を空腹時単回経口投与した時の 24 時間までのベースラインで補正した遊離カルニチンの累積尿中排泄率 (fe_{24h}) は、それぞれ 6.92%、5.92% 及び 5.59% と用量の増加に伴い低下した³⁾。

16.5.2 トランスポーター

レボカルニチンは、有機カチオン/カルニチントランスポーター (OCTN2) の基質である⁴⁾。

16.8 その他

レボカルニチン FF 錠 100mg 「アメル」について、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン (平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号)」に基づき、レボカルニチン FF 錠 250mg 「アメル」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判断され、生物学的に同等とみなされた⁵⁾。

17. 臨床成績

17.3 その他

17.3.1 一次性カルニチン欠乏症

一次性 (全身性) カルニチン欠乏症患者 1 例にレボカルニチン 1 回 1g1 日 3 回経口投与したところ、筋萎縮の減少、筋力の改善が認められた⁶⁾ (公表論文の成績、外国人データ)。

17.3.2 先天代謝異常症に伴う二次性カルニチン欠乏症

(1) カルニチンアシルカルニチントランスロカーゼ (CACT) 欠損症患児 1 例にレボカルニチン 200mg を 1 日 2 回 (30mg/kg/日) 経口投与したところ、低血糖症や重度のアンモニア血症等の症状は発現せず、正常な発育がみられた^{7),8)} (公表論文の成績、外国人データ)。

(2) プロピオン酸血症患児 2 例にレボカルニチン 25mg/kg/日、メチルマロン酸血症患児 1 例にレボカルニチン 100mg/kg/日を単回経口投与したところ、血漿中遊離カルニチン、短鎖・長鎖アシルカルニチン濃度が上昇した。また尿中遊離カルニチン及びアシルカルニチン濃度が上昇した⁹⁾ (公表論文の成績、外国人データ)。

(3) イソ吉草酸血症患児 1 例にレボカルニチン 60~100mg/kg/日を投与したところ、血漿中総カルニチン、遊離カルニチンはほぼ基準値まで上昇し、治療期間中持続した。投与開始後 30 ヶ月時には運動発達もほぼ正常となり、成長及び発達は正常な状態に回復した¹⁰⁾ (公表論文の成績、外国人データ)。

17.3.3 透析患者での二次性カルニチン欠乏症

透析患者での二次性カルニチン欠乏症患者 6 例において、レボカルニチン 2g/日 経口投与により、筋力の回復、筋痛、筋痙攣等の臨床症状の改善が認められた¹¹⁾ (公表論文の成績、外国人データ)。

17.3.4 薬剤性の二次性カルニチン欠乏症

バルプロ酸投与による二次性カルニチン欠乏症患者 11 例において、レボカルニチン 50mg/kg/日 経口投与により、高蛋白摂取時の血漿中アンモニア濃度の上昇抑制が認められた¹²⁾ (公表論文の成績、外国人データ)。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

レボカルニチンの投与により組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態を是正し、組織内で過剰に蓄積した有害なプロピオンル基をプロピオンルカルニチンとして体外 (尿中) へ排泄させる。また、有害なプロピオンル基からミトコンドリア機能を保護し、その代謝を賦活する¹³⁾。

18.2 ミトコンドリア呼吸能に対する作用

ラット肝ミトコンドリアを用いて、レボカルニチン塩化物 (L 体) を光学異性体である D-カルニチン塩化物及び DL-カルニチン塩化物と比較検討した。その結果、L 体はミトコンドリア呼吸活性への抑制作用を示さず、プロピオン酸によるミトコンドリア呼吸能の抑制作用に対して有意な回復作用を示した¹³⁾ (in vitro)。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名

レボカルニチン (Levocarnitine)

化学名

(R)-3-Hydroxy-4-trimethylammoniobutanoate

分子式

C₇H₁₅NO₃

分子量

161.20


性状

白色の結晶又は結晶性の粉末である。

水に極めて溶けやすく、メタノール又は酢酸 (100) に溶けやすく、エタノール (99.5) にやや溶けやすい。

吸湿性である。

構造式



20. 取扱い上の注意

吸湿性を有するため、PTP シートのまま保存すること。

[14.1.2 参照]

22. 包装

〈レボカルニチン FF 錠 100mg 「アメル」〉

100 錠[10 錠 (PTP) × 10]

〈レボカルニチン FF 錠 250mg 「アメル」〉

100 錠[10 錠 (PTP) × 10]

23. 主要文献

- 1) 羽鳥泰彦, 他: 医薬品研究. 1988; 19 (2): 324-340
- 2) 社内資料: 生物学的同等性試験 [錠 250mg]
- 3) 単回経口投与試験 (エルカルチン FF 内用液: 2012 年 12 月 25 日承認、申請資料概要 2.7.6.1)
- 4) 崔吉道: ビタミン. 2010; 84 (12): 604-609
- 5) 社内資料: 生物学的同等性試験 (溶出挙動比較)
- 6) Levitan, M. D. et al.: Can J Neurol Sci. 1987; 14 (1): 50-54
- 7) Pierre, G. et al.: J Inherit Metab Dis. 2007; 30 (5): 815
- 8) 先天代謝異常症に伴う二次性カルニチン欠乏症-CACT 欠損症- (エルカルチン FF 内用液: 2012 年 12 月 25 日承認、申請資料概要 2.7.3.2)
- 9) Chalmers, R. A. et al.: Pediatr Res. 1984; 18 (12): 1325-1328
- 10) Mayatepek, E. et al.: Pediatr Neurol. 1991; 7 (2): 137-140
- 11) Giovenali, P. et al.: Kidney Int. 1994; 46 (6): 1616-1619
- 12) Gidal, B. E. et al.: Pediatr Neurol. 1997; 16 (4): 301-305
- 13) 藤澤茂樹, 他: 日薬理誌. 1989; 93 (5): 305-313

24. 文献請求先及び問い合わせ先

共和薬品工業株式会社 お問い合わせ窓口

〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4

☎ 0120-041-189

FAX 06-6121-2858

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

共和薬品工業株式会社

大阪市北区中之島 3-2-4