

日本薬局方 注射用イダルビシン塩酸塩
イダマイシン[®] 静注用5mg

Idamycin[®] for Intravenous Use 5mg

貯法：室温保存
使用期限：最終年月を外箱等に記載

注)注意－医師等の処方箋により使用すること

承認番号	22000AMX02057
薬価収載	2008年12月
販売開始	2009年1月
国際誕生	1989年11月

【警告】

1. 本剤の投与は、緊急時に十分対応できる医療施設において白血病の治療に十分な知識と経験を持つ医師のもとで行うこと。
2. 本剤の使用にあたっては、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与を開始すること。
3. 本剤は強い骨髄抑制作用を有する薬剤であり、本剤に関連したと考えられる死亡例が認められている。

本剤を投与したすべての患者に強い骨髄抑制が起こり、その結果致命的な感染症（敗血症、肺炎等）及び出血（脳出血、消化管出血等）等を引き起こすことがあるので、下記につき十分注意すること。

- (1)本剤の投与後に認められる骨髄抑制は重篤かつ長期に持続することもあるので、感染予防や致命的な出血の予防に十分な対策を講じること。
 - (2)重篤な感染症を合併している患者には投与しないこと。
 - (3)本剤投与時に前治療又は他の薬剤による骨髄抑制を起こしている患者では、治療上の有益性が危険性を上回ると判断されるとき以外は投与しないこと。
 - (4)投与開始後は、頻回に血液検査を行うなど患者の状態を注意深く観察し、重篤な感染症又は出血等を引き起こした場合は投与を中止し、必要な処置を行うこと。
4. 本剤は心筋障害作用を有するため、慎重に患者を選択し、本剤の投与が適切と判断される症例にのみ投与し、下記の患者には投与しないこと。
 - (1)心機能異常又はその既往歴のある患者
 - (2)他のアントラサイクリン系薬剤等、心毒性を有する薬剤による前治療が限界量（塩酸ダウノルビシンでは総投与量が25 mg/kg、塩酸エビルピシンでは総投与量がアントラサイクリン系薬剤未治療例で900 mg/m²等）に達している患者
 5. 本剤に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと。
なお、本剤の使用にあたっては、添付文書を熟読のこと。

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 心機能異常又はその既往歴のある患者 [心筋障害があらわれることがある。]
2. 本剤に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者
3. 重篤な感染症を合併している患者 [感染症が増悪し致命的となることがある。]
4. 他のアントラサイクリン系薬剤等、心毒性を有する薬剤による前治療が限界量（塩酸ダウノルビシンでは総投与量が体重当たり25 mg/kg、塩酸エビルピシンでは総投与量がアントラサイクリン系薬剤未治療例で体表面積当たり900 mg/m²等）に達している患者 [心筋障害が増強されるおそれがある。]
5. 重篤な肝障害のある患者 [本剤の血中からの消失が遅延するとの報告がある。]
6. 重篤な腎障害のある患者 [本剤の血中からの消失が遅延するとの報告がある。]

【組成・性状】

1. 組成

1 バイアル中：

成分	販売名	
	イダマイシン静注用5mg	
有効成分	日局 イダルビシン塩酸塩	5mg（力価）
添加物	乳糖水和物 52.5mg	

2. 性状

本剤は黄赤色の塊で用時溶解して用いる注射剤である。1 バイアルを5 mLの日局注射用水で溶解した注射液は黄赤色澄明で、pH及び浸透圧比は次のとおりである。

pH	5.0～7.0
浸透圧比	約0.1（生理食塩液対比）

【効能・効果】

急性骨髄性白血病（慢性骨髄性白血病の急性転化を含む）

【用法・用量】

1 バイアル5 mg（力価）に5 mLの日局注射用水を加え溶解する。通常、成人にはイダルビシン塩酸塩として12 mg（力価）/m²（体表面積）を1日1回、3日間連日静脈内投与する。骨髄機能が回復するまで休業し、投与を繰り返す。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1)骨髄抑制のある患者 [「警告」の項参照]
- (2)感染症を合併している患者 [感染症をコントロールしてから投与すること。（「警告」の項参照）]
- (3)肝障害のある患者 [本剤の血中からの消失が遅延するとの報告がある。]
- (4)腎障害のある患者 [本剤の血中からの消失が遅延するとの報告がある。]
- (5)高齢者 [「高齢者への投与」の項参照]
- (6)水痘患者 [致命的な全身障害があらわれることがある。]
- (7)他のアントラサイクリン系薬剤等心毒性を有する薬剤による前治療歴のある患者 [「警告」、「重要な基本的注意」ならびに「相互作用」の項参照]
- (8)小児等 [「小児等への投与」の項参照]

2. 重要な基本的注意

- (1)本剤の強い**骨髄抑制**により、白血球数及び免疫能が低下し、易感染状態になるので、感染予防として**無菌状態に近い状況下（無菌室、簡易無菌室等）**で治療を行うなど十分な対策を講じること。
- (2)**感染症**が発現又は増悪し、致命的となることがあるので、重篤な感染症を合併している患者には投与しないこと。また、本剤投与時に前治療又は他の薬剤による骨髄抑制を起こしている患者では、治療上の有益性が危険性を上回ると判断されるとき以外は投与しないこと。

- (3)出血傾向が発現又は増悪し、致命的となることがあるので、本剤投与時に前治療又は他の薬剤による骨髄抑制を起こしている患者では、治療上の有益性が危険性を上回ると判断されるとき以外は投与しないこと。
- (4)投与開始後は、頻回に血液検査を行うなど患者の状態を注意深く観察し、重篤な感染症（敗血症、肺炎等）又は出血（脳出血、消化管出血等）等を引き起こした場合は、投与を中止すること。また、必要に応じて抗菌剤の投与又は血小板輸血等適切な処置を行うこと。
- (5)本剤の投与の継続に際しては、末梢血液及び骨髄の検査を行うなど患者の状態を十分観察し、効果と副作用を評価し、減量、休薬、中止等適切な対応をとること。使用が長期間にわたると骨髄抑制が強くあらわれ、遷延性に推移することがあるので投与は慎重に行うこと。
- (6)国内の臨床試験において口内炎が134例中57例に発現し、高度な（grade3,4）口内炎の発現は11例にみられ、16日間持続した例が認められた。治療中、白血球数及び免疫能低下のため高度な口内炎が長期にわたることがあるので、口腔内殺菌液等による頻回の含嗽により口腔内を清潔に保ち、口内炎の発現及び悪化を防御すること。高度な口内炎により食事摂取が困難な場合は栄養輸液投与等の適切な措置を行うこと。
- (7)心筋障害等の重篤な副作用が起こることがあるので、適宜臨床検査（心機能検査、肝機能・腎機能検査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には、効果と副作用を評価し、減量、休薬、中止等の適切な処置を行うこと。また、使用が長期間にわたると副作用が強くあらわれ、遷延性に推移することがあるので、投与は慎重に行うこと。
- (8)アントラサイクリン系薬剤では一般に蓄積性の心毒性が発現するので、総投与量に注意して投与すること。ただし、これまでの臨床試験において、本剤の総投与量と心毒性発現の間に一定の傾向が認められていないため、本剤の投与限界量を明確に規定することはできない。なお、外国添付文書では以下のように記載されている。
- 平均累積量93 mg/m²を投与した患者では、心機能に有意な変化は示されなかった。〔イギリス〕
- 本剤の総投与量は、120 mg/m²を超えてはならない。（他のアントラサイクリン系薬剤による前治療のある場合は、それまでのダウノルビシン、又はドキシソルビシンの用量の1/4が加算される）〔ドイツ〕
- また、他のアントラサイクリン系薬剤等心毒性を有する薬剤による前治療のある患者、心臓部あるいは縦隔に放射線療法を受けた患者では、特に注意すること。
- (9)本剤と他の抗悪性腫瘍剤を併用した患者に、二次性白血病、骨髄異形成症候群（MDS）が発生することがあるので注意すること。
- (10)本剤の投与により免疫機能が低下している患者に、生ワクチン又は弱毒生ワクチンを接種すると、ワクチン由来の感染を増強又は持続させるおそれがあるので、本剤投与中にこれらのワクチンを接種しないこと。
- (11)小児における投与量、安全性は確立されていないので、小児に投与する場合には副作用の発現に特に注意し、慎重に投与すること。
- (12)小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮すること。

3.相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
潜在的に心毒性を有する抗悪性腫瘍剤 アントラサイクリン系薬剤等	これらの薬剤が過去に投与されている場合、あるいは併用療法を行う場合は、心筋障害が増強されるおそれがあるので、患者の状態を観察しながら、減量するなど用量に注意すること。	心筋に対する蓄積毒性が増強される。
心臓部あるいは縦隔への放射線照射	心筋障害が増強されるおそれがあるので、患者の状態を観察しながら、減量するなど用量に注意すること。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗悪性腫瘍剤 放射線照射	骨髄低形成の遷延及び副作用が増強するおそれがあるので、併用療法を行う場合には、患者の状態を観察しながら、減量するなど用量に注意すること。	ともに骨髄抑制作用を有する。

4.副作用

調査症例数1,417例中、副作用発現症例は1,311例（92.5%）であり、副作用発現件数は延べ9,557件であった。その主なものは、顆粒球減少948件（66.9%）、血小板減少942件（66.5%）、白血球減少症936件（66.1%）等の骨髄抑制、感染866件（61.1%）、悪心・嘔吐596件（42.1%）、食欲不振591件（41.7%）、下痢324件（22.9%）、口内炎318件（22.4%）等の消化器症状、発熱692件（48.8%）及び脱毛478件（33.7%）等であった。（承認時までの調査及び市販後の使用成績調査の集計）

(1)重大な副作用

- 心筋障害（3.88%）**：心筋障害、更に心不全等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、休薬又は投与を中止すること。特に他のアントラサイクリン系薬剤等心毒性を有する薬剤による前治療のある症例に投与する場合には十分注意すること。
- 骨髄抑制（頻度不明）**：汎血球減少（52.8%）、血小板減少（66.5%）、顆粒球減少（66.9%）、貧血（63.5%）、出血傾向（24.6%）があらわれるので、頻回に末梢血液の検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。なお、高度な骨髄抑制の持続により、重篤な感染症（敗血症、肺炎等）や出血（脳出血、消化管出血等）等を併発し、死亡した例が報告されている。〔「警告」の項参照〕
- 口内炎（22.4%）**：重篤な口内炎が発現することがある。〔「重要な基本的注意」の項参照〕
- ショック（1.41%）**：ショックがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 完全房室ブロック等の不整脈（2.40%）**：完全房室ブロック等の不整脈があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	20%以上	1～20%未満	1%未満	頻度不明
心臓		頻脈、心電図異常	心膜炎	
消化器	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢		腹部不快感、腹痛、口腔内の疼痛、食道炎、胃炎	腸炎、消化管潰瘍、消化管出血
過敏症		紅斑、発疹		そう痒、蕁麻疹
皮膚	脱毛			色素沈着、放射線照射リコール反応
肝臓 ^注		肝障害（AST（GOT）・ALT（GPT）上昇、総ビリルビン上昇、Al-P上昇等）		
腎臓		腎障害（BUN上昇、クレアチニン上昇等）		
精神神経系		頭痛		
注射部位		血管痛	静脈炎	血栓
その他	発熱	疼痛、胸部圧迫感	全身の筋肉痛	脱水、ほてり

注：観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

5.高齢者への投与

高齢者では、用量に留意して患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。〔本剤は主として肝臓で代謝され、一部は腎臓から排泄されるが、高齢者では肝・腎機能が低下していることが多いため、高い血中濃度が持続するおそれがある。また、一般に高齢者では生理機能の低下に伴い、心毒性、骨髄抑制があらわれやすい。〕

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔動物実験で催奇形性（ラット：腰肋、頸肋、椎骨弓の癒合・形成不全・欠損）、胎児毒性（体重増加抑制、初期死亡胎児数の増加等）が報告されている。〕

(2) 授乳婦

授乳婦に投与する場合は授乳を中止させること。〔動物実験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている。〕

7. 小児等への投与

(1) 低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していないので、小児等に投与する場合には副作用の発現に特に注意し、慎重に投与すること。なお、使用成績調査（調査症例数1,283例）において、小児（15歳未満）での副作用発現率は100.0%（9/9例）であった。

(2) 乳幼児及び小児では、アントラサイクリン系薬剤による心毒性を起しやすいため、本剤投与後も定期的に心機能検査を実施することが望ましい。

8. 過量投与

本剤を3日間で135 mg/m²を投与した1例と3日間で本剤を45 mg/m²と塩酸ダウノルビシン90 mg/m²を投与した1例に死亡が報告されている。過量投与に関する心毒性の影響については詳細には判明していないが、上記2例の過量投与例のうち1例に重篤な不整脈が出現していることより急性心毒性及び高い発生率の遅延性心不全の発現が予想される。また、本剤の過量投与により重篤かつ長期間の骨髄抑制、及び重篤な消化器毒性の発現が考えられる。

9. 適用上の注意

(1) 投与経路

静脈内投与にのみ使用すること。

(2) 投与時

- 1) 静脈内投与により、血管痛、静脈炎、血栓を起こすことがあるので、注射部位、注射方法等について十分注意し、注射速度をできるだけ遅くすること。（5～10分）また、同一部位への反復投与によって血管の硬化が起こることがある。
- 2) 静脈内投与に際し、薬液が血管外に漏れると、注射部位に疼痛、灼熱感、炎症、腫脹、壊死を起こすことがあるので、点滴の側管を利用するなど、薬液が血管外に漏れないように十分に注意して投与すること。
- 3) 本剤には、21G又はそれより細い針を使用すること。〔太い針を使用すると、ゴム栓コアが発生する可能性が高くなり、また、同一カ所に複数回刺した場合にも、ゴム栓コアが発生する可能性が高くなる。〕

(3) 調製時

- 1) 本剤は、溶解時のpHにより安定性が低下したり、他の薬剤と混合することにより沈殿を生じることがあるので、混注を避け、日局注射用水に溶解して投与すること。

※※2) 溶解後は速やかに使用すること。調製した溶液は2～8℃で48時間、常温で24時間は化学的に安定であるが、2～8℃でも24時間以上保存しないことが望ましい。

10. その他の注意

- (1) 本剤の尿中排泄により尿が赤色になることがある。
- (2) ラットに静脈内投与した実験で、乳腺腫瘍が発生したとの報告がある。


【薬物動態】

1. 血中濃度及び排泄¹⁾

急性白血病患者21例を対象として、5、7.5、10、12.5、15 mg/m²を3日間静脈内投与したときの血中濃度、尿中排泄は以下のとおりであった。

(1) 血中濃度

未変化体（イダルビシン）は投与後速やかに減少し、24時間後にはほとんど血漿中より消失した。主代謝物であるイダルビシノールの血漿中濃度は2～4時間後には未変化体の濃度を超え、3日間投与後96時間でも血漿中に認められた。投与3日目における未変化体の消失半減期は、血漿で6.40～9.85時間、血球で8.48～16.34時間であり、イダルビシノールの消失半減期は、血漿で43.46～51.01時間、血球で36.61～54.70時間であった。



10 mg/m²を3日間静脈内投与した1症例
（急性骨髄性白血病、男性、48才、体重70.5 kg）

(2) 排泄

投与後7日までの累積尿中排泄率は、未変化体2.04%、イダルビシノール11.53%で合計13.57%であった。

2. 肝・腎機能障害を有する患者における薬物動態試験^{2,3)}

腎機能障害を有する患者（外国人）では、腎機能が正常な患者に比較して、未変化体の血漿クリアランスが有意に低下した。また、イダルビシノールの血漿中消失半減期及び平均滞留時間も有意に延長した。高度の肝機能障害を有する患者で、未変化体の血漿からの消失が遅延する例がみられた。

【臨床成績】^{4～8)}

臨床試験は急性白血病患者193例を対象として、1988年11月から1992年12月まで全国41施設で実施された。投与スケジュールは5～15 mg/m²の3日間連日投与であった。

有効率は、単剤投与で42.6%（20/47例）、他剤併用投与で83.7%（41/49例）、全体では63.5%（61/96例）であった。病型別の有効率は、急性骨髄性白血病で64.8%（57/88例）、慢性骨髄性白血病の急性転化で50.0%（4/8例）であった。

前治療のない急性骨髄性白血病を対象とした後期第Ⅱ相比較試験において、本剤の有用性が認められた。

有効率：（完全寛解例＋不完全寛解例）/評価可能例（%）

前治療のない急性骨髄性白血病患者を対象とした第Ⅲ相試験において、他剤併用投与で完全寛解率は69.9%（51/73例）であった。また、予後調査を行った結果3年生存率は46.1%（95%信頼区間32.4～59.8%）であった。

【薬効薬理】

1. 抗腫瘍作用^{9～13)}

in vivo

実験腫瘍マウス白血病（L1210、P388、グロス）に対し、抗腫瘍効果を示した。また、ダウノルビシン耐性マウスP388白血病に対してやや有効であった。主代謝物イダルビシノールもマウス白血病に抗腫瘍効果を示した。

in vitro

マウスP388白血病細胞及びヒト腫瘍細胞系であるHL60、CCRF-CEM、K562細胞等に対して、IC₅₀値と比較すると、本剤の細胞増殖抑制効果は塩酸ダウノルビシン及び塩酸ドキシソルビシンより優れていた。

2. 作用機序^{12～16)}

ダウノルビシンの4位が脱メトキシル化された構造のため、脂溶性が増し、その結果、速やかに、かつ高濃度に細胞内へ取り込まれる。DNAと結合した後、核酸ポリメラーゼ活性を阻害し、また、トポイソメラーゼⅡ阻害によりDNA鎖を切断する。

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：イダルビシン塩酸塩（Idarubicin Hydrochloride）

化学名：(2S,4S)-2-Acetyl-4-(3-amino-2,3,6-trideoxy- α -L-lyxo-hexopyranosyloxy)-2,5,12-trihydroxy-1,2,3,4-tetrahydrotricyclic-6,11-dione monohydrochloride

分子式：C₂₆H₂₇NO₉・HCl

分子量：533.95

構造式：



性状：黄赤色の粉末である。

メタノールにやや溶けにくく、水又はエタノール（95）に溶けにくく、アセトニトリル又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

本剤が眼や皮膚に付着した場合には直ちに水で洗浄し、適切な処置を行うこと。

【包装】

イダマイシン静注用 5mg：5mg（力価）×1バイアル

【主要文献】

- 1) 藤田 浩：癌と化学療法 19(6)：791, 1992 [L20030526047]
- 2) Camaggi, C. M. et al.：Cancer Chemother Pharmacol 30(4)：307, 1992 [L20030526048]
- 3) Lu, K. et al.：Cancer Chemother Pharmacol 17(2)：143, 1986 [L20030527002]
- 4) 小川一誠ほか：癌の臨床 37(13)：1497, 1991 [L20030527004]
- 5) 小川一誠ほか：癌と化学療法 20(7)：897, 1993 [L20030527006]
- 6) 小川一誠ほか：癌と化学療法 20(7)：907, 1993 [L20030527013]
- 7) 正岡 徹ほか：癌と化学療法 20(13)：1995, 1993 [L20030527010]
- 8) 社内資料：前治療のない成人急性骨髄性白血病に対する第Ⅲ相試験 [L20071016110]
- 9) Casazza, A. M. et al.：Tumori 66：549, 1980 [L20030527014]
- 10) Casazza, A. M.：Cancer Treat Rep 63(5)：835, 1979 [L20030527017]
- 11) Tsuruo, T. et al.：Anticancer Res 13(2)：357, 1993 [L20030527019]
- 12) Fukushima, T. et al.：Int J Hematol 57(2)：121, 1993 [L20030527021]
- 13) Kuffel, M. J. et al.：Cancer Chemother Pharmacol 30(1)：51, 1992 [L20030527022]
- 14) Zunino, F. et al.：Biochem Biophys Res Commun 69(3)：744, 1976 [L20030527038]
- 15) Spadari, S. et al.：Anticancer Res 6(5)：935, 1986 [L20030527061]
- 16) Supino, R. et al.：Cancer Res 37(12)：4523, 1977 [L20030527062]

【文献請求先】

「主要文献」に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

ファイザー株式会社 製品情報センター
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7
学術情報ダイヤル 0120-664-467
FAX 03-3379-3053



【製造販売】
ファイザー株式会社
東京都渋谷区代々木3-22-7