

貯 法：室温保存

有効期間：3年

X線診断二重造影用発泡剤
炭酸水素ナトリウム・酒石酸配合剤処方箋医薬品^{注)}**バロス発泡顆粒-S**
BAROS EFFERVESCENT GRANULES-S

承認番号	15000AMZ00057
販売開始	1978年7月

注)注意 - 医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 消化管の穿孔又はその疑いのある患者[消化管が膨らみ、穿孔部位を伸展させ腹痛等の症状を悪化させるおそれがある。]
- 2.2 消化管に急性出血のある患者[消化管が膨らみ、出血部位を伸展させる。]

3. 組成・性状**3.1 組成**

有効成分	1g中	日局 炭酸水素ナトリウム	460mg
		日局 酒石酸	420mg
添加剤	D-マンニトール、サッカリンナトリウム水和物、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ポビドン、モノラウリン酸ソルビタン		

3.2 製剤の性状

性 状	白色の顆粒
-----	-------

4. 効能又は効果

胃および十二指腸の透視・撮影の造影補助

6. 用法及び用量

透視開始に際して、造影剤投与開始直前あるいは投与開始後、年齢、胃内容積の個人差、造影の体位に応じて、約100～400mLの炭酸ガスの発生量に相当する量を、少量の水または、造影剤と共に経口投与する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 消化管内で発生する炭酸ガスにより、短時間に消化管内圧が上昇し、一過性の血圧低下が発症することが報告されているので、投与に際しては十分に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意**9.1 合併症・既往歴等のある患者****9.1.1 消化管に瘻孔又はその疑いのある患者**

消化管が膨らみ、瘻孔部位を伸展させる。

9.1.2 消化管の狭窄又は閉塞、あるいはそれらが疑われる患者

消化管が膨らみ、狭窄又は閉塞部位の口側を伸展させるおそれがある。

9.1.3 穿孔を生ずるおそれのある患者(胃・十二指腸潰瘍、腫瘍、憩室炎、寄生虫感染、生体組織検査後間もない患者等)

消化管が膨らみ、穿孔を生ずるおそれがある。

9.1.4 消化管に炎症や出血の疑われる患者

消化管内で発生する炭酸ガスにより短時間に消化管内圧が上昇するので、その症状を増悪させることがある。

9.1.5 全身衰弱の強い患者**9.5 妊婦**

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、診断上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。本剤投与の際にはX線照射を伴う。

9.7 小児等

診断上の有益性が危険性を上回ると判断された場合のみ投与すること。本剤投与の際にはX線照射を伴う。小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。消化管運動機能等が低下していることが多い。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻 度 不 明
消化器	腹部膨満感、おくび

14. 適用上の注意**14.1 薬剤投与時の注意**

カット面に注意して服用させること。

16. 薬物動態**16.5 排泄**胃内で発生した炭酸ガスはそのままおくびとして口腔より排泄されるか、又は消化管より吸収されて肺胞内におけるガス交換により体外に排泄される^{1),2)}。**18. 薬効薬理****18.1 測定法**本剤は胃内で炭酸ガスを発生させることにより、胃及び十二指腸内壁を十分に伸展させ、硫酸バリウム造影剤を胃及び十二指腸粘膜の微細部分に均一に付着させると共に、X線透過率の差を大きくしてコントラストを上昇させる^{3),4)}。**19. 有効成分に関する理化学的知見****19.1 炭酸水素ナトリウム**

一般名：炭酸水素ナトリウム(Sodium Bicarbonate)

化学名：Sodium hydrogen carbonate

分子式：NaHCO₃

分子量：84.01

性 状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、特異な塩味がある。水にやや溶けやすく、エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。湿った空気中で徐々に分解する。

19.2 酒石酸

一般名：酒石酸(Tartaric Acid)

化学名：(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid

分子式：C₄H₆O₆

分子量：150.09

性 状：無色の結晶又は白色の結晶性の粉末で、においはなく、強い酸味がある。水に極めて溶けやすく、エタノール(95)に溶けやすく、ジエチルエーテルに溶けにくい。水溶液(1→10)は右旋性である。

22. 包装

[ポリプロピレン容器]

3.5g×60本(乾燥剤入り)、3.5g×300本(乾燥剤入り)

4.0g×60本(乾燥剤入り)

4.5g×60本(乾燥剤入り)

5.0g×60本(乾燥剤入り)、5.0g×300本(乾燥剤入り)

[スティック包装]

5.0g×300包

23. 主要文献

- 1) McIver, M. A., et al.: Am. J. Physiol. 1926 ; 76 : 92-111
- 2) 藤原元始他監訳：グッドマン・ギルマン薬理書(廣川書店). 1992 ; 第 8 版 : 400-402
- 3) 白壁彦夫編：胃二重造影法(文光堂). 1970 ; 4-6
- 4) 市川平三郎他：胃X線診断の実際(文光堂). 1972 ; 60-82

24. 文献請求先及び問い合わせ先

堀井薬品工業株式会社 安全性情報部

〒540-0038 大阪市中央区内淡路町 1 丁目 2 番 6 号

TEL 06-6942-3487

FAX 06-6942-1505

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

堀井薬品工業株式会社

大阪市中央区内淡路町1丁目2番6号