

# M-17

ゴレイサン

漢方製剤

## マツウラ 五苓散料 エキス顆粒

貯法：室温保存。その他、  
「取扱い上の注意」の項参照  
使用期限：容器又は外箱に表示

承認番号	(62AM)第585号
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月

### 《組成・性状》

#### 1. 組成

本品4.5g中

日局タクシャ	5.0g
日局コレイ	3.0g
日局ブクリョウ	3.0g
日局ビヤクジュツ	3.0g
日局ケイヒ	2.0g

上記より製した五苓散料乾燥エキス2.4gを含有する。  
添加物としてヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有する。

#### 2. 製剤の性状

本品は淡褐色の顆粒剤で、特異なおいがある。  
識別コード(分包品)：17, マツウラ

### 《効能・効果》

のどが乾いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：  
水瀉性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ

### 《用法・用量》

通常成人1日4.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢・体重・症状により適宜増減する。

### 《使用上の注意》

#### 1. 重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

#### 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹、発赤、痒痒等
肝臓	肝機能異常(AST(GOT)、ALT(GPT)、 $\gamma$ -GTP等の上昇)

注)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

#### 3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

### 《取扱い上の注意》

- 直射日光・湿気を避けて保管すること。
- 吸湿し易いため、開封後は密栓して保管すること。
- 天然物を成分としていますので、若干色調の異なることがあります。効果には変わりありません。


### 《包装》

500g  
1.5g×84包  
1.5g×300包

### \*\*《文献請求先・製品情報お問合せ先》

松浦薬業株式会社 信頼性保証部  
〒466-0054 名古屋市昭和区円上町24-21  
TEL 052-883-5172 FAX 052-883-5159

製造販売元

\*\*  松浦薬業株式会社  
名古屋市昭和区円上町24-21