

貯法：室温保存

有効期間：3 年

承認番号 21700AMZ00370000

販売開始 2005 年 9 月

速乾性すり込み式手指消毒剤

0.2w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール溶液

消毒用グルコジンハンドリキッド 0.2%

Glucodine Hand Liquid for Disinfection

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者〔8. 参照〕

2.2 脛、膀胱、口腔等の粘膜面には使用しないこと〔クロルヘキシジン製剤の左記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。〕

2.3 損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと〔刺激作用を有する。〕

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	消毒用グルコジンハンドリキッド0.2%
有効成分	100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩液 1.0mL (クロルヘキシジングルコン酸塩として0.19～0.21w/v%)
添加剤	エタノール、アジピン酸ジイソブチル、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル(7E.O.)、アラントイン、ヒドロキシプロピルセルロース

3.2 製剤の性状

販売名	消毒用グルコジンハンドリキッド0.2%
性状	無色～微黄色澄明な粘稠性のある液で、エタノール臭がある。

4. 効能又は効果

手指の消毒

6. 用法及び用量

本剤をそのまま用いる

8. 重要な基本的注意

ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。〔2.1、9.1.1、11.1.1 参照〕

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 薬物過敏症の既往歴のある者（クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者を除く）

〔8. 参照〕

9.1.2 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック（0.1%未満）、アナフィラキシー（頻度不明）

血圧低下、じん麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。〔8.参照〕

11.2 その他の副作用

	0.1%未満	頻度不明
過敏症	発疹、じん麻疹	
皮膚		刺激症状

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用前の注意

14.1.1 血清・胆汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。

14.1.2 石鹸類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石鹸分を十分に洗い落としてから使用すること。

14.2 薬剤使用時の注意

14.2.1 手指消毒以外の目的には使用しないこと。

14.2.2 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

14.2.3 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。

14.2.4 溶液の状態では長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

14.2.5 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

14.2.6 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。

14.3 薬剤使用後の注意

本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の使用によりショック症状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある¹⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

低濃度では細菌の細胞膜に障害を与え、細胞質成分の不可逆的漏出や酵素阻害を起こし、抗菌作用（殺菌作用）を示す。高濃度では細胞内のタンパク質や核酸の沈着を起こすことにより、抗菌作用を示す²⁾。

18.2 殺菌作用

18.2.1 広範囲の微生物に作用するが、特にグラム陽性菌には低濃度でも有効である。グラム陰性菌にも比較的低濃度で殺菌作用を示すが、グラム陽性菌に比べて抗菌力に幅がある。グラム陰性菌のうち *Alcaligenes*, *Pseudomonas*, *Achromobacter*, *Flavobacterium* 属などにはまれに抵抗菌株もある。芽胞形成菌の芽胞には無効である。結核菌に対し水溶液では静菌作用、アルコール溶液では迅速な殺菌作用がある。真菌類の多くに対し抗菌力を示すが細菌類より弱い。ウイルスに対する効力は確定していない²⁾。

18.2.2 殺菌力試験

本剤は、*in vitro* の試験において、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、*Serratia marcescens*, *Burkholderia cepacia*, *Candida albicans* 等の細菌及び真菌を15秒以内に殺菌した³⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：クロルヘキシジングルコン酸塩（Chlorhexidine Gluconate）


化学名：1,1'-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)biguanide], di-D-glucuronate

分子式：C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀・2C₆H₁₂O₇

分子量：897.76

性 状：クロルヘキシジングルコン酸塩液は、無色～微黄色の澄明な液で、においはなく、味は苦い。
水又は酢酸（100）と混和する。
1mLはエタノール（99.5）5mL以下又はアセトン3mL以下と混和するが、溶媒の量を増加するとき白濁する。
光によって徐々に着色する。

化学構造式：



20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22. 包装

100mL×10 [ポリ容器]

500mL [ポリ容器；ポンプ付]

23. 主要文献

- 1) 大利隆行 他：アレルギー，1984；33（9）：707
- 2) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店 2021；C1877-C1881
- 3) ヤクハン製薬株式会社 社内資料：薬効薬理試験

24. 文献請求先及び問い合わせ先

ヤクハン製薬株式会社 学術情報グループ
〒061-1111 北海道北広島市北の里 27 番地
TEL (011) 373-1097
FAX (011) 373-1098

25. 保険給付上の注意

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準対象外）。

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



ヤクハン製薬株式会社
北海道北広島市北の里27番地