Baxter

承認番号 20900BZY00204000

機械器具 7. 内臓機能代用器 高度管理医療機器 腹膜灌流用回路及び関連用具セット 70592000

CAPDディスコネクト Yシステム

(CAPDシステム IYセット)

再使用禁止

【警告】


本品の接続部及び透析液が接する部分を汚染した場合は使用 しないこと。[腹膜炎を発症することがある。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**本品は、排液バッグ、クランプ、保護キャップ及びルアーコネク<u>ターからなり、</u>ミニキャップ接続チューブⅡ(以下、「接続チューブ」という)と当社の透析液バッグ(以下、「透析液バッグ」という)を接続し、透析液の注排液に用いる器具である。



**<u>※バクスター株式会社製の腹膜透析液 システムⅡ シングルバッ</u> グの接続口に適合する形状である。

本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ (2-エチルヘキシル))を使用している。

**本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みで(保護キャップで無菌性を保証)、回路内に発熱性物質を含有しない。

【使用目的又は効果】

慢性腎不全患者の連続携行式腹膜透析 (CAPD) の際に使用し、透析液の注排に用いる器具。

【使用方法等】

本品を使用する前に、CAPDミニキャップキットを用意する。

- **1. ミニキャップキットの外袋を開封し、マスクを取り出して着用した後、十分に手を洗う。
- 2. 本品の包装を開封し、取り出す。
- **3. 排液バッグを広げ、注液クランプ及び排液クランプを閉める。 保護キャップがついていない場合はその製品は廃棄する。
- **4. 接続チューブのクランプが閉まっていることを確認する。
- **5. <u>本品のクランプのついていない方のラインの青いルアーコネクターの保護キャップを外す。</u>
- **6. 接続チューブのミニキャップを取り外し、クランプのついていない方のラインの青いルアーコネクターに接続する。
- **7. 排液バッグを患者の腹腔より下に置く。
- 8. 接続チューブのクランプ及び本品の白い排液クランプを開き、 排液する。
- 9. 温まった透析液バッグを準備する。
- 10. 排液終了後、接続チューブのクランプ及び本品の排液クランプを閉める。
- 11. 透析液バッグのブルーチップを取り外す。
- 12. 本品の注液ルアーコネクターの保護キャップを取り外し、すぐ に透析液バッグに接続する。
- **13. 透析液バッグを患者の腹腔より上に置く。
- 14. 本品の注液クランプ及び排液クランプを開き、次いで透析液 バッグのフランジブルシールを完全に折りプライミングを開始 する。約12秒後、本品の排液クランプを閉める。
- 15. 接続チューブのクランプを開き注液する。

- 16. 注液終了後、接続チューブのクランプ及び本品の注液クランプ を閉じる。
- **17. ミニキャップの包装を開封し、取り出す。
- 18. 本品を接続チューブから取り外し、すぐに新しいミニキャップを接続チューブに取り付ける。
- 19. 使用済みの本品を廃棄する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- **1. 3リットルより大きい透析液バッグは使用しないこと。
- **使用にあたり、以下の内容で患者に指導すること。
- **2. クランプ (止め具) の開閉操作は、取扱い方法に従って確実に 行うこと。[腹腔内に空気が入るおそれがある。]

**〔組み合わせて使用する医療機器〕

「CAPD システム用接続チューブ」(承認番号20100BZY00605000)

CAPDミニキャップ接続チューブⅡ (24cm)

CAPDミニキャップ接続チューブⅡ (34cm)

【使用上の注意】

- 1. 重要な基本的注意
- **使用にあたり、以下の内容で患者に指導すること。
- **1. 透析液が接する部分が汚染された可能性のある場合や、本品の接続部から液漏れ、接続部からの抜けが発生した場合は、注排液をせず、すみやかに医療機関に連絡し、医師の指示に従うこと。[透析液の接する部分が汚染されると腹膜炎になるおそれがある。]
- 2. 本品の接続操作は、清潔な環境下で清潔操作により行うこと。
- 3. 本品に排出された排液は腹腔内に再注入しないこと。
- **4. 本品には殺菌消毒剤<u>(アルコール、過酸化水素水、アルコールを含んだ消毒剤、漂白剤等)</u>を使用しないこと。
- 5. 開封前に包装に破れ、傷、汚れがあったり、保護キャップが外れていた場合には本品を使用しないこと。
- 6. 本品に変色、ヒビ、変形、劣化及び破損があった場合は使用しないこと。
- **7. <u>汚染により腹膜炎を発症するおそれがあるため、</u>包装開封後直 ちに使用すること。再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法

室温保管

**2. 使用期限等

使用期限は包装に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者(輸入元): バクスター株式会社

*電話番号:03 (6204) 3700

製造業者:

バクスターヘルスケア社 (アメリカ合衆国)

Baxter Healthcare Corporation

Baxter はバクスターインターナショナルインクの登録商標です

製造販売元(輸入元)



9/9 0719000025

07-19-00-0025