**[警告]**

タンポンの使用により、体質・体調等によっては、
トキシックショック症候群 (Toxic Shock Syndrome : TSS)が発症する可能性があります。
症状：突然の高熱、発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血、血圧低下など
もし、上記のような症状が発生した場合、直ちにタンポンの使用を中止し取り出し、この説明書を持つて産婦人科など専門医を受診してください。その際、月経中であることを医師にお伝えください。
また、使用に際して不安がある方は、ご使用前に産婦人科などの専門医に相談してください。

- TSSの発症の可能性を軽減する為、次のことを守ってください。
- ① タンポンは連続使用せず、ナプキンと交互に使用してください。
 - ② 1回のタンポンの使用は8時間を超えないでください。
 - ③ 8時間を超えるような就寝の場合には使用しないでください。

TSSとは：黄色ブドウ球菌の產生する毒素が原因で起こる急性疾患です。黄色ブドウ球菌は鼻腔・皮膚・頭髪・脇の下・陰毛・膣などにも存在し、タンポンの使用の有無に関係なく、切り傷や火傷などによつても発症する可能性があります。ごくまれに、死に至る重篤な症状を引き起こす可能性もあります。
使用に際しては、手指が清潔でなかったり、長時間使用や、取り出し忘れなどにより、黄色ブドウ球菌が増殖し、毒素を產生しやすくなるといわれています。この文書に従つて使用することで、TSS発症の可能性を軽減することができると考えられます。

[禁忌・禁止] (してはいけないこと)

- 1) 再使用禁止。
- 2) 過去にTSSを発症した事がある人は、使用しないでください。
- 3) 分泌物（おりもの）に異臭がある人は、使用しないでください。
- 4) タンポンのヒモを切って使用しないでください。（取り出せなくなります。）
- 5) タンポンを2本同時に挿入しないでください。（取り出せなくなります。）

使用目的
膣内に挿入し経血を吸収
処理するものです。

形状・構造及び原理等
◆ 吸収体：レーヨン/ポリエチル
◆ ヒモ：綿/ポリエチル
◆ アプリケーター：ポリエチレン



操作方法又は使用方法等
正しい使い方(図解)は、裏面に記載

使用上の注意
使用上の注意は、裏面に記載

貯蔵・保管方法及び使用期間等
水濡れ、温度や湿度の高いところ、直射日光のあたるところをさけて、箱に入れて衛生的に保管してください。
また、香料、薬品、洗剤などといっしょに保管しないでください。

包装 サイズ・入数 スーパープラス：25個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売元】 ユニ・チャームプロダクツ株式会社
〒769-1602 香川県観音寺市豊浜町和田浜1496-1


【発売元】 ユニ・チャーム株式会社
〒108-8575 東京都港区三田3-5-27

【製造元】 ユニ・チャームプロダクツ株式会社

●商品に関するお問い合わせは お客様相談ダイヤル 0120-423-001 受付時間(祝日を除く) 月曜日～金曜日 9:30～17:00

操作方法又は使用方法等(正しい使い方)**1. 挿入前に**

- ① 手指を清潔に
- ② ヒモを引っ張ってヒモが切れないと、抜けないとチェック。(図1)
個包装を開けタンポンを取り出す前に、個包装の上からアプリケーターをつかみ、もう片方の手でタンポンのヒモを引っ張ってとれない事を確認しましょう。
- ③ アプリケーターの先の形をチェック。(図2)
アプリケーターの先がつぶれたり、割れたりしていないか確認してください。

**2. 挿入の仕方****3. 取り出しが**

体の外に出てるヒモの膣口に近い部分を持ち、
フワーッと息をはきながら体の力を抜いて斜め
前にゆっくり引き出してください。経血量に合
わせて4～8時間以内に使用してください。

使用上の注意

- ◆ 使用前
 - ・万一本包装が破損している場合は使用しないでください。
 - ・滅菌済製品ですが、外箱の開封後は速やかにご使用ください。
 - ・産後8週間まで又は、出産後初めての生理時は使用をおひかえください。
 - ・ヒモは切らずに体の外に必ず出して使用ください。
- ◆ 使用後
 - ・万一ヒモがとれタンポンが取り出せなくなった時は、すぐに産婦人科などでタンポンを取り出してもらってください。
 - ・生理終了後には、最後に使用したタンポンを取り出したことを必ず確認してください。
 - ・使用中のタンポンを取り出さないまま、新しいタンポンを使わないでください。



白い部分があつて取り出しがいい
時は、1ランク量の少ないタイプ
を使用しましょう！

さらに
詳しい情報は

