

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
必要な時に読めるよう大切に保存してください。

柴朴湯（小柴胡合半夏厚朴湯）処方

第2類医薬品

プロアスゲン細粒

プロアスゲン細粒は、漢方処方「柴朴湯」の有効成分を抽出したエキスの細粒です。柴朴湯は、漢方治療の理論にもとづいて、小柴胡湯に半夏厚朴湯を加えた薬方です。

柴朴湯は漢方医学では、気管支ぜんそく、小児ぜんそく、気管支炎、せき、及び不安神経症の改善などに使用される薬方です。



【使用上の注意】



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

1. 次の人は服用しないでください。

3ヶ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

(4) 高齢者。

(5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

むくみ

(7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

【成分・分量】

黄褐色の細粒で、3包（大人1日服用量：4.5g）中、次の成分を含有します。

成 分	分 量
柴朴湯（小柴胡合半夏厚朴湯）エキス 下記の混合生薬より製する。	3.5g
サイコ（柴 胡）……………	3.5g
ショウキョウ（生 姜）……………	0.5g
ハンゲ（半 夏）……………	3.0g
オウゴン（黄 芩）……………	1.5g
タイソウ（大 棗）……………	1.5g
ニンジン（人 参）……………	1.5g
カンゾウ（甘 草）……………	1.0g
コウボク（厚 朴）……………	1.5g
ソヨウ（蘇 葉）……………	1.0g
ブクリョウ（茯 苓）……………	2.5g

添加物として、結晶セルロース、無水ケイ酸、部分アルファー化デンプン、リン酸水素カルシウム、乳糖を含有します。

※本剤は、和漢薬エキスをういた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

【効能・効果】

気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：

小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症

【用法・用量】

下記の1回量を1日3回食前又は食間に服用してください。


年 齢	大 人 (15才以上)	15才未満 7才以上	7才未満 4才以上	4才未満 2才以上	2才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包以下

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合の他、服用させないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

アスゲン製薬株式会社 医薬安全情報課
名古屋市東区泉二丁目28-8 電話:0120-935-758(フリーダイヤル)
受付時間 午前9:00～午後5:00(土日、祝日を除く)