

鎮咳去痰薬

和漢薬エキス配合

# せき・たん・ぜんそく 錠A「アスゲン」<sup>®</sup>

せき・たん・ぜんそく錠A「アスゲン」は、マオウ、カンゾウなど気管支拡張、鎮咳去痰作用を有する7種類の和漢薬エキスと、ノスカピンなど洋薬成分を効果的に配合した、せき・たん・ぜんそくの薬です。

気道粘膜のアレルギー症状に伴うせき、夜間のせき込み、かぜの後のせき、たんの切れが悪い、ぜんそくなどの症状に優れた効果をあらわします。

## ⚠️【使用上の注意】

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがあります。）

4. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱、むくみ、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき

## 〔成分・分量〕

灰褐色～褐色の錠剤で、16錠（成人1日服用量：4.8g）中、次の成分を含有します。

成 分	分 量
マオウエキス	1,635 mg
カンゾウエキス	844 mg
ショウキョウエキス	188 mg
ケイヒエキス	62 mg
サイシンエキス	361 mg
ゴミシエキス	621 mg
ハンゲエキス	198 mg
マレイン酸クロルフェニラミン	8.2 mg
無水カフェイン	120 mg
ノスカピン	48 mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	240 mg

添加物として、カルボキシメチルセルロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、酸化マグネシウム、リン酸水素カルシウム、トウモロコシデンプン含有します。

※本剤は、和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

## 〔効能・効果〕

せき、たん、ぜんそく

## 〔用法・用量〕

下記の1回量を1日4回毎食後及び就寝前に服用してください。

年 齢	成 人 (15才以上)	11才以上 15才未満	8才以上 11才未満	5才以上 8才未満	5才未満
1回量	4錠	2.5錠	2錠	1錠	服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 5才以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえないよう、よく注意してください。
- (4) 錠剤の取り出し方（PTP品）  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。）



### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください（ビン入品）。
- (5) ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください（ビン入品）。
- (6) 使用期限（外箱に表示）をすぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

アスゲン製薬株式会社 医薬安全情報課  
名古屋市東区泉二丁目28-8 TEL:052-931-1212(代表)  
受付時間 午前9:00～午後5:00（土日、祝日を除く）