

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

漢方製剤

第2類医薬品

うんけいとう
温経湯エキス錠N「アスゲン」

「温経湯」は、中国の医学書である「金匱要略」を原典とする漢方薬です。

比較的体力がなく、手足がほてり、唇がかわく方の月経不順、月経困難、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷えなどに効果をあらわします。

⚠️【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸の弱い人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：月経不順、月経困難、こしけ(おりもの)、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ(手の湿疹・皮膚炎)

〔用法・用量〕

下記1回量を1日3回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	成人 (15歳以上)	15歳未満 7歳以上	7歳未満 5歳以上	5歳未満
1回量	6錠	4錠	3錠	服用しないこと

〔用法・用量に関する注意〕

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕

成人1日服用量18錠(1錠:0.35g)中に、次の成分を含有します。

温経湯乾燥エキス…………3.6g

ハ	ン	ゲ	…	2.0g	バ	ク	モ	ン	ド	ウ	…	2.0g
ト	ウ	キ	…	1.5g	セ	ン	キ	ュ	ウ	…	1.0g	
シャ	ク	ヤ	ク	…	1.0g	ニ	ン	ジ	ン	…	1.0g	
ケ	イ	ヒ	…	1.0g	ア	キ	ヨ	ウ	…	1.0g		
ボ	タ	ン	ピ	…	1.0g	カ	ン	ゾ	ウ	…	1.0g	
ゴ	シ	ュ	コ	…	0.5g	ショ	ウ	キ	ョ	ウ	…	0.5g


より抽出

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸AI、CMC-Ca、セルロース、ステアリン酸Mg、乳糖を含有します。

※本剤は、生薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります、効果には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります。)
- (4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。
- (5)本剤をぬれた手で取り扱わないでください。(水分が錠剤に付くと、変色又は色むらを生じることがあります。)
- (6)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3370-7174(代表)
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 **アスケン製薬株式会社**
名古屋市東区泉二丁目28-8