

サデカ
-ミスト-
**RICHRICH
30**
サデカミスト
リッチリッチ30

医薬品
虫よけ

サデカ
-ミスト-
**RICHRICH
30**
サデカミスト
リッチリッチ30

蚊からお肌を守る
マダニにも効く

ウォーターin
お肌にやさしい
4種のうおい成分配合
PPG・ヒアルロン酸Na・
ビタミンC・モモ葉エキス

第2類医薬品 60mL

ABCD
1234

医薬品

※必要に応じて読めるよう、この
小箱を保管しておくこと。

〔効能・効果〕蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、
イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ
(ナキンムシ)、ツツガムシの忌避
〔使用方法〕〔蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、
イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナキン
ムシ)の忌避のために使用する場合〕肌から
10~15cm離して、適量を肌の露出面に
まんべんなくスプレーする。顔、首筋には、
適量を手のひらに一度スプレーしてから
肌に塗布する。〔ツツガムシの忌避の
ために使用する場合〕肌から10~15cm
離して、適量を肌の露出面及び履物や
ズボンの裾等にはまんべんなくスプレー
する。顔、首筋には、適量を手のひらに
一度スプレーしてから肌に塗布する。

海外渡航先に



※暑やへの持ち込みについては、各航空会社へお問い合わせください。

キャンプ、ハイキングに



庭仕事に



副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

4 901080 421616

紙

皮膚アレルギーテスト済み

(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

〔有効成分〕1本(60mL)中デイト18g添加
物として、ポリプロピレングリコール(PPG)、
モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na(2)、アスコル
ビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、
香料、エタノール、精製水を含有します。

＜用法・用量に關する注意＞●定めら
れた用法・用量を厳守すること。●湿熱と
した使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸
外での使用等、必要な場合にのみ使用する
こと。●本品はデイト濃度が高いので、
12歳未満の小児には使用しないこと。小児
にはデイト濃度が12%以下の製品を使用
すること。●本品の1回使用による忌避効
果の持続時間は、概ね5~8時間である。

●本品を噴霧又は塗布した後は、経過
時間や使用時の使用者の発汗等の状況を
踏まえて、適宜、本品を再度使用すること。

●ツツガムシの忌避に關する注意事項
○薬剤だけに頼らず、シャツ、ズボン、長靴
等を使用し、肌を露出しないようにすること。
○ツツガムシは見えにくいので、生息してい
そうな場所に立ち入る前に塗布すること。

〔使用上の注意〕してはいけないこと●目や
口の周囲、粘膜や傷口など肌の弱い部分には
使用しないこと。誤ってかかった場合は、直ち
に水でよく洗うこと。〔その他の注意〕●万
一肌に異物を感したときは、直ちに使用を中止
すること。●目に入ったり、飲み込んだり、なめたり、
飲み込んだりすることがないようにし、塗
布した手で目をこすらないこと。●万一目
に入った場合には、すぐに大量の水又はぬ
るま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪
くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、
本品にデイトとエタノールが含まれてい
ることを医師に告げて、診療を受けること。
●刺激に注意するため、初めて使用する
場合は上腕の内側などに試して、異常のない
ことを確かめること。

保管及び取扱い上の注意●計量等のプラ
スチック製品は着色品とそれがあるものでない
こと。●シャツズボン等の衣類に噴霧する場合
は、合成繊維は変質しやすいので注意する
こと。●ストッキングなどの上に直接噴霧しないこと
(生地が傷む場合があります)。●直射日光や火気
を避け、子供の手の届かないところに保管すること。
●使用期限(小箱底面及びボトル底面に記載)を
過ぎた製品は使用しないこと。〔原薬の方法〕
●本品は使い切ってから捨てること。●捨て
るときは、燃えないゴミとして捨てること。

サデカミスト リッチリッチ30
(吸血害虫忌避剤)

特長

医薬品の虫よけ剤
有効成分デイトを30%配合で
効きめしっかり!

お肌にやさしい

・4種のうおい成分配合
〔PPG・ヒアルロン酸Na・ビタミンC・モモ葉エキス〕
・ウォーターin処方

コンパクトなボトル
携帯に便利なコンパクトサイズ



火気厳禁 第2類医薬品

第二石炭類 危険等級II エタノール 内容量60mL
アース化学株式会社 AWH
〒101-0048 東京都千代田区神田町 2-12-1
〔お客様窓口〕TEL 0120-81-6456
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.earth-chem.co.jp>

アース

医薬品

虫よけ

サテクト -ミスト- RICH RICH 30

サテクトミスト
リッチリッチ 30

虫よけ成分
最高濃度
※
30%
配合

※2017年2月時点で
発売中サテクトで比較

蚊からお肌を守る

マダニにも効く

ウォーターin

お肌にやさしい
4種のうるおい成分配合

PPG・ヒアルロン酸Na・
ビタミンC・モモ葉エキス

第2類医薬品

200mL

サラテクトミスト リッチリッチ30 (吸血害虫忌避剤)

●皮ふアレルギーテスト済み

(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ツツガムシの忌避
【有効成分】1本(200mL)中デト60g添加物として、ポリプロピレングリコール(PPG)、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、香料エタノール、精製水を含有します。

【使用方法】①レバーの下にある白色のストッパをOPENの位置に合わせてください。



②腕・足などには10~15cmの距離から噴霧し、顔・首筋には手のひらに噴霧してお肌

にぬってください。③使用後はストッパを元の位置に戻してください。※残りすくない場合、逆さでは噴霧できません。

【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避のために使用する場合】肌から10~15cm離して、適量を肌の露出面にまんべんなくスプレーする。顔、首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてから肌に塗布する。【ツツガムシの忌避のために使用する場合】肌から10~15cm離して、適量を肌の露出面及び履物やズボンの裾等にまんべんなくスプレーする。顔、首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてから塗布する。

<用法・用量に関連する注意> ●定められた用法・用量を厳守すること。●漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。●本品はデト濃度が高いので、12歳未満の小児には使用しないこと(小児にはデト濃度が12%以下の製品を使用すること)。●本品の1回使用による忌避効果の持続時間は、概ね5~8時間である。●本品を噴霧又は塗布した後は、経過時間や使用時の使用者の発汗等の状況を踏まえて、適宜、本品を再度使用すること。●ツツガムシの忌避に関する注意事項○薬剤だけに頼らず、シャツ、ズボン、長靴等を使用し、肌を露出しないようにすること。○ツツガムシは見えないので、生息しそうな場所に立ち入る前に塗布すること。

【使用上の注意】※してはいけないこと ●目や口の周囲、粘膜や傷口など肌の弱い部分には使用しないこと。誤ってかかった場合は、直ちに水でよく洗うこと。【その他の注意】 ●万一肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止すること。●目に入ったり、飲み込んだり、吸い込んだりすることがないように、塗布した手で目をこすらないこと。●万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にデトとエタノールが含まれていることを医師に告げて、診療を受けること。

●刺激に注意するため、初めて使用する場合は上腕の内側などに試して、異常のないことを確かめること。

【保管及び取扱上の注意】 ●換時計等のプラスチック製品は変色のおそれがあるのでかけないこと。

●シャツズボン等の衣服に噴霧する場合、繊維の種類によっては本剤により変質する場合がある。合成繊維は変質しやすいので注意すること。●ストッキングなどの上に直接噴霧しないこと(生地が傷む場合があります)。

●直射日光や火気を選び、子供の手の届かないところに保管すること。●使用期限(ボトル底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。

【廃棄の方法】 ●本品は使い切ってから捨てること。●捨てるときは、燃えないゴミとして捨てること。

副作用被害救済制度
TEL 0120-149-931

第2類医薬品

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ エタノール 内容量200mL

アース製薬株式会社 AWH

〒101-0048 東京都千代田区神田町2-12-1

(お客様窓口) TEL 0120-81-6456

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

http://www.earth-chem.co.jp

ボ
ン
ブ
ラ
ベ
ル
フ
ィ
ル
ム