

あけ口

ご使用に際しては、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう、この箱は保存しておいてください。

△使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 次の部位には使用しないでください。
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。

🗨️ 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすめ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

発売元
株式会社 明治
136-8908 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元
Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2-4-16

技術提携：ムンディファーマ B.V.

ISODINE® WASH

使い方

- ① 本剤を適量手にとり、水を少量加えてください。
- ② よく泡立てながら、手指又は皮膚をていねいに擦り洗いしてください。
- ③ そのあと、流水などで洗い流してください。

製造番号 ADWY

使用期限

D1ADWY 

meiji

イソジン®ウォッシュ

洗浄タイプ外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

250mL

meiji

手指・皮ふの
殺菌・消毒に

明治

イソジン®
ウォッシュ

洗浄タイプ外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

250mL

内服やうがいには
使用しないで
ください。



© Nippo

ISODINE® WASH

イソジン®ウォッシュ

第3類医薬品

成分・分量

1mL中ポビドンヨード 75mg(有効ヨウ素として 7.5mg)

●添加物として、pH 調整剤、その他2成分を含有します。

効能・効果 手指・皮膚の殺菌・消毒

用法・用量

本剤の適量を取り、少量の水を加えて摩擦し、よく泡立てて水洗いしてください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用だけに使用し、内服やうがいには使用しないでください。
- (4) 石けん等との併用は本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがありますので石けん分を洗い落としてから使用してください。
- (5) 定められた用法、用量を厳守してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 衣服等に付着すると着色しますので注意してください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品情報問合せ先
くすり相談室 ☎ 0120-841-704
9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



4 987222 830225