



服用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

イスクラ 瀉火利湿顆粒

(漢方製剤)

■特徴

「イスクラ瀉火利湿顆粒」は、リュウタン、オウゴンなど9種類の植物性生薬から構成され、これらの生薬から抽出したエキスを顆粒剤としたもので体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがある方の排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿の改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の人は服用しないで下さい。
生後3ヵ月未満の乳児



■ 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 高齢者
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢

(裏面につづく)

■効能・効果

体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿

■用法・用量

次の量を、いずれも1日3回、食前又は食間に服用して下さい。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

●服用に際しての注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

■成分・分量

本品1日量3包（7.5g）中、下記成分及び分量の生薬より製した瀉火利湿エキス5.7gを含有します。

トウキ	5.0g
ジオウ	5.0g
モクツウ	5.0g
オウゴン	3.0g
タクシャ	3.0g
シャゼンシ	3.0g
リュウタン	1.5g
サンシシ	1.5g
カンゾウ	1.5g

※添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

■保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) この説明書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管して下さい。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
（土、日、祝日を除く）

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2