



服用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

イ ス ク ラ し ゃ か り し つ か り ゅ う
イスクラ瀉火利湿顆粒

(漢方製剤)

■特徴

「イスクラ瀉火利湿顆粒」は、中国の医書である「セツ ショウロク シュ薛氏十六種」に収載されている竜胆瀉肝湯に基づいて製造された中成薬で、リュウタン、オウゴン、サンシシなど9種類の植物性生薬から構成されています。排尿痛、残尿感、こしけ(おりもの)などの症状に効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないで下さい。

生後3ヵ月未満の乳児



■ **相談すること**

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 高齢者
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
*肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢

※裏面もお読み下さい。

■効能・効果

体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりのもの）、頻尿

■用法・用量

次の量を、いずれも1日3回、食前又は食間に服用して下さい。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

●服用に際しての注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

■成分・分量

本品1日量3包(7.5g)中、下記成分及び分量の生薬より製した瀉火利湿エキス5.7gを含有します。

トウキ	5.0g
ジオウ	5.0g
モクツウ	5.0g
オウゴン	3.0g
タクシャ	3.0g
シャゼンシ	3.0g
リュウタン	1.5g
サンシシ	1.5g
カンゾウ	1.5g

※添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

■保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) この説明書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管して下さい。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

URL: <http://www.iskra.co.jp/>