



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

イ ス ク ラ し ゃ か り し つ か り ゅ う

# イスクラ瀉火利湿顆粒

（漢方製剤）

## ■特徴

「イスクラ瀉火利湿顆粒」は、中国の医書である「セツジンロクシュ薛氏十六種」に収載されている竜胆瀉肝湯に基づいて製造された中成薬で、リュウタン、オウゴン、サンシシなど9種類の植物性生薬から構成されています。排尿痛、残尿感、こしけ（おりもの）などの症状に効果があります。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 👤 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - （1）医師の治療を受けている人。
  - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - （4）高齢者。
  - （5）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - （6）次の症状のある人。  
むくみ
  - （7）次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。   |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※裏面もお読みください。

## ■効能・効果

体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿

## ■用法・用量

次の量を、いずれも1日3回、食前又は食間に服用してください。

| 年 齢       | 1回の服用量 | 1日の服用回数 |
|-----------|--------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1包     | 3回      |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包   |         |
| 7歳未満4歳以上  | 1/2包   |         |
| 4歳未満2歳以上  | 1/3包   |         |
| 2歳未満      | 1/4包   |         |

## ●服用に際しての注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## ■成分・分量

本品1日量3包（7.5g）中、下記成分及び分量の生薬より製した瀉火利湿エキス5.7gを含有します。

|       |      |
|-------|------|
| トウキ   | 5.0g |
| ジオウ   | 5.0g |
| モクソウ  | 5.0g |
| オウゴン  | 3.0g |
| タクシャ  | 3.0g |
| シャゼンシ | 3.0g |
| リュウタン | 1.5g |
| サンシシ  | 1.5g |
| カンゾウ  | 1.5g |

※添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2  
電 話：03-3281-3363  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで  
（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋1-14-2

URL：http://www.iskra.co.jp/