

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



止瀉薬 イツミ正露丸

第2類医薬品

「イツミ正露丸」は止瀉作用のある日本薬局方 木クレオソートを主成分とし、健胃または制酸・鎮痛・鎮痙作用のある生薬を複数配合した特異なおいのある水分を含んだ丸剤の止瀉薬(下痢止め薬)です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、便秘、下痢、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

母乳が出にくくなることがある。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回食後、湯又は水にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3 粒	3 回
8歳以上15歳未満	2 粒	
5歳以上8歳未満	1 粒	
5 歳 未 満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

9粒(大人の1日服用量)中、次の成分を含有する。

成 分	9粒中	作 用
日本薬局方木クレオソート	275mg	止瀉作用
日本薬局方ロートエキス	19.8mg	制酸作用
日本薬局方ケイヒ末	49.5mg	健胃作用
日本薬局方オウバク末	99mg	健胃作用
日本薬局方カンゾウ末	165mg	鎮痛・鎮痙作用
チンピ末	105mg	健胃作用

添加物として、炭酸水素ナトリウム、グリセリン、コムギデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。又温度差のはげしい所では容器の内側に水滴が生じることがありますが、使用には問題はありません。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

和泉薬品工業株式会社 お客様相談室
〒594-0053 大阪府和泉市芦部町181番地
電 話：0725-41-0515
受付時間：9：00～16：00(土日祝日を除く)

【副作用被害救済制度】電話：0120-149-931

製造販売元 和泉薬品工業株式会社
大阪府和泉市芦部町181番地

250901