

こどもの保健薬 こどもレバコール®

特徴

こどもレバコールは、乳幼小児の発育期、偏食期あるいは病中病後等で食欲のないこどもに必要な栄養分を配合したのみやすいバナナ風味の保健薬です。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、ビタミン含有保健薬として定めた一般的な注意事項を記載しています。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

○乳幼小児の発育期・偏食児・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの栄養補給 ○滋養強壮 ○虚弱体質

【用法・用量】

下記の量を朝夕服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
8才以上11才未満	15mL	2 回
5才以上8才未満	10mL	
3才以上5才未満	7.5mL	
1才以上3才未満	6mL	
1才未満	服用しないこと	

※添付の計量コップをご使用ください。

【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- ビンに直接口をつけて飲まないこと。

（裏面につづく）

- (4) 計量コップに注いだ薬液をビンに戻さないこと。
 (5) 開栓後、味・においに明らかな変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。

〔成分・分量〕

1日量（30mL）中

成 分	含 量	説 明
パンリバーエキス	100mg	新鮮なカツオの肝臓から有効成分を抽出して得たエキスです。
グルコン酸カルシウム水和物	400mg	水に溶けやすく、吸収の良いカルシウム剤です。
コウジンエキス(紅参エキス)	100mg (原生薬換算 417mg)	朝鮮ニンジンから有効成分を抽出したエキスです。
タウリン	500mg	滋養強壮、虚弱体質等と共に肝臓機能を改善する作用もあります。
チアミンジスルフィド硝酸化物 (ビタミンB ₁ 誘導体)	5mg	ビタミン剤で、滋養強壮、虚弱体質等に効果があります。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	25mg	

添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、カラメル、コハク酸、安息香酸Na、パラベン、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 天然物を使用していますので、製品ロットにより、多少の色、味、香り等が異なることがあります。
 (2) 気温や液温等により多少の色、味、香り等が異なる場合があります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、できるだけ速やかに服用すること。
 (5) 薬液を添付の計量コップに注いだ後は、ビンの口をよく拭いて清潔にすること。また、使用した計量コップは、その都度、水でよく洗うこと。
 (6) 水およびその他の異物が混入しないように注意すること。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)
 受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
 東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛津製薬株式会社
 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2