

ジャコウ・ゴオウ・センソ 配合



特徴

れいめいしんは、強心剤として知られているジャコウ、ゴオウ及びセンソの動物性生薬を主成分に血管拡張作用のあるジプロフィリン（ネオフィリンM）、利尿作用のあるカフェイン水和物、ビタミン等を配合した強心薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の強心薬



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）次の診断を受けた人。
てんかん、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕


強心。心臓性喘息。利尿。

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15才以上)	1～2錠	1～3回
15才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) かまずに服用すること（かむと口中にしびれ感がしばらく残ります。）。
- (3) 錠剤の取り出し方
右の図のように錠剤の入っているヒートシールの一辺を破り、取り出してください（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道につまる等思わぬ事故につながります。）。



〔成分・分量〕

1錠中

成 分	含 量	成 分	含 量
ジャコウ	1mg	ジプロフィリン(ネオフィリンM)	10mg
ゴオウ	3mg	カフェイン水和物	5mg
センソ	0.7mg	デヒドロコール酸	10mg
サフラン	2mg	チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	5mg
イノシトール(イノシット)	15mg	リボフラビン(ビタミンB ₂)	2mg
ニコチン酸	10mg	d-ボルネオール(竜腦)	5mg

添加物としてバレイショデンプン、金箔を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、リボフラビン（ビタミンB₂）を含有するためですから、ご心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛 津 製 薬 株 式 会 社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2

ジャコウ・ゴオウ・センソ配合
れいめいしん®

特徴

れいめいしんは、強心剤として知られているジャコウ、ゴオウ及びセンソの動物性生薬を主成分に血管拡張作用のあるジプロフィリン（ネオフィリンM）、利尿作用のあるカフェイン水和物、ビタミン等を配合した強心薬です。

 使用上の注意

 してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の強心薬



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）次の診断を受けた人。
てんかん、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

強心。心臓性喘息。利尿。

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15才以上)	1～2錠	1～3回
15才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) かまずに服用すること（かむと口中にしびれ感がしばらく残ります。）。

〔成分・分量〕

1錠中

成 分	含 量	成 分	含 量
ジャコウ	1mg	ジプロフィリン(ネオフィリンM)	10mg
ゴオウ	3mg	カフェイン水和物	5mg
センソ	0.7mg	デヒドロコール酸	10mg
サフラン	2mg	チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	5mg
イノシトール(イノシット)	15mg	リボフラビン(ビタミンB ₂)	2mg
ニコチン酸	10mg	d-ボルネオール(竜腦)	5mg

添加物としてバレイショデンプン、金箔を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)を含有するためですから、ご心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 品質を保持するために、服用の都度キャップをしっかりとめること。
- (2) 本剤を服用する場合、湿った手・ぬれた手で取扱わないこと。
- (3) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (4) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (5) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、品質を保持するため用法・用量を守りなるべく早く服用すること。



直射日光

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛 津 製 薬 株 式 会 社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2