


この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

# 生薬配合 後藤散

## 解熱鎮痛薬

後藤散は、きめの細かい微粉末の解熱鎮痛薬です。解熱・鎮痛・消炎に優れた効果をもつアスピリン(アセチルサリチル酸)とカフェインに、独特の芳香をもつ生薬のケイヒ末、カンゾウ末を配合しています。



**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。  
(3) 15歳未満の小児。  
(4) 出産予定日12週以内の妊婦。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用をしないでください



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の診断を受けた人。(心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(裏面につづく)

皮膚粘膜眼症候群、 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

- 効 能
1. 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
  2. 悪寒、発熱時の解熱

用法・用量 1日3回を限度とし、なるべく空腹時を避けて、服用してください。  
服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	15歳以上	15歳未満
1回量	1包	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>  
用法・用量を厳守してください。

成分と作用 1包(0.9g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
アスピリン	450mg	熱を下げ、痛みを和らげ、炎症をおさえる作用に優れています。アスピリンは非ピリン系の解熱鎮痛薬です。
無水カフェイン	50mg	解熱鎮痛の効果を高め、脳の血流を改善して早く頭痛を治します。
カンゾウ末	100mg	抗炎症などの作用があります。
ケイヒ末	100mg	発汗、解熱、鎮痛などの作用があります。

後藤散には、上記の有効成分のほかに、散剤の有用性を高める目的で、以下の成分が配合されています。

乳糖、タルク

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 品質保存のために乾燥剤を封入しています。乾燥剤は無害ですが飲まない様にご注意ください。
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。