

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

# 生薬配合 後藤散せきどめ

後藤散せきどめは、さらさら顆粒タイプのせきどめ薬です。咳を鎮める成分と、痰をやわらかくして吐き出しやすくする成分を配合し、のどをスーツとさせる爽やかな後味です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください  
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬。
- 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。(高熱、排尿困難)
  - (8) 次の診断を受けた人。(心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |
| その他   | 排尿困難       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。 |

(裏面につづく)

皮膚粘膜眼症候群  
(スティーブンス・ジョンソン症候群)  
中毒性表皮壊死症  
(ライエル症候群)

高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください（口の渇き）

効 能 せき、ぜんそく、たん

用法・用量 下記の1回量を、1日3回食後に服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

| 年 齢   | 15歳以上 | 11～14歳 | 8～10歳 | 5～7歳 | 3～4歳 | 3歳未満    |
|-------|-------|--------|-------|------|------|---------|
| 1 回 量 | 1包    | 2/3包   | 1/2包  | 1/3包 | 1/4包 | 服用しないこと |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と作用 1包(1.3g)中に次の成分を含んでいます。

| 成 分            | 分 量             | 作 用                                              |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| カンゾウ(甘草)末      | 300mg           | せきをしずめ、痰を出しやすくします。抗炎症作用があります。味は甘く、薬の服用をスムーズにします。 |
| d0-塩酸メチルエフェドリン | 25mg            | 気管支をひろげ、のどを楽にして、激しいせきをしずめます。                     |
| ノスカピン          | 20mg            | せきの中枢に作用してせきをしずめます。                              |
| 塩化リソチーム        | 20mg<br>(力価として) | のどのはれ、痛みをやわらげます。又、のどからんだ痰をやわらかくし、吐き出しやすくします。     |
| マレイン酸クロルフェニラミン | 4mg             | くしゃみなど、アレルギー性のせきに効果があります。                        |
| 無水カフェイン        | 50mg            |                                                  |

後藤散せきどめには、上記の有効成分のほかに、顆粒の有用性を高める目的で、以下の成分が配合されています。

0-メントール、精製白糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
(3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。  
(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。