

第2類医薬品

ウチダの和漢生薬 ウチダの 海人草

日本薬局方 マクリ



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の駆虫薬、ヒマシ油
- 2回以上続けて服用しないこと
なお、再度駆虫を必要とする場合は、1ヵ月以上の間隔をおくこと。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃痛、腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	頭痛、めまい
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき
- 服用しても効果がみられない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

効能・効果

回虫の駆除

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人(15歳以上)	10gを、水約100mLをもって煮て約60mLに煮つめ、滓をしばって取り去り、早朝または就寝前の空腹時に服用する。
15歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 便秘性の人は本剤服用後、虫を排泄するため、適宜瀉下薬を用いること。

成分・分量

1日量(10g)中

日本薬局方マクリ 10g

MMK



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-4-10