

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。


第 2 類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 温経湯

ウンケイトウ

ウチダの温経湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品 1 袋中

ハ ン ゲ	4.0 g	ケ イ ヒ	2.0 g
バクモンドウ	4.0 g	ゼ ラ チ ン	2.0 g
ト ウ キ	3.0 g	ボ タ ン ピ	2.0 g
セ ン キ ユ ウ	2.0 g	カ ン ゾ ウ	2.0 g
シャクヤク	2.0 g	シ ョ ウ キ ヨ ウ	1.0 g
ニ ン ジ ン	2.0 g	ゴ シ ユ ユ	1.0 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 お客様相談センター

電話 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

冷え症で手掌がほてり、口唇が乾燥しやすい次の諸症
月経不順、更年期神経症、帯下^{注)}、月経過多、月経痛、腰痛、頭痛、指掌角皮症

^{注)}「帯下^{たいげ}」とは俗にいうこしけ、子宮からの分泌物を指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加えあまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮詰め袋をとり出し 2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4