

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 解表舒筋

ゲヒョウジョキン

18

分包

ウチダの解表舒筋は、漢方処方にしたいが生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つ っぱり感やこわばりに加 えて、脱力感、筋肉痛があ らわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くな る)、褐色尿、全身のだる さ、食欲不振等があらわれ る。

3. 1 ヶ月位（感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には 5 ～ 6 回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	1 包
15 歳未満 7 歳以上	2/3 包
7 歳未満 4 歳以上	1/2 包
4 歳未満 2 歳以上	1/3 包
2 歳未満	1/4 包

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 日量〔3 包(1 包 2 g)〕中

カッコン	2.4 g
マオウ	1.8 g
タイソウ	1.8 g
ケイヒ	1.2 g
シャクヤク	1.2 g
カンゾウ	1.2 g
ショウキョウ	0.6 g

葛根湯エキス……………2.45 g

賦形剤として乳糖水和物・バレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸 Mg 結合剤としてヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 小児で 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2 日以内に服用すること。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 0 3 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4