

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 加味逍遙散

カミショウヨウサン

ウチダの加味逍遙散は漢方処方にしたがって、生薬を配合して製した散剤で、特異な芳香があります。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品 22.5 g 中			
ト ウ キ	3.0 g	カ ン ソ ウ	1.5 g
シャクヤク	3.0 g	ボ タ ン ビ	2.0 g
ビャクジュツ	3.0 g	サ ン シ シ	2.0 g
ブ ク リ ヨ ウ	3.0 g	シ ヨ ウ キ ヨ ウ	1.0 g
サ イ コ	3.0 g	ハ ッ カ	1.0 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141
受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

虚弱体質で疲労しやすく、頭痛、頭重感、のぼせ、めまい、動悸、肩こり、また脊部に寒感や蒸熱感^{注1)}や発汗があるもので、微熱、食欲不振、月経不順などを伴うもの。
更年期障害、月経不順、帯下^{注2)}

注1) 「^{しょうねつかん}蒸熱感」とは産後のちねつのある感じを指します。

注2) 「^{たいげ}帯下」とは俗にいうこしけ、子宮からの分泌物を指します。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前1時間又は食間空腹時に水又は温湯で服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15歳以上）	2.0 g
15歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

添付の匙はすり切りで、1杯が約1 gです。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる場合がありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里 4-4-10