

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 加味逍遙散料

カミショウヨウサンリョウ

ウチダの加味逍遙散料は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つ っぱり感やこわばりに加え て、脱力感、筋肉痛があら われ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くな る)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。
* 腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下 痢、便秘、腹部膨満等が繰 り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、この
ような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること
下痢
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること

効能・効果

虚弱体質で疲労しやすく、頭痛、頭重感、のぼせ、めまい、
動悸、肩こり、神経症状があるもので、微熱、食欲不振、月経
不順などを伴うもの。

更年期障害、月経不順、帯下^注、更年期神経症、不眠症。

注¹「^{ないば}帯下」とは俗にいうこしけ、子宮からの分泌物を指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火に かけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、 袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品 1 袋中

ト ウ キ	3.0g	カ ン ソ ウ	2.0g
シャクヤク	3.0g	ボ タ ン ピ	2.0g
ビャクジュツ	3.0g	サ ン シ シ	2.0g
ブ ク リ ヨ ウ	3.0g	ショウキョウ	1.0g
サ イ コ	3.0g	ハ ッ カ	1.0g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管するこ
と。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品
質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店また
は下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる
ことがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里 4-4-10