

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 乾姜人参半夏丸

カンキョウニンジンハンゲガン

ウチダの乾姜人参半夏丸は漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末化して丸剤としたものです。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
 - 1 ヶ月位（つわりに服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなる場合

* 効能・効果

体力中等度以下で、はきけ・嘔吐が続きみぞおちのつかえを感じるものの次の諸症：
つわり、胃炎、胃腸虚弱

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用する

年 齢	1 回 量
成人（15 歳以上）	13～20 丸
* 15 歳未満 7 歳以上	9～13 丸
7 歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

* 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 4.5 g（60 丸 1 日分）中
カンキョウ 1 g } 以上の割合で混合し 4.411 g
ニンジン 1 g } 粉末化したもの
ハンゲ 2 g }
丸薬の結合剤としてカルメロース Na を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8