

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 帰脾湯

キヒトウ

ウチダの帰脾湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つ っぱり感やこわばりに加 えて、脱力感、筋肉痛があ らわれ、徐々に強くなる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



使用上の注意

成分・分量

本品 1 袋中

オ	ウ	ギ	2.0 g	リ	ウ	ガ	ン	ニ	ク	3.0 g
ト	ウ	キ	2.0 g	カ	ン	ゾ	ウ			1.0 g
ニ	ン	ジ	ン	3.0 g	シ	ョ	ウ	キ	ョ	ウ
ビ	ャ	ク	ジュ	ツ	3.0 g	モ	ッ	コ	ウ	1.0 g
ブ	ク	リ	ョ	ウ	3.0 g	オ	ン	ジ		1.5 g
サ	ン	ソ	ウ	ニ	ン	3.0 g	タ	イ	ソ	ウ
										1.5 g

成分・分量に関連する注意

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがある。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 0 3 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

平素胃腸の弱い虚弱体質のものが身心過労の結果、種々の出血を起こして貧血をきたしたり、健忘、不眠、精神不安、心悸亢進などを起こしたものを。

腸出血、子宮出血、血尿などによる貧血・衰弱、健忘症、不眠症、神経性心悸亢進症、月経不順。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し 2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里 4-3-4