

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 荊芥連翹湯

ケイガイレンギョウトウ

ウチダの荊芥連翹湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、 <u>かゆみ</u>
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
<u>* 肝機能障害</u>	<u>全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。</u>

(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりません

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

青年期腺病体質^{注)}改善、急性慢性中耳炎、肥厚性鼻炎、扁桃腺炎

^{注)}「腺病体質」とは貧血などになりやすい虚弱・無力体質を指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮詰め、袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品 1 袋中

ト	ウ	キ	1.5 g	ハ	マ	ボ	ウ	フ	ウ	1.5 g
シ	ャ	ク	ヤ	ク	1.5 g	ハ	ッ	カ	1.5 g	
セ	ン	キ	ュ	ウ	1.5 g	ケ	イ	ガ	イ	1.5 g
ジ	オ	ウ	1.5 g	カ	ン	ゾ	ウ	1.5 g		
オ	ウ	レ	ン	1.5 g	キ	コ	ク	1.5 g		
オ	ウ	ゴ	ン	1.5 g	サ	イ	コ	2.0 g		
オ	ウ	バ	ク	1.5 g	ピ	ャ	ク	シ	2.0 g	
サ	ン	シ	シ	1.5 g	キ	キ	ヨ	ウ	2.0 g	
レ	ン	ギ	ョ	ウ	1.5 g					

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる場合がありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8