

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第 2 類医薬品

# ウチダの漢方製剤

## ウチダの 桂枝湯

ケイシトウ

ウチダの桂枝湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

\* 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称 | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

\* (2) 5 ～ 6 回服用しても症状がよくならない場合

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

## 効能・効果

虚弱体質でさむけ、発熱、頭痛、のぼせ、自汗、身体疼痛のあるもの。

感冒、神経痛、リュウマチ、頭痛

## 用法・用量

| 年 齢        | 1 日 量                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大人（15 歳以上） | 1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加えあまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ袋をとり出し、2 ～ 3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。 |
| 15 歳未満     | 服用しないこと                                                                                                  |

## 成分・分量

本品 1 袋中

|        |      |
|--------|------|
| ケ イ ヒ  | 4.0g |
| シャクヤク  | 4.0g |
| タイソウ   | 4.0g |
| ショウキョウ | 1.0g |
| カンゾウ   | 2.0g |

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8