

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 桂枝加竜骨牡蛎湯

ケイシカリユウコツボレイトウ

ウチダの桂枝加竜骨牡蛎湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品 1 袋中			
ケ イ ヒ	4.0 g	カ ン ソ ウ	2.0 g
シ ャ ク ヤ ク	4.0 g	リ ユ ウ コ ツ	3.0 g
タ イ ソ ウ	4.0 g	ボ レ イ	3.0 g
シ ョ ウ キ ョ ウ	1.0 g		

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 0 3 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

直腹筋が拘攣^{注1)}し、腹部の動悸が亢進し、神経過敏で疲労しやすいもので微熱、のぼせ、不眠、めまいなどを伴うもの。

神経衰弱、不眠症、夜尿症、陰萎^{注2)}

注1)「^{こうれん}拘攣」とは筋肉がひきつり痙攣することを指します。

注2)「^{いんい}陰萎」とは陰茎が勃起しないか、勃起しても硬くならずじきにたおれてしまうことを指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4