

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 柴胡加竜骨牡蛎湯 エキス散

サイコカリュウコツボレイトウ

ウチダの柴胡加竜骨牡蛎湯エキス散は、漢方処方にしたいがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすく散剤（細粒）としたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

- ＊ 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
＊ (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- (6) 次の医薬品を服用している人。
瀉下薬（下剤）

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- ＊ (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
＊ 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
＊ 間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位（小児夜なきに服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくならない場合

- ＊ 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
軟便、下痢

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前または食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	2 g
15 歳未満 7 歳以上	大人の 2/3 の量
7 歳未満 4 歳以上	大人の 1/2 の量
4 歳未満 2 歳以上	大人の 1/3 の量
2 歳未満	大人の 1/4 以下の量

用法・用量に関連する注意

- (1) 添付のサジ 1 がいが約 1 g です。

- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

- ＊ ＊ (3) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 日量（6 g）中

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス……………2.34 g

サイコ……………	2.5 g
ハンゲ……………	2.0 g
ケイヒ……………	1.5 g
ブクリョウ……………	1.5 g
オウゴン……………	1.25 g
タイソウ……………	1.25 g
ニンジン……………	1.25 g
リュウコツ……………	1.25 g
ボレイ……………	1.25 g
ダイオウ……………	0.5 g
ショウキョウ……………	0.4 g

賦形剤として乳糖・バレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

精神不安があつて、どうき、不眠などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜なき

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8