

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。


第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 柴胡桂枝乾姜湯

サイコケイシカンキョウトウ

ウチダの柴胡桂枝乾姜湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 - むくみ
 - 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりません

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症：更年期障害、血の道症^{注）}、不眠症、神経症。

^{ちのみちしょう}
注）「血の道症」とは婦人にみられる一種の神経症を指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 才以上）	本品 1 包を袋入りのまま、水約 500mL を加えて半量ぐらいまで煎じつめ、袋とともに煎じかすを除き、煎液を 3 回に分けて食前又は食間に服用する。
15 才未満 7 才以上	大人の煎液の 2/3 量を 3 回に分けて食前又は食間に服用する。
7 才未満 4 才以上	大人の煎液の 1/2 量を 3 回に分けて食前又は食間に服用する。
4 才未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1 袋（1 日分）中

サ イ コ	6 g	ボ レ イ	3 g
ケ イ ヒ	3 g	カ ン キ ヨ ウ	2 g
カ ロ コ ン	3 g	カ ン ゾ ウ	2 g
オ ウ ゴ ン	3 g		

合 計 22 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8