

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤
ウチダの 柴胡桂枝湯
サイコケイシトウ

ウチダの柴胡桂枝湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。

 **使用上の注意**

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
むくみ
(6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
* ＊ 間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位（かぜの場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなりえない場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

本品 1 袋中			
サ	イ	コ	5.0 g
ハ	ン	ゲ	4.0 g
ケ	イ	ヒ	2.5 g
オ	ウ	ゴ	2.0 g
ニ	ン	ジ	2.0 g
シ	ャ	ク	ヤ
ク	ヤ	ク	2.0 g
シ	ョ	ウ	キ
ウ	キ	ョ	1.0 g
タ	イ	ソ	ウ
タ	イ	ソ	2.0 g
カ	ン	ゾ	ウ
カ	ン	ゾ	1.5 g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

頭痛、微悪寒、微熱、関節痛があり、みずおちがつかえ、胸や脇腹に圧迫感や疼痛のあるもの、あるいは腹痛、胃痛、胸痛が激しく食欲減退などを伴うもの。
感冒、胃酸過多症

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加えあまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる場合がありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8