

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 柴胡桂枝湯

サイコケイシトウ

ウチダの柴胡桂枝湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

* (2) 1 ヶ月位（かぜの中期から後期の症状の場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

本品 1 袋中

サ イ コ	5.0 g	シャクヤク	2.0 g
ハ ン ゲ	4.0 g	ショウキョウ	1.0 g
ケ イ ヒ	2.5 g	タ イ ソ ウ	2.0 g
オ ウ ゴ ン	2.0 g	カ ン ゾ ウ	1.5 g
ニ ン ジ ン	2.0 g		

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

頭痛、微悪寒、微熱、関節痛があり、みずおちがつかえ、胸や脇腹に圧迫感や疼痛のあるもの、あるいは腹痛、胃痛、胸痛が激しく食欲減退などを伴うもの。

感冒、胃酸過多症

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加えあまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8