

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 七物降下湯

シチモツコウカトウ

ウチダの七物降下湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症

高血圧に伴う随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重）

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）に対し、水 600mL を加え、あまり強くない火にかけ、300mL に煮つめてから、袋をとりだし、2 ～ 3 回に分けて、食前 1 時間又は食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品 1 袋（1 日分）中

ト	ウ	キ	3.0 g	オ	ウ	ギ	3.0 g
セ	ン	キュウ	3.0 g	オ	ウ	バク	2.0 g
シ	ャ	クヤク	3.0 g	チ	ョウトウコウ		4.0 g
ジ	オ	ウ	3.0 g				

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里 4-4-10