

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第 2 類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

## ウチダの 四物湯

シモツトウ

ウチダの四物湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 下痢しやすい人。
  - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | 胃部不快感、食欲不振、腹痛 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 

下痢
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



## 使用上の注意

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L     0 3 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間   9 : 00 ~ 17 : 30（土、日、祝日を除く）

## 効能・効果

貧血、冷え症で皮膚が乾いてかさかさし、腹部が軟弱で臍上に動悸を認めるもの。

月経不順、更年期神経症、貧血症、乾性皮膚病。

## 用法・用量

| 年 齢        | 1 日 量                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大人（15 歳以上） | 1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2 ～ 3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。 |
| 15 歳未満     | 服用しないこと                                                                                                    |

## 成分・分量

本品 1 袋中

ト    ウ    キ    4.0 g

セ    ン    キ    ュ    ウ    4.0 g

シ    ャ    ク    ヤ    ク    4.0 g

ジ    オ    ウ    4.0 g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4