

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 十全大補湯

ジュウゼンタイホトウ

ウチダの十全大補湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸の弱い人。
(4) 高齢者。
(5) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
むくみ
(7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つ っぱり感やこわばりに加 えて、脱力感、筋肉痛があ らわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くな る)、褐色尿、全身のだる さ、食欲不振等があらわれ る。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、こ
のような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること
下痢
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること

効能・効果

病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 包につき水約 600mL を加えてあまり強くない火にかけ、約 300mL まで煎じつめ、袋を取り出し、3 回に分けて食前又は食間に温服する。
15 歳未満 7 歳以上	大人の煎液の 2/3 の量を 3 回に分けて食前又は食間に温服する。
7 歳未満 4 歳以上	大人の煎液の 1/2 の量を 3 回に分けて食前又は食間に温服する。
4 歳未満 2 歳以上	大人の煎液の 1/3 の量を 3 回に分けて食前又は食間に温服する。
2 歳未満	大人の煎液の 1/4 の量を 3 回に分けて食前又は食間に温服する。

用法・用量に関連する注意

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 日量（1 包 28.5 g）中

ニ ン ジ ン	3.0 g	シ ャ ク ヤ ク	3.0 g
オ ウ ギ	3.0 g	ジ オ ウ	3.0 g
ビ ャ ク ジ ャ ッ	3.0 g	セ ン キ ャ ッ	3.0 g
ブ ク リ ャ ッ	3.0 g	ケ イ ヒ	3.0 g
ト ウ キ	3.0 g	カ ン ゾ ャ ッ	1.5 g
			全 量 28.5 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4