ご使用に際しては，この添付文書を必ずお読み下さい.また，必要な時に読めるよう大切に保管して下さい.

第２類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 十味敗毒湯

ジュウミハイドクトウ

ウチダの十味敗毒湯は漢方処方にしたがって，生薬を配合した煎剤で，特異な芳香があります.

⚠ 使用上の注意

相談すること

1．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師の治療を受けている人.
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人.
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人，体の弱い人）.
＊(4)胃腸の弱い人.
(5)高齢者.
(6)今までに薬により発疹・発赤，かゆみ等を起こしたことがある人.
(7)次の症状のある人.
むくみ
(8)次の診断を受けた人.
高血圧，心臓病，腎臓病

2．次の場合は，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1)まれに下記の重篤な症状が起こることがあります.
その場合は直ちに医師の診療を受けること.

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する，顔や手足がむくむ，まぶたが重くなる，手がこわばる，血圧が高くなる，頭痛等があらわれる.

(2)１ヵ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期，急性湿疹に服用する場合には１週間位）服用しても症状がよくならない場合

3．長期連用する場合には，医師又は薬剤師に相談すること
4．本剤の服用により，まれに症状が進行することもあるので，このような場合には，服用を中止し，医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

神経質で胸や脇腹が重苦しいもので化膿症をくり返すフルンクロージス，アレルギー性の湿疹，蕁麻疹を起こしやすいもの。
癰[注1)]，癤[注2)]，湿疹，蕁麻疹，フルンクロージス，アレルギー体質改善

注1)「癰（よう）」とは赤色を呈した痛みの強いはれものを指します.

注2)「癤（せつ）」とは毛根を包んでいる部分と皮脂腺の急性炎症を指します.

用法・用量

年齢	１日量
大人（15歳以上）	１袋（１日分）につき水600mL（約３合３勺）を加え，あまり強くない火にかけ300mL（約１合７勺）に煮つめ，袋をとり出し，２～３回に分けて食前１時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品１袋中

サイコ	2.5g	ブクリョウ	2.5g
キキョウ	2.5g	ドクカツ	1.5g
ハマボウフウ	2.5g	ケイガイ	1.5g
センキュウ	2.5g	カンゾウ	1.5g
オウヒ	2.5g	ショウキョウ	1.0g

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること.
(2)小児の手の届かない所に保管すること.
(3)他の容器に入れ替えないこと.（誤用の原因になったり品質が変わる.）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは，お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます.
株式会社　ウチダ和漢薬　０３－３８０６－４１４１
受付時間　9：00～17：30（土，日，祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので，製品により多少色が異なることがありますが，効能・効果にかわりはありません.

株式会社　ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8