

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。


第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 十味敗毒湯

ジュウミハイドクトウ

ウチダの十味敗毒湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

神経質で胸や脇腹が重苦しいもので化膿症をくり返すフランクロージス、アレルギー性の湿疹、蕁麻疹を起こしやすいもの。
癬^{注1)}、癬^{注2)}、湿疹、蕁麻疹、フランクロージス、アレルギー体質改善

注1)「癬^{よう}」とは赤色を呈した痛みの強いはれものを指します。

注2)「癬^{せつ}」とは毛根を包んでいる部分と皮脂腺の急性炎症を指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水600mL（約3合3勺）を加え、あまり強くない火にかけ300mL（約1合7勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品1袋中

サ イ コ	2.5g	ブ ク リ ヨ ウ	2.5g
キ キ ヨ ウ	2.5g	ト ウ ド ク カ ツ	1.5g
ハ マ ボ ウ フ ウ	2.5g	ケ イ ガ イ	1.5g
セ ン キ ユ ウ	2.5g	カ ン ゾ ウ	1.5g
オ ウ ヒ	2.5g	シ ヨ ウ キ ヨ ウ	1.0g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-4-10