

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第 2 類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

## ウチダの 十味敗毒湯

ジュウミハイドクトウ

ウチダの十味敗毒湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称           | 症 状                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1 ヶ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 成分・分量

本品 1 袋中

|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| サ イ コ       | 2.5 g | ブ ク リ ヨ ウ   | 2.5 g |
| キ キ ヨ ウ     | 2.5 g | ト ウ ド ク カ ツ | 1.5 g |
| ハ マ ボ ウ フ ウ | 2.5 g | ケ イ ガ イ     | 1.5 g |
| セ ン キ ユ ウ   | 2.5 g | カ ン ゾ ウ     | 1.5 g |
| オ ウ ヒ       | 2.5 g | シ ヨ ウ キ ヨ ウ | 1.0 g |

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

## 効能・効果

神経質で胸や脇腹が重苦しいもので化膿症をくり返すフランクロージス、アレルギー性の湿疹、蕁麻疹を起こしやすいもの。癬<sup>注1)</sup>、癬<sup>注2)</sup>、湿疹、蕁麻疹、フランクロージス、アレルギー体質改善

注1)「癬<sup>よう</sup>」とは赤色を呈した痛みの強いはれものを指します。

注2)「癬<sup>せつ</sup>」とは毛根を包んでいる部分と皮脂腺の急性炎症を指します。

## 用法・用量

| 年 齢        | 1 日 量                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大人（15 歳以上） | 1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。 |
| 15 歳未満     | 服用しないこと                                                                                                  |

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる場合がありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4