

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤
ウチダの 小少陽
ショウショウヨウ

57

分包

ウチダの小少陽は、漢方処方にしたいがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすい散剤（細粒）の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
* (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
* (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4) 高齢者。
(5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
むくみ
(7) 次の診断を受けた人。
肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
(8) インターフェロン製剤で治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- * (2) 1 ヶ月位（風邪の後期の症状に服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくならない場合
3．長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	1 包
15 歳未満 7 歳以上	2/3 包
7 歳未満 4 歳以上	1/2 包
4 歳未満 2 歳以上	1/3 包
2 歳未満	1/4 包

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
* (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 日量（6 g）中

サイコ	3.5 g
ハンゲ	2.5 g
ショウキョウ	0.5 g
オウゴン	1.5 g
タイソウ	1.5 g
ニンジン	1.5 g
カンゾウ	1.0 g

小柴胡湯エキス……………2.75 g

賦形剤として乳糖水和物・バレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
(4) 小児で 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2 日以内に服用すること。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141
受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

はきけ、食欲不振、胃炎、胃腸虚弱、疲労感及び風邪の後期の症状

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8